


Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30533053_0002

INSTITUTIONES MEDICÆ
PETRO LEOPOLDO
ARCHIDUCI AUSTRIÆ,
MAGNO ETRURIÆ DUCI &c. &c. &c.
CONSECRATÆ
AUCT. RAINERIO BONAVENTURA
MARTINI PISANO
IN PATRIA ACADEMIA
PUBLICO THEORETICÆ MEDICINÆ
PROFESSORE
TOMUS SECUNDUS
PATOLOGIAM, SEMEJOTICEN, ET
THERAPEUTICEN CONTINENS.



FLORENTIÆ MDCCLXXII.
~~~~~  
EX TYPOGRAPHIA DOMINICI MARZI ET SOCIORUM  
*Superiorum facultate.*

*Ex Libris*  
*Angeli Longgardi*

UNIVERSITY OF CHICAGO  
PETER LEOPOLD

RESEARCH IN CHEMISTRY

1910-1911

1911-1912

ADVANCEMENT OF SCIENCE

1912-1913

1913-1914


UNIVERSITY OF CHICAGO

1914-1915

1915-1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS



UNIVERSITY OF CHICAGO  
1916-1917  
1917-1918  
1918-1919  
1919-1920  
1920-1921  
1921-1922  
1922-1923  
1923-1924  
1924-1925  
1925-1926  
1926-1927  
1927-1928  
1928-1929  
1929-1930  
1930-1931  
1931-1932  
1932-1933  
1933-1934  
1934-1935  
1935-1936  
1936-1937  
1937-1938  
1938-1939  
1939-1940  
1940-1941  
1941-1942  
1942-1943  
1943-1944  
1944-1945  
1945-1946  
1946-1947  
1947-1948  
1948-1949  
1949-1950  
1950-1951  
1951-1952  
1952-1953  
1953-1954  
1954-1955  
1955-1956  
1956-1957  
1957-1958  
1958-1959  
1959-1960  
1960-1961  
1961-1962  
1962-1963  
1963-1964  
1964-1965  
1965-1966  
1966-1967  
1967-1968  
1968-1969  
1969-1970  
1970-1971  
1971-1972  
1972-1973  
1973-1974  
1974-1975  
1975-1976  
1976-1977  
1977-1978  
1978-1979  
1979-1980  
1980-1981  
1981-1982  
1982-1983  
1983-1984  
1984-1985  
1985-1986  
1986-1987  
1987-1988  
1988-1989  
1989-1990  
1990-1991  
1991-1992  
1992-1993  
1993-1994  
1994-1995  
1995-1996  
1996-1997  
1997-1998  
1998-1999  
1999-2000  
2000-2001  
2001-2002  
2002-2003  
2003-2004  
2004-2005  
2005-2006  
2006-2007  
2007-2008  
2008-2009  
2009-2010  
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  
2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017  
2017-2018  
2018-2019  
2019-2020  
2020-2021  
2021-2022  
2022-2023  
2023-2024  
2024-2025  
2025-2026  
2026-2027  
2027-2028  
2028-2029  
2029-2030  
2030-2031  
2031-2032  
2032-2033  
2033-2034  
2034-2035  
2035-2036  
2036-2037  
2037-2038  
2038-2039  
2039-2040  
2040-2041  
2041-2042  
2042-2043  
2043-2044  
2044-2045  
2045-2046  
2046-2047  
2047-2048  
2048-2049  
2049-2050  
2050-2051  
2051-2052  
2052-2053  
2053-2054  
2054-2055  
2055-2056  
2056-2057  
2057-2058  
2058-2059  
2059-2060  
2060-2061  
2061-2062  
2062-2063  
2063-2064  
2064-2065  
2065-2066  
2066-2067  
2067-2068  
2068-2069  
2069-2070  
2070-2071  
2071-2072  
2072-2073  
2073-2074  
2074-2075  
2075-2076  
2076-2077  
2077-2078  
2078-2079  
2079-2080  
2080-2081  
2081-2082  
2082-2083  
2083-2084  
2084-2085  
2085-2086  
2086-2087  
2087-2088  
2088-2089  
2089-2090  
2090-2091  
2091-2092  
2092-2093  
2093-2094  
2094-2095  
2095-2096  
2096-2097  
2097-2098  
2098-2099  
2099-2100  
2100-2101  
2101-2102  
2102-2103  
2103-2104  
2104-2105  
2105-2106  
2106-2107  
2107-2108  
2108-2109  
2109-2110  
2110-2111  
2111-2112  
2112-2113  
2113-2114  
2114-2115  
2115-2116  
2116-2117  
2117-2118  
2118-2119  
2119-2120  
2120-2121  
2121-2122  
2122-2123  
2123-2124  
2124-2125  
2125-2126  
2126-2127  
2127-2128  
2128-2129  
2129-2130  
2130-2131  
2131-2132  
2132-2133  
2133-2134  
2134-2135  
2135-2136  
2136-2137  
2137-2138  
2138-2139  
2139-2140  
2140-2141  
2141-2142  
2142-2143  
2143-2144  
2144-2145  
2145-2146  
2146-2147  
2147-2148  
2148-2149  
2149-2150  
2150-2151  
2151-2152  
2152-2153  
2153-2154  
2154-2155  
2155-2156  
2156-2157  
2157-2158  
2158-2159  
2159-2160  
2160-2161  
2161-2162  
2162-2163  
2163-2164  
2164-2165  
2165-2166  
2166-2167  
2167-2168  
2168-2169  
2169-2170  
2170-2171  
2171-2172  
2172-2173  
2173-2174  
2174-2175  
2175-2176  
2176-2177  
2177-2178  
2178-2179  
2179-2180  
2180-2181  
2181-2182  
2182-2183  
2183-2184  
2184-2185  
2185-2186  
2186-2187  
2187-2188  
2188-2189  
2189-2190  
2190-2191  
2191-2192  
2192-2193  
2193-2194  
2194-2195  
2195-2196  
2196-2197  
2197-2198  
2198-2199  
2199-2200  
2200-2201  
2201-2202  
2202-2203  
2203-2204  
2204-2205  
2205-2206  
2206-2207  
2207-2208  
2208-2209  
2209-2210  
2210-2211  
2211-2212  
2212-2213  
2213-2214  
2214-2215  
2215-2216  
2216-2217  
2217-2218  
2218-2219  
2219-2220  
2220-2221  
2221-2222  
2222-2223  
2223-2224  
2224-2225  
2225-2226  
2226-2227  
2227-2228  
2228-2229  
2229-2230  
2230-2231  
2231-2232  
2232-2233  
2233-2234  
2234-2235  
2235-2236  
2236-2237  
2237-2238  
2238-2239  
2239-2240  
2240-2241  
2241-2242  
2242-2243  
2243-2244  
2244-2245  
2245-2246  
2246-2247  
2247-2248  
2248-2249  
2249-2250  
2250-2251  
2251-2252  
2252-2253  
2253-2254  
2254-2255  
2255-2256  
2256-2257  
2257-2258  
2258-2259  
2259-2260  
2260-2261  
2261-2262  
2262-2263  
2263-2264  
2264-2265  
2265-2266  
2266-2267  
2267-2268  
2268-2269  
2269-2270  
2270-2271  
2271-2272  
2272-2273  
2273-2274  
2274-2275  
2275-2276  
2276-2277  
2277-2278  
2278-2279  
2279-2280  
2280-2281  
2281-2282  
2282-2283  
2283-2284  
2284-2285  
2285-2286  
2286-2287  
2287-2288  
2288-2289  
2289-2290  
2290-2291  
2291-2292  
2292-2293  
2293-2294  
2294-2295  
2295-2296  
2296-2297  
2297-2298  
2298-2299  
2299-2300  
2300-2301  
2301-2302  
2302-2303  
2303-2304  
2304-2305  
2305-2306  
2306-2307  
2307-2308  
2308-2309  
2309-2310  
2310-2311  
2311-2312  
2312-2313  
2313-2314  
2314-2315  
2315-2316  
2316-2317  
2317-2318  
2318-2319  
2319-2320  
2320-2321  
2321-2322  
2322-2323  
2323-2324  
2324-2325  
2325-2326  
2326-2327  
2327-2328  
2328-2329  
2329-2330  
2330-2331  
2331-2332  
2332-2333  
2333-2334  
2334-2335  
2335-2336  
2336-2337  
2337-2338  
2338-2339  
2339-2340  
2340-2341  
2341-2342  
2342-2343  
2343-2344  
2344-2345  
2345-2346  
2346-2347  
2347-2348  
2348-2349  
2349-2350  
2350-2351  
2351-2352  
2352-2353  
2353-2354  
2354-2355  
2355-2356  
2356-2357  
2357-2358  
2358-2359  
2359-2360  
2360-2361  
2361-2362  
2362-2363  
2363-2364  
2364-2365  
2365-2366  
2366-2367  
2367-2368  
2368-2369  
2369-2370  
2370-2371  
2371-2372  
2372-2373  
2373-2374  
2374-2375  
2375-2376  
2376-2377  
2377-2378  
2378-2379  
2379-2380  
2380-2381  
2381-2382  
2382-2383  
2383-2384  
2384-2385  
2385-2386  
2386-2387  
2387-2388  
2388-2389  
2389-2390  
2390-2391  
2391-2392  
2392-2393  
2393-2394  
2394-2395  
2395-2396  
2396-2397  
2397-2398  
2398-2399  
2399-2400  
2400-2401  
2401-2402  
2402-2403  
2403-2404  
2404-2405  
2405-2406  
2406-2407  
2407-2408  
2408-2409  
2409-2410  
2410-2411  
2411-2412  
2412-2413  
2413-2414  
2414-2415  
2415-2416  
2416-2417  
2417-2418  
2418-2419  
2419-2420  
2420-2421  
2421-2422  
2422-2423  
2423-2424  
2424-2425  
2425-2426  
2426-2427  
2427-2428  
2428-2429  
2429-2430  
2430-2431  
2431-2432  
2432-2433  
2433-2434  
2434-2435  
2435-2436  
2436-2437  
2437-2438  
2438-2439  
2439-2440  
2440-2441  
2441-2442  
2442-2443  
2443-2444  
2444-2445  
2445-2446  
2446-2447  
2447-2448  
2448-2449  
2449-2450  
2450-2451  
2451-2452  
2452-2453  
2453-2454  
2454-2455  
2455-2456  
2456-2457  
2457-2458  
2458-2459  
2459-2460  
2460-2461  
2461-2462  
2462-2463  
2463-2464  
2464-2465  
2465-2466  
2466-2467  
2467-2468  
2468-2469  
2469-2470  
2470-2471  
2471-2472  
2472-2473  
2473-2474  
2474-2475  
2475-2476  
2476-2477  
2477-2478  
2478-2479  
2479-2480  
2480-2481  
2481-2482  
2482-2483  
2483-2484  
2484-2485  
2485-2486  
2486-2487  
2487-2488  
2488-2489  
2489-2490  
2490-2491  
2491-2492  
2492-2493  
2493-2494  
2494-2495  
2495-2496  
2496-2497  
2497-2498  
2498-2499  
2499-2500  
2500-2501  
2501-2502  
2502-2503  
2503-2504  
2504-2505  
2505-2506  
2506-2507  
2507-2508  
2508-2509  
2509-2510  
2510-2511  
2511-2512  
2512-2513  
2513-2514  
2514-2515  
2515-2516  
2516-2517  
2517-2518  
2518-2519  
2519-2520  
2520-2521  
2521-2522  
2522-2523  
2523-2524  
2524-2525  
2525-2526  
2526-2527  
2527-2528  
2528-2529  
2529-2530  
2530-2531  
2531-2532  
2532-2533  
2533-2534  
2534-2535  
2535-2536  
2536-2537  
2537-2538  
2538-2539  
2539-2540  
2540-2541  
2541-2542  
2542-2543  
2543-2544  
2544-2545  
2545-2546  
2546-2547  
2547-2548  
2548-2549  
2549-2550  
2550-2551  
2551-2552  
2552-2553  
2553-2554  
2554-2555  
2555-2556  
2556-2557  
2557-2558  
2558-2559  
2559-2560  
2560-2561  
2561-2562  
2562-2563  
2563-2564  
2564-2565  
2565-2566  
2566-2567  
2567-2568  
2568-2569  
2569-2570  
2570-2571  
2571-2572  
2572-2573  
2573-2574  
2574-2575  
2575-2576  
2576-2577  
2577-2578  
2578-2579  
2579-2580  
2580-2581  
2581-2582  
2582-2583  
2583-2584  
2584-2585  
2585-2586  
2586-2587  
2587-2588  
2588-2589  
2589-2590  
2590-2591  
2591-2592  
2592-2593  
2593-2594  
2594-2595  
2595-2596  
2596-2597  
2597-2598  
2598-2599  
2599-2600  
2600-2601  
2601-2602  
2602-2603  
2603-2604  
2604-2605  
2605-2606  
2606-2607  
2607-2608  
2608-2609  
2609-2610  
2610-2611  
2611-2612  
2612-2613  
2613-2614  
2614-2615  
2615-2616  
2616-2617  
2617-2618  
2618-2619  
2619-2620  
2620-2621  
2621-2622  
2622-2623  
2623-2624  
2624-2625  
2625-2626  
2626-2627  
2627-2628  
2628-2629  
2629-2630  
2630-2631  
2631-2632  
2632-2633  
2633-2634  
2634-2635  
2635-2636  
2636-2637  
2637-2638  
2638-2639  
2639-2640  
2640-2641  
2641-2642  
2642-2643  
2643-2644  
2644-2645  
2645-2646  
2646-2647  
2647-2648  
2648-2649  
2649-2650  
2650-2651  
2651-2652  
2652-2653  
2653-2654  
2654-2655  
2655-2656  
2656-2657  
2657-2658  
2658-2659  
2659-2660  
2660-2661  
2661-2662  
2662-2663  
2663-2664  
2664-2665  
2665-2666  
2666-2667  
2667-2668  
2668-2669  
2669-2670  
2670-2671  
2671-2672  
2672-2673  
2673-2674  
2674-2675  
2675-2676  
2676-2677  
2677-2678  
2678-2679  
2679-2680  
2680-2681  
2681-2682  
2682-2683  
2683-2684  
2684-2685  
2685-2686  
2686-2687  
2687-2688  
2688-2689  
2689-2690  
2690-2691  
2691-2692  
2692-2693  
2693-2694  
2694-2695  
2695-2696  
2696-2697  
2697-2698  
2698-2699  
2699-2700  
2700-2701  
2701-2702  
2702-2703  
2703-2704  
2704-2705  
2705-2706  
2706-2707  
2707-2708  
2708-2709  
2709-2710  
2710-2711  
2711-2712  
2712-2713  
2713-2714  
2714-2715  
2715-2716  
2716-2717  
2717-2718  
2718-2719  
2719-2720  
2720-2721  
2721-2722  
2722-2723  
2723-2724  
2724-2725  
2725-2726  
2726-2727  
2727-2728  
2728-2729  
2729-2730  
2730-2731  
2731-2732  
2732-2733  
2733-2734  
2734-2735  
2735-2736  
2736-2737  
2737-2738  
2738-2739  
2739-2740  
2740-2741  
2741-2742  
2742-2743  
2743-2744  
2744-2745  
2745-2746  
2746-2747  
2747-2748  
2748-2749  
2749-2750  
2750-2751  
2751-2752  
2752-2753  
2753-2754  
2754-2755  
2755-2756  
2756-2757  
2757-2758  
2758-2759  
2759-2760  
2760-2761  
2761-2762  
2762-2763  
2763-2764  
2764-2765  
2765-2766  
2766-2767  
2767-2768  
2768-2769  
2769-2770  
2770-2771  
2771-2772  
2772-2773  
2773-2774  
2774-2775  
2775-2776  
2776-2777  
2777-2778  
2778-2779  
2779-2780  
2780-2781  
2781-2782  
2782-2783  
2783-2784  
2784-2785  
2785-2786  
2786-2787  
2787-2788  
2788-2789  
2789-2790  
2790-2791  
2791-2792  
2792-2793  
2793-2794  
2794-2795  
2795-2796  
2796-2797  
2797-2798  
2798-2799  
2799-2800  
2800-2801  
2801-2802  
2802-2803  
2803-2804  
2804-2805  
2805-2806  
2806-2807  
2807-2808  
2808-2809  
2809-2810  
2810-2811  
2811-2812  
2812-2813  
2813-2814  
2814-2815  
2815-2816  
2816-2817  
2817-2818  
2818-2819  
2819-2820  
2820-2821  
2821-2822  
2822-2823  
2823-2824  
2824-2825  
2825-2826  
2826-2827  
2827-2828  
2828-2829  
2829-2830  
2830-2831  
2831-2832  
2832-2833  
2833-2834  
2834-2835  
2835-2836  
2836-2837  
2837-2838  
2838-2839  
2839-2840  
2840-2841  
2841-2842  
2842-2843  
2843-2844  
2844-2845  
2845-2846  
2846-2847  
2847-2848  
2848-2849  
2849-2850  
2850-2851  
2851-2852  
2852-2853  
2853-2854  
2854-2855  
2855-2856  
2856-2857  
2857-2858  
2858-2859  
2859-2860  
2860-2861  
2861-2862  
2862-2863  
2863-2864  
2864-2865  
2865-2866  
2866-2867  
2867-2868  
2868-2869  
2869-2870  
2870-2871  
2871-2872  
2872-2873  
2873-2874  
2874-2875  
2875-2876  
2876-2877  
2877-2878  
2878-2879  
2879-2880  
2880-2881  
2881-2882  
2882-2883  
2883-2884  
2884-2885  
2885-2886  
2886-2887  
2887-2888  
2888-2889  
2889-2890  
2890-2891  
2891-2892  
2892-2893  
2893-2894  
2894-2895  
2895-2896  
2896-2897  
2897-2898  
2898-2899  
2899-2900  
2900-2901  
2901-2902  
2902-2903  
2903-2904  
2904-2905  
2905-2906  
2906-2907  
2907-2908  
2908-2909  
2909-2910  
2910-2911  
2911-2912  
2912-2913  
2913-2914  
2914-2915  
2915-2916  
2916-2917  
2917-2918  
2918-2919  
2919-2920  
2920-2921  
2921-2922  
2922-2923  
2923-2924  
2924-2925  
2925-2926  
2926-2927  
2927-2928  
2928-2929  
2929-2930  
2930-2931  
2931-2932  
2932-2933  
2933-2934  
2934-2935  
2935-2936  
2936-2937  
2937-2938  
2938-2939  
2939-2940  
2940-2941  
2941-2942  
2942-2943  
2943-2944  
2944-2945  
2945-2946  
2946-2947  
2947-2948  
2948-2949  
2949-2950  
2950-2951  
2951-2952  
2952-2953  
2953-2954  
2954-2955  
2955-2956  
2956-2957  
2957-2958  
2958-2959  
2959-2960  
2960-2961  
2961-2962  
2962-2963  
2963-2964  
2964-2965  
2965-2966  
2966-2967  
2967-2968  
2968-2969  
2969-2970  
2970-2971  
2971-2972  
2972-2973  
2973-2974  
2974-2975  
2975-2976  
2976-2977  
2977-2978  
2978-2979  
2979-2980  
2980-2981



# PRÆFATIO.

---

**H**abes humanissime Lector alterum medicarum institutionum volumen, in quo de pathologia, semeiotica, & therapeutica differitur. Fortasse & in hoc volumine aliqua occurrent Tibi loca, quae uberius explananda fuerant, & fusius, atque in clariori lumine collocanda. Sed scias velim illud hoc opusculo propositum mihi dumtaxat fuisse, ut earum Tibi epitomen exhiberem institutionum, quas, si quid otii nactus ero, alias emendatiores, auctioresque in publicum proferam. Meum igitur hoc non inexpressibile peccatum aliquando ad bonam frugem Diis annuentibus revocabitur, meusque hic præceptus conatus erit, mihi demum exercitatio sedulitatis fortasse Tibi non infructuosæ. Nolo hic de me aliquid polliceri, qui mobilitate quadam ingenii præditus in vario studiorum genere antehac desultoria levitate pervagatus sum, sed quid pertinax studium, quid navata dies noctesque theoriæ medicæ opera præstare deinceps possint, apertissime cognosces. Interim rogandus mihi es, ut æquus Judex, & Censor esse pergas, & quæ plurima in typos irrepsere menda typographo remittas, corrigasque. Profecto æquus ipse cum sis nunquam Tibi veniet in mentem subvereri, ne sint auctori operis tribuenda.

# Errata

# Corrige

|        |         |                    |                  |
|--------|---------|--------------------|------------------|
| Pag. 4 | lin. 25 | aetum              | lege aptum       |
| 5      | 19      | ab ea              | ad ea            |
| 9      | 22      | supervacaneū est   | adde de illis    |
| 11     | 25      | in modicis         | immodicis        |
| 15     | 22      | poculos            | porulos          |
| 21     | 3       | quos               | si quos          |
| 26     | 26      | successionum       | secessionum      |
| 28     | 14      | edes               | sedes            |
| 31     | 1       | infectione         | infertione       |
| 43     | 9       | evalitionem        | coalitionem      |
| 89     | 10      | matrice            | nutrice          |
| 90     | 24      | adabrente          | adparente        |
| 108    | 14      | flui viscidī dorum | viscida fluidorū |
| 109    | 22      | salutationem       | solutionem       |

*Alia menda minoris momenti corrigit  
benevolus Lector.*





# Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α .



**H** Astenus humani corporis naturam universam, five naturalem constitutionem, scilicet statum illum, in quo idem juxta leges agita natura praescriptos, consideravimus, & quibus modis in statu illo durare possit ostendimus. Postulat nunc instituti ratio, ut quæ ipsi præter naturam addidunt, statum nempe illum, in quo facultas adimitur eisdem humano corpori functionum ad naturæ, & sanitatis leges ex exserendarum, quique morbus dicitur, sedulo perpendamus. Et quoniam sanitatis naturam in optima solidorum structura reposuimus & in ea fluidorum constitutione physica, ut nec nimium vigeant, nec langueant nimium interni illi vitalis fermentationis motus, per quos fluida ipsa vitalem abeunt in flammam, sic generalis morbi natura in eo constituenda est, quod solida vitio aliquo functiones suas ægre peragant, interni-

que illi fluidorum motus vel nimium vigeant, vel plus æquo langueant. Cum autem nihil fieri possit sine causa atque adeo morbi a suis causis proficiantur, operæ pretium est, ut antequam ad varios solidorum, & fluidorum morbos expendendos progrediamur, de eorundem causis generatim differamus.

CA.





## CAPUT I

## DE CAUSSIS MORBORUM



**C**ausa cujuslibet morbi id quaecumque habens est, quo efficitur, ut morbus existat. Plures autem sunt apud Medicinæ scriptores causarum morbos efficientium divisiones, inter quas ea principem locum tenet, qua illæ in internas, & externas dividuntur. Internarum causarum nomine intelligitur vitium quodcumque intra corpus latens, sive in humoribus, & canalibus sedem habens, hærensque aliquanto ante, quam in morbum erumpat, quod sane vitium non sensibus, sed coniectura adsequimur. Externæ vero eæ sunt, & communiter reputantur, quæ extra corpus positæ in corpus ipsum vi sua agunt, illudque adficiunt, & inmutant. Hæ autem rursus in necessarias, & non necessarias distinguuntur. Non necessariae sunt quæ fortuito contingunt, nec ullo modo pertinent ad usum vitæ, quales sunt externorum corporum im-

pactus, serpentium ictus, & alia huiusmodi, quibus animale corpus fortuito læditur. Necessariæ vero sic dicuntur, non quod necessario morbum inferant, sed quod non semper in nobis sit, ut ab iisdem caveamus. Huc pertinent res non naturales, quibus adscenseri etiam debent somnus, & vigilia, & animi pathemata, quæ cum extra nos posita non sint hinc est, ut non tam apte inter causas externas referendæ videantur, nisi forte causarum externarum nomine eas intelligamus, quæ extra nos sunt & sine ulla conjectura, sed sensu ipso manifestissime percipiuntur. Eas autem aptius vocaveris evidentes sequutus auctoritatem *Celsi*, qui externarum causarum mentionem non facit, sed quas sic appellant Physiologi, evidentes ipse nuncupavit. Internæ igitur causæ aliquem ponunt sanitatis defectum, antequam morbus explicetur, sed latentem, vel ita levem, ut sine magna functionum læsione aliquandiu ferri possit. Externæ vero cito adgrediuntur vel sanissimos, ut per se patet.

Sed inter morbi causas recenseri debet quæ dicitur prædisponens, ut & ea, quæ procatartica, sive occasionalis adpellatur. Prædisponens dici solet quævis conditio, quæ corpori inhæret, quaque idem actum efficitur ad morbum nata occasione contrahendum. Huiusmodi causæ, seu conditiones sunt plethora, corporis imbecillitas, cacochymia, temperamentum &c. Occasionalis autem causa, sive occasio, vocatur id omne, quod prædisponenti causæ superadditum hanc excitat, determinatque, ut copulatis viribus morbum creent. Unde constat neutram per se ad procreandum morbum valere, sed utriusque concursus requiri.



Tandem præcipua, & maxime generalis divisio causarum institui solet in remotas, & proximas. Causæ remotæ dicuntur illæ, quæ singillatim aliquid possunt, & faciunt ad morbum excitandum, quin tamen reipsa morbum pariant, nisi simul omnes ad hunc efficiendum conspirent; Causa vero proxima ea vocari solet quæ ex concursu remotarum omnium profecta præsentem morbum præsens & ipsa integra, & sufficiens totum constituit, & immediate parit; Posita morbum ponit, sublata tollit. Cum ergo rationem universam originis morborum in se contineat, causa continens a Pathologis nuncupatur, qualis est ex: gr. materia obstructionem faciens, qua sublata tollitur etiam obstructio. Causæ remotæ dici satis apte possunt principia morborum, & ad duo suprema capita revocari, scilicet ad dispositiones quascumque corpori inhærentes, morbumque excitantes, quoties noxia vis analogæ adcesserit, & ad vires noxias, ab ea nempe, quæ potestatem habent creandorum morborum in corpore prædisposito. Utrarumque vero conjunctionem requiri, ut causa morbi, & morbus ipse suboriantur, manifestissimum est.

Quamvis autem causa morbi plerumque obscura sit, cognosci tamen recte poterit, si eadem in simplices, ex quibus componitur, potestates resolvatur, ac deinde quid harum singulæ, quid conjunctæ simul omnes valeant expendatur, quod sane perficitur sedula eorum omnium investigatione, quæ morbum præcessere, ut propterea credibile sit eadem aliquid ad morbi genesim valuisse, sive prius in corpore sedem habuerint, sive extrinsecus adcesserint. His enim omnibus continentur vires, ex quarum conspiratione morbi causa profluxit.

## CAPUT II.

## DE SYMPTOMATE GENERATIM

**P**henomenon id omne dicitur a Medicis , quod in sensus tum ægri , tum medentis incurrit ; symptoma vero , seu morbosum phenomenon est quicumque sensibiles a naturali statu recessus , vel quidquid evidenter mutatum observatur , & a sanitate prorsus alienum , quodque ex præsentē morbo proficiscitur ita tamen , ut & a morbo ipso , & a proxima ejusdem causâ distingui possit . Hujusmodi symptomata ratione tum morbi , tum ejus causæ , tum symptomatum in symptomata morbi , tum ejus causæ , & symptomatum distinguuntur . Syntoma morbi vocari solet effectus sensibilis vi præsentis morbi suam referens originem . Causæ syntoma tunc dicitur , cum origo syntomatis proprius ex causâ morbi derivari potest , quod sane contingit , cum vires ejus rei , quæ morbum facit , ita multiplices sunt , ut earum aliæ ad excitandum morbum




bum conspirent , adeoque hujus efficiantur causa ;  
 alia vero occasione excitati morbi serius citius  
 in actionem deducantur , & varios pariant effe-  
 ctus , qui licet morbo superaddantur , non ita ta-  
 men cum illo cohærent , quin morbus ipse sine il-  
 lis esse possit . Hæc igitur symptomata & perduran-  
 te morbo perseverant , & eodem evanescente su-  
 persunt ; quin interdum plus inferunt periculi ,  
 quam morbus , cui se se comites adjungunt , alias  
 etiam morbum morbo superadditum declarant .  
 Quod si utrumque symptomata vi sua aliam rursus  
 adfectionem sensibilem excitarit , hæc symptomata  
 symptomatis vocari solet a Medicis , eoque nomi-  
 ne intelliguntur etiam ceteri omnes effectus mor-  
 bosi , qui ex aliis subinde profluunt .

Alia etiam sunt symptomata , quæ ab actuosa  
 natura producuntur , dum viribus potentia mor-  
 bosæ resistit . Non aliud igitur ea sunt , quam na-  
 turæ molimina propriam salutem propugnantes .  
 Eadem vero cum salutare plerumque fines habeant  
 idcirco symptomata activa auxiliaria dici satis ap-  
 te possunt . Hujus generis sunt plerumque motus  
 spasmodici convulsivi , exanthemata , abscessus ,  
 hæmorrhagiæ , sudores , vomitus , alvi profluvia ,  
 aliaque plurima , quæ quandoque in morbos se-  
 cundarios abeunt . Hinc quisque intelligit quid  
 Veteres significaverint , cum dixere morbum esse  
 naturæ luctam cum materia morbosa .



## CAPUT III.

## DE MORBIS FLUIDORUM.



**C**Um sæpe contingat, ut aliquod in sanguine ex ejusdem elementis pervertatur, vel eidem aliquid admisceatur heterogenei extrinsecus advenientis, hinc fieri necessario debet, ut vel simul omnia sanguinis ipsius componentia, vel aliqua tantummodo ex iisdem materia quapiam inficiantur, cujus heterogeneitate laudabilis ejusdem indoles inmutetur. Hoc dum evenit, heterogeneum aliquid, vel acre contineri dicitur in sanguine. Heterogeneum autem istud, sive acre vel spontaneum est, vel extrinsecus in animale corpus traducitur. Heterogenei, vel acris spontanei generis etsi jure optimo repetat Cl. *Gaubius* ab alimonie defectu, humorum circuitu naturæ modum excedente, eorundem stagnatione, anomalia demum illorum motuum, quibus coctiones, secretiones,

exeretionesque perficiuntur, eam tamen aptius ad hæmatosim referendam esse existimaverim se se peculiare ob causas vividius exferentem, aut contra languidius procedentem, tanto magis quod nonnullæ ex memoratis causis a sola vitiata hæmatosi facile deducantur. Profecto cum hæmatosis ipsa in extractione, ut alibi ostendimus, acidæ præsertim substantiæ, & phlogisticæ materiæ regelatione, sive evolutione constituenda videatur, illud consequitur, quod si nimia fiat acidæ materiæ extractio, alkalina acrimonia necessario procreetur in sanguine, præsertim si alimenti inopia, calor, & motus adcesserint, contra vero acidæ dominetur acrimonia, si minor ejusdem materiæ quantitas educatur. Et quàmvis aliæ peculiaris indolis acrimoniæ peculiari ratione sanguinem inficiant, cujusmodi sunt acrimonia muratica, & oleosa, itemque visciditas spontanea, quam *Ettmullerus* a stomacho primum repetendam docet, quo minus perfecte chyloseos opus perficiatur, tamen cum ad alkalinas illas, vel acidæ facile revocentur, supervacaneum est pluribus edisserere.

Spontaneis hisce acrimoniis fluiditas, & specifica densitas sanguinei laticis variari plurimum debet, atque inde minor ad motum facilitas proficisci. Enimvero cum in acidæ acrimonia ob nimiam acidæ materiæ copiam phlogisticæ sanguinis partes minus regelentur, & evolvantur, eademque ratione pars ejusdem lymphatica congelascit, & in arctiores proinde nitatur contactus, sanguineus ipse latex in corpus minus fluidum abeat, & ad motum ineptius necesse est. Idem con-



traria ratione contingit in acrimonia alkalina; in ea siquidem propter uberiores acidæ substantiæ extractionem elastica, & phlogistica sanguinis materiæ ita regelantur, evolvuntur, ac rarefiunt ut tandem in corpus quasi spumeum non amplius flexibile, minusque idcirco aptum ad motum se se conforment.

Quin spontaneis hisce acrimoniis non modo fluiditas, & specifica densitas augetur, aut minuitur plurimorum fluidorum e sanguine secedentium, sed & nativæ aliæ ipsorum qualitates immutari debent, præsertim vero homogeneitas relate ad secernentes canaliculos insigniter variari, & quandoque etiam auferri, ut ipsamet fluida non amplius de sanguineis canalibus secedentia minima vasa obstruant, & sanguinis, lymphæ, & adipis augeant acrimoniam, sive putredinem, & ranciditatem. Adcedit quod ex nimio acidæ defectu, nimiaque sanguinis adtenuatione sanguis ipse facile putrescit, adeoque plurimum valet ad pruritus, dolores, pustulas, ulcera, scorbutum, scabiem, fragilitatem, & cariem ossium, atrophiam, aliosque similes morbos intra breve tempus inferendos. Et quamvis huiusmodi mala a chyloso etiam latice produci possint, si ob nimiam acidæ quantitatem vix in sanguinem commutatus fuerit, produci tamen non possunt, nisi ex diuturniora ipse mora in sanguinis canalibus; qua tandem idoneus fiat ad aliquem putrefactionis gradum concipiendum, ut propterea verissimum sit quod scripsit *Hallerus*, scilicet alkalinam intemperiem plus nocere intra unam horam, quam acidam intra integrum revolutum annum.

Hinc



Hinc interim conligi potest utrique acrimoniae communia hæc symptomata convenire, scilicet lentiores circulationis motum, & impetum proindeque minorem nervi fluidi secretionem, indeque virium vitalium languorem, ac præterea minimorum vasorum obstructionem, & infarctum. Acidæ insuper acrimoniae hæc symptomata copulari, scilicet minorem calorem, & ob excendentem feri, & crassæ lymphæ quantitatem cutis pallorem, & squalorem, demum laxitatem, & mollietatem solidorum, qua fiat, ut prementibus fluidis maxime congestis cedant, & in pallidos, frigidos & indolentes tumores adtollantur. Acrimoniae contra alkalinae hæc convenire, nempe calorem majorem, ariditatem, & rigiditatem solidorum.

Nunc vero ut acre, vel heterogeneous expendamus, quod extrinsecus in animale corpus invehitur, animadvertendum est heterogeneous hoc, vel acre non aliud esse, quam vitium illud, quodcumque fuerit, quod fluida corporis animalis contrahunt ab aeris frigore, calore, humiditate siccitate ut & ab exhalationibus quibuscumque noxiis, itemque ab excedenti, vel deficienti alimentorum copia, praeque indole, nec non ab excedente motu, vel quiete, somno vigilia, in modicis excretionibus & retentionibus, atque ab animi pathematibus. Sed præterea acrimoniam creant in corpore potentia, quæ virus habent, & contagione late serpunt, dum nempe ad contactum corporis effluvia datae cujuscumque indolis pertingunt, atque ita cum ipso adtrahuntur, ut admistione sua morbosam in fluidis solutionem excitent, quæ cum ab aliquo solvente aereo continuetur contagione serpere potest

sci-

scilicet cum aliis corporibus communicari. Morbosam hanc solutionem ad summum, ut ita dicam, fluidorum, ac præsertim rubræ sanguinis partis, & bilis putredinem revocari docet, Cl. *Wansvietenius*, idemque plures observationes evincunt quas referunt *Hippocrates*, *Diemerbroechius*, *Zacutus*, *Salius*, aliique. Vim autem contagionis intendunt vel parcitas, vel prava indoles alimentorum. Ab iis enim speciem quandam corruptionis fluida contrahunt que deinde in morbum contagiosum abit, ut in peste Alesiensis observatum fuit. Idem confirmat necrosis ustilaginea, quæ fovetur a fecale cornuto, cujus proventus uber est annis pluviosis, & in agris paludosis, quales sunt Soloniæ juxta Aureliam, & agri Blesensis, Vastiniensis, Bituricensis provinciæ, ibidemque epidemica grassatur. Sed præterea eandem vim contagionis intendit excedens motus adeoque & calor, ut *Celsus* animadvertit. Et sane in peste, quæ Florentiæ grassabatur anno 1663, ii omnes contagione conripiebantur, qui vel deambulatione, vel alia corporis exercitatione confervescebant. Unde conligi potest, quod qui cavere sibi cupiunt a contagione, ii aerem conrigant oportet, quod sane præstat acetum, vel nitrum carbonibus ardentibus injectum, & pyrius pulvis adensus, a vehementioribus exercitationibus abstineant, cruditates, caloremque vitent, & præsertim studeant temperantiæ, ac sobrietati. Quod si quis ægros invisere teneatur, ad eos adcedat non jejunos, gravem fugiant odorem excrementorum, aeremque spiret per spongiam aceto madidam, sibi que temperet a deglutitione salivæ; Licet enim pestilens miasma subire corpus possit per



nares, & bronchia, tamen maxime omnino se se commiscet salivali latici, & cum hoc ad ventriculum descendit, unde in ipso anthrax morborum funestissimus proficiscitur.

Haud absimile est ingenium, & vis serpentis hemorrhoi, & heritinandel, quorum alter stomachacem, sive tantam in sanguine putredinem, ac dissolutionem parit, ut e naribus, auribusque, imo manuum & pedum unguibus erumpat, alter humani corporis partes ita corrumpit, ut brevi sponte sua lacerentur, & diffluant. Sed præterea inter venena sunt nonnulla, quæ peculiari quadam pollent acrimonia, quæ phlogistica, & caustica dici potest, quippe quæ phlogosim, & gangrœnam parit. Huc præ ceteris revocatur arsenicum, quod proinde perperam adhibitum olim fuit a *Christ. Jacobo* ad febrium curationem, etsi multa aqua dilueretur. Infert enim anorexiam, polydipsiam, alopeciam, ardorem in sterno, tussim siccam, ac demum hæcticam, quæ longe pejora sunt febre. A gilla vitriola male præparata eadem contingunt observante *Heersio*. Ejusdem pariter generis sunt sublimatum, cobalthum &c. & inter vegetabilia aconitum, colchycæ, cucumerus sylvestris, esula minor, ranunculus &c. Acrimoniam vehementer acidam habent alia, ut spiritus nitri, sulphuris, aluminis, aqua regia, fortis, sublimatum corrosivum &c. Alia pollent acrimonia alkalinæ, ut cineres vegetabilium, alia humores inspissant, vasa constringunt, meatus obcludunt, secretiones, & excretiones omnes subprimunt exsiccant corpus, atque adeo serius citius lethum inferunt, ut calx viva, gypsum, calx plumbi, cerussa, minium, fungorum nonnulli &c. Alia spiritus ani-

ma-



males adficiunt, nimirum elasticitatem, & motum nimium augent nervei fluidi, vel motum ipsum, & elasticitatem tollunt. Huc referuntur aranea, aspis, vipera, ceraſtes, ſcorpious &c. Alia denique ſunt, quorum vapor cito ſubfocat, ut muſtum fermentefcens, vapor carbonis aliquo loco clauſi, fumus ſulphuris vapor mephiticus, aer cellarum ſubterranearum, quæ vocantur tumuli &c. de quibus omnibus conſuli poſſunt *Meadius*, *Lindeſtolpius*, & *Cl. Brogius*. In quolibet autem adſumto veneno maxime proderit continuo 20, vel 30 aquæ tepidæ libras exhibere, ut in ea liquoris quantitate ſalacerrimus veneni ſubmergatur. Oleum etiam recens dulce adfatim adſumptum præſens remedium eſt ad omne genus venenorum, idemque dicas de butyro. Vomitus tamen remedium eſt omnium præſentiſſimum.

A Lumbricis etiam pati iniuriam poſſunt fluida corporis animalis. Cum enim ab illorum recrementis chyloſus latex inficiatur, atque ita inquinatus ſanguini admiſceatur, hic utique vitium contrahet, pluresque morbos, & varios pro varia recrementorum indole excitabit. Scilicet ſi recrementa illa fuerint acria, præſto erunt cardialgiæ, bulimia, cholera, ileus, pleurodyne, vomitus diarrhoæ, dyſenterix, ſingultus, tormina ventris, dolores capitis, vertigines, convulſiones, epilepſiæ, atrophia & ut obſervat *Cl. Tiſſotus*, dolores in infantibus adeo violenti, & univerſales, ut ubi vis tangantur, clamores edant vehementes &c. Si vero recrementa illa viſcida qualitate donentur, ſanguinem ipſum atque adeo totam humorum univerſitatem iis materiis inficiant, quibus ſanguineus idem latex craſ-

ſior

fior , & viscidior efficiatur . Ob hanc igitur visciditatem fieri necessario debet , ut sanguis in minimis vasculis hæreat , eademque obstruat , & infarciat , atque ita morbos illos omnes creet , qui ab infarctu , & stagnatione profluunt , cujusmodi sunt pleuritides , chlo-  
roses , phrenitides , rheumatismi , apoplexia , carus catalapsis , mœror , tristitia , insomnia , phantasmata terrifica , typus , hæctica febris , aliaque gravissima mala . Adeo verum est quod celeberrimus Auctor scripsit , videlicet nullum esse tam peregrinum symptomata , quod a lumbricis interdum non oriatur . De his autem adnotabimus cum inlustri *Kohnio* vomitiva præ purgantibus valentiora esse ad lumbricos ab humanis corporibus ejiciendos , tum quod brevior est via , tum quod vehemens motus , quem vomitiva in stomacho , & intestinis excitant , aptior est ad vermes expellendos , fœces , in quibus latent , eliminandas .

Ab indumentis denique vitio adfici possunt fluida corporis . Si enimvero illius partes , quæ vestimentis dudum adsueverunt , aut denudentur , aut velamentis tenuissimis contegantur , utique materiæ frigoriferæ facilius , uberiusque cutis porulos permeabunt , præsertim si frigidum , & ventosum fuerit anni tempus , fluiditas sanguinis minuetur , pluresque morbi ex suscepto frigore suborientur . Contra vero crassioris texturæ vestimenta magnam sanguinis solutionem excitabunt , & perspirationem uberius promovebunt , quæ in dies etiam intenduntur fermento veluti quopiam vestibis adfuso . Absorbent præterea humiditatem atmosphæræ , & plus minus retinent pro varia ipsorum natura ; aliquando vero calorem aeris combibunt , atque ita diverso modo agunt in vascula cutanea ; Unde intelligere est , cur intempestiva hibernarum , aut æstivarum



vestium mutatio, subitare partium prius testarum denudatio, vel posthabita etiam tegumentorum ad vicissitudines aeris adcomodatio tot sæpe inferant mala, eaque gravissima, præsertim non abluetis. Denique crebra, vel infrequens indufiorum mutatio adtendenda est. Cum enim illa perspiratis materiis inficiantur, atque adeo quodam veluti fermento saturentur, quo perspirabilis materiæ extractio intenditur, ac promovetur, aperte liquet mutationem indufiorum varie instituendam esse, crebrius nempe iis, qui intensiori, rarius contra iis, qui lentiori gaudent hæmatosi. Præterea cum hæmatosis ipsa sub æstuante cælo vividius procedat, facile est ex constitutis intelligere mutationem indufiorum crebrius instituendam esse æstivo tempore, rarius hyemali, atque adeo non bene cum ratione consentire locum *Hipp.* in libro de salubri diæta, si tamen hic liber inter germanos *Hipp.* recenseri potest, quo docuit vestes puras hyeme induere oportere, sordidas æstate.

Sunt alia nonnulla, ex quibus extrinsecus advenientibus aliquid detrimenti capere potest œconomiam animalis. Sed cum minoris ea sint momenti, consulto prætermittimus. Consuli tamen de his potest pathologia Cl. *Gaubii*.

Age vero ad relativos, ut vocant, fluidorum morbos expendendos adcedamus. Excedens eorundem fluidorum copia, quam plethoram vocant, huiusmodi morbos constituit. Quod ut intelligatur, illud meminisse juverit plethoram ab hæmatosi quantitative, seu extensive quidem aucta proficisci ob ingentem chylosi liquidi quantitatem aliquo modo in sanguinem commutatam, sed ta-

men



men intensive inminuta ob infirmiore[m] solutionem, quam inflammabilis chylosi liquidi substantia suscipit in hæmatosi, atque adeo plethoram necessario fœdere copulari cum majori quantitate acidæ substantiæ in sanguine delitescentis, cumque minori solutione phlogisticæ ejusdem sanguinis materiæ, minori item hujus flexilitate, sed majori cum vasis sanguineis heterogeneitate, ut proinde ad vitiatas ejusdem fluidi sanguinei qualitates, non vero ad vitium quodpiam proportionis revocanda tantummodo sit plethora, ut *Gaubius*, aliique censuerunt.

Multiplex autem est plethora; alia scilicet ad mole[m], vel ad vasa, alia ad vires, ad volumen alia, alia ad habitum, alia denique ad spatium. Plethora ad vasa tunc habetur, cum plurimus latex chylosus materia præsertim cascosa redundat, & vasa ipsa ob infirmiore[m] hæmatosim sunt rigidiora. Hanc procreant vitæ genus lautum, otiosum, quo major chylosi liquidi copia generetur, quam quæ in sanguinem rite conmutari possit, & qua vasa majora tumescunt, ac distenduntur. Hinc vero conligi potest plethoram esse in ratione composita ex directâ ingestorum, & inversa excretorum, adeoque tanto majorem esse, quanto major est ingestorum quantitas intra datum tempus, ut patet, & minor egestio materiæ egeri solitæ. Cum autem ex observatis *Sanctorii* quindcies plus materiei dato tempore perspiretur, quam per alvum ejiciatur, plethora a cohibita perspiratione cutis toties est major, quam quæ ab alvi constipatione proficiscitur,

Huic valde adfinis est plethora ad vires, ea nempe, cui ferendæ vires naturæ minime omnium sufficiunt. Debetur autem cuivis plenitudini ad summum progressæ, nec maturæ levatæ, ut proinde sarcina fiat viribus major, qua sensus gravitatis, spontanea lassitudo, & torpor ad motus inferatur. Cum itaque in hoc casu fieri non possit, quin vasa distendantur, hinc patet verum esse quod docet *Pitcarnius*, scilicet plethoram ad vires a plethora ad vasa minime discrepare.

Plethora ad volumen rarefcenti sanguini, vel aucto ejusdem volumini molem veluti adauctam mentienti, & simul minori canalium dilatationi tota debetur. Calor ingens ab igne, balneis, febribus ardentibus, inflammatoriis, ab aere, exercitationibus, frictione, & similibus in corpore excitatus hujusmodi vitium creant. Debetur etiam indoli sanguinis ad rarefendum idonei, ut in acrimonia alkalina.

Plethora ad habitum exinde profluit, quod chylosus humor butyracea materia redundet, & tunica cellularis adiposa turgeat substantia, nimiumque flexilia sint vasa.

Denique plethora ad spatium, quam dicunt respectivam, ex inminuta systematis circulatorii capacitate proficiscitur, haud pariter inminuta sanguinis quantitate; scilicet sanguis ipse modum excedit, quanquam nec massa, nec volumine augeatur, si spatium, quo contineri debet, contrahatur. Hanc efficiunt solida corporis aut nimium constricta in adcessu febrili vi heterogeneitatis perspirantis materiæ cum villis nervorum, vel ingens, subitumque frigus, terror, aut ipsamet solida, quo-



quoties ob nimiam rigiditatem libere permeari non possunt; Idem efficiunt solida, si fuerint mutilata. Enimvero cum in iis, quibus membrum aliquid amputatum est, eadem, quæ prius, sanguinis quantitas perficiatur, partes superstites hanc sanguinis copiam, quæ supra legitimam quantitatem est, admittere debent; ex quo conficitur, ut plethora sæpe funesta suboriatur, & nonnisi strictiore diaeta, parco potu, & crebra etiam venæ sectione tollenda, donec corpus nimix illi quantitati sustinendæ ferendæque adsueverit.

Plethora cujusvis ea sit speciei, sed præsertim plethora ad molem, ad vires, & ad habitum plures edit effectus in perniciem humani corporis tandem erumpentes, scilicet quietem parit fluidi sanguinei in minimis alicujus partis canaliculis, proindeque canalium ejusdem partis obstructionem creat, qua phlogosis excitatur, itemque inminutionem cavitatis vasorum ob polyposas concretiones, quæ in iisdem vasis generantur a materia caseosa, quoties hæc tum ob tardiores motum, tum ob præpotentem partium adtractionem a rubra parte secedit, & in unum corpus concrefcit canalis alicujus cavitatem inminuens. Excitat præterea amaurosim, apoplexiam, asthma, ephialtem, hæmorrhagiam, cephalalgiam, syrigma, vertiginem, syncopem, synochum, hæmatemesim, aliaque mala, de quibus in praxi.

## CAPUT IV.

## DE MORBIS SOLIDORUM CONTINENTIIUM.

UT de morbis solidorum continentium eo, quo decet, ordine differamus, illud constituimus, ut rot solidorum ipsorum morbos decerni posse, quot sunt morbi, quibus eadem vitari possunt. Hujusmodi autem solida vitium patiuntur, primo dum parietes canalium, in quos ipsamet solida conformantur, plus æquo dilatantur, ut in aneurismate, quod in singulis quibusque cavitatibus majoribus, minoribus habere locum potest, quodque potissimum debetur vel inminuto partium tono, & elasticitati, itemque inminutæ resistantiæ ob laxatam, vulneratam, erosam in acrimonia alkalina alterutram ex arteriæ tunicis, vel arteriarum distractioni a lapsu, & quandoque etiam a valido conatu, vel plurimum auctæ sanguinis actioni in parietes arteriarum, quia dum sanguinis impetus increscit, ille agit in majore ratione contra superficies directe oppositas axi earundem arteriarum, quam in parietes ad axem parallelos, vel demum objici alicui, ut grumo, vel concreto polypo intra arterias adacto, quo fiat, ut magna sanguini retro adpellenti resistantia opponatur, atque adeo actio sanguinis in latera eo magis crescat, quo major est vis a corde impressa, & quo major inde orta vasis angustia, aut major est obex.

Se-



Secundo . Dum orificia nativa inmodice laxantur , & diducuntur , quod sane efficere possunt resolutio sphincterum , quos habent orificia , ut & si ea omnia , ex quibus producitur canalium dilatatio

Tertio . Dum fibræ canalium latera constituentes sic distrahuntur , & a mutuo contactu ita recedunt , ut factis interstitiis exsudare sinant humores , qui contineri debuissent : quod sane malum creant eadem causæ , quas superius exposuimus , itemque plethora insigniter aucta , simulque velocior excursus sanguinis per suos canales ; quippe superata vasorum resistantia a nimia copia , & majore momento contenti sanguinis contactus tunicarum vasa ipsa constituentium perpetuo distrahentis eorundem tandem unitas solvetur , scilicet vasa disrumpentur , quod quidem tanto facilius continget , quanto ad resistendum eadem infirmiora fuerunt , ob imminutam partium nutritionem ab excedenti plethora dimanantem , ex quo tum externæ , tum internæ fient hæmorrhagiæ plurimorum morborum procreatrices . Atque hinc , simulque ex iis , quæ supra diximus de plethora , conligi potest plethoricum hominem bene se se habere posse , & eodem tempore in magno vitæ discrimine versari , ut docet Hipp. aph. 3. sect. 1. dum ait ; *Boni habitus ad summum progressi periculosi sunt , si in extremo fuerint ; Neque enim manere possunt in eodem , neque quiescere : Quum vero non quiescunt non amplius in melius augescere possunt ; Reliquum est igitur , ut decidant in deterius ob has causas bonam habitudinem non tarde solvere convenit , quo corpus rursus renutritionis principiumumat . Sed præterea eundem morbum creat heterogenicum aliquod in sanguine*

genitum ; Siquidem in acrimonia alkalina fieri debet , ut ob actionem alkalinae materiae contractis nonnullorum canalium tunicis finitimae partes distrahantur , eo magis , quod inminuta diametro feriei alicujus canalium sanguineorum sanguis ipse dum per alios canales velocius , & uberius fluit , eorum augeat distractionem , atque inde cujusvis generis haemorrhagiae ortum ducant . Eadem dicas de acrimonia acida . Monuisse tamen juverit affectiones , quas haecenus recensuimus , non eo usque praeter naturam esse , ut in statu etiam sanitatis habere locum possint , nisi modum excefferint , & tunc demum morbis adcreaseri posse , cum finem , & modum transeunt .

Quarto . A solutione continui , scilicet ab eorum sejunctione , quae cohaerere debuerant , quod effici potest a causa tum physica , ut alio loco demonstratum est , tum etiam mechanica extrinsecus agente , secante , contundente , vulnerante , ut in phlebotomia , amputatione , paracenthesi .

Quinto . Ab obstructione per materiam aliquam in vasis haerentem , eorumque cavitates obcludentem , puta calculum , gypsum , vermes , pus , arenam &c. vel per materiam quampiam viscidam , grumosam , crassam , inflammatoriam , ut in acida praesertim , & alkalina acrimonia contingit . Et quidem sanguis incerto quopiam acrimoniae alkalinae gradu spumeum lentorem contrahit , difficilius lentiusque minima vascula preterfluit , eademque obstruit , in acida vero acrimonia eadem ex eo profluunt , quod lymphatica materia in arctiores contactus migrans , & minori idcirco fluiditate donata ineptior fiat ad motum , unde poly-

posæ



posse concretiones oriri possunt in vasis amplioribus, eorumque proinde cavitates angustari.

Sexto. A constipatione, sive ab angustatione viæ per tumorem aliquem, qui membranæ cavum vasis constituenti ab excrescentia carnis in canalium lateribus superaddatur.

Settimo. A compressione per externum aliquid eorundem canalium membranæ incumbens, eorumque sectiones inminuens, aut plane destruens cujusmodi sunt tumores, ossa fracta, luxata pondera, ligaturæ, potentiæ contundentes, contorquendo &c.

Ottavo. A crispatura, vel spasmo, scilicet constrictione ob auctam rigiditatem, & contractionem laterum vasa constituentium ab intensiori facto nervei fluidi motu, elasticitate, copia, & inde genito majori momento contractionis.

Nono. A conlapsu, & inanitione canalium.

Decimo. A coalitu, sive consolidatione parietum, quæ cavitates constituunt, quod quidem adfectionis genus infert post continui solutionem obducta cicatrix, callusve, conlapsus, compressio, contractio vehemens, ac diuturna, obstipans tumor, & quandoque etiam obstruens materia, quæ dum interne parietum superficiei adherens solidescit eorundem coalitum efficiat.

Undecimo. Tandem læsionem, & morbum patiuntur solida, cum a naturali, sibi que proprio motu recedunt, cum scilicet solidorum motus, vel nimium intenduntur, ut quando peristalticus intestinorum motus augetur in diarrhoea, quo intestinalis excretio sit major, vel quoquo modo iidem

motus depravantur , ut contingit in tremoribus artuum , vel tandem omnino pereunt , ut in syncope , asphyxia , apoplexia .

## C A P U T V.

### DE MORBIS SOLIDORUM INSTRUMENTARIORUM

**C**Orpus humanum in partibus suis firmis systema est organorum longe diversissimorum , quæ ita a natura fabrefacta sunt , atque invicem connexa , ut varios exserant motus , & actiones . Quoties igitur de naturali statu recedunt , tunc actiones illæ vel inmutentur , vel pereant necesse est , atque adeo plures , & varii excitentur morbi , prout vel pertinent ad substantiam partis in se seorsim considerata , vel ad ejusdem cum vicinis conjunctionem . Primi generis sunt continui solutiones , quò subsequentes species revocantur . I. Fractura , videlicet continui solutio in parte dura , ossea , cartilaginea e causis mechanicis profecta , ad quam referri potest fissura , præcisio , adritio &c. Has autem parit injuria a vi percutiente , tundente , secante , pungente inlata , quæ major sit ossium cohæsione . Hæc vero mala tanto facilius , sive a levioribus causis excitantur , quanto partes illæ ex lue venerea , scorbuto , rachitide , carie , acri gelu , senio , vel alio vitio fiunt fragiliores . Non solum autem innumera damna in animalem œconomiam derivantur ex multiplici ossium usu , quem tamen ipsa-



ipsamet ossa præstare eidem non possunt, nisi fuerint integra, sed & alia plurima humano corpori inferuntur ex irritatione, distractione, pressione, laceratione &c. quæ ab ossium fracturis in vicinas partes propagantur. II. Vulnus, sive continui solutio in parte solida non dura a vi mechanica proficiscens, ut sanguis, vel alius humor ex vasis effluat, atque huc revocantur contusio, punctura, ruptura, excisio, fissura &c. quibus omnibus vitari necessario functiones debent, quæ ab integritate partis ipsius profluunt, simulque ab humoribus intra cavitates suas delitescen-  
tibus, & ex naturæ lege circuitum suum absolventibus; unde mirum quot mala in animalem œconomiam redundent. In posteriori genere vitia continentur incongrui nexus, eaque ad excessum, vel defectum revocantur. Excedens tunc dicitur nexus, cum invicem coalescunt quæ disjuncta esse oportebat, aut quæ laxius cohærere debuerant, validius, arctiusque cohærent; sic digiti, labia, musculi, viscera, tendines &c. aliquando ita inter se, vel cum vicinis coalescunt, ut in suis muniis impediantur. Huc etiam referuntur symphyse ductuum ostiorum, hiatus naturalium; unde coalitus ad podicem, urethram, nates, genitalia &c. suboriantur. Sæpe etiam articuli ita obrigescent, ut eorum motus inhibeat, quod vitium anchylosin veteres nuncuparunt. Oritur autem, cum ligamenta ossium rigescunt, contrahuntur, cum internis partibus coalescunt, aut alia de causa vitiantur, vel cum deficit oleum, quo extrema ossium obliniuntur, aut idem inspissatur, aut alienus humor in articuli cavum effusus tumorem creat, aut ossium connis-

suræ

furæ rachitica labe tumescunt, aut intus prope articulum fracti ossis callus, exostosis, vel fungus erumpit, aut ulcus, vel caries late serpens partium firmitatem, cohæSIONem, figuram, levitatemque depravat. Huc etiam pertinet linguæ adstrictio, adeoque impeditus illius motus ob frænulum plus æquo durum, contractumque, vel ob cicatricem ex vulnere, aut ulcere sub lingua relictam; nec non coalitus palpebrarum, vel inter se, vel cum albo oculi, vel cum cornea, ob interpositam materiam glutinantem, aut cicatricem obductam. Deficiens contra tunc vocatur nexus, cum aut sejunctæ a se invicem sunt partes quas cohærescere oportebat, aut inter se laxius nectuntur quæ arctiori vinculo cohærere debuissent. Huc pertinent recessus cartilaginum, epiphygium ab ossibus, articulorum infirmitas ob nimiam ligamentorum debilitatem, plus æquo laxior linguæ cohæSio.

Præterea sunt adfectus partium in situ mutato, quæ vocantur ectopiæ, quæque in varia genera dividuntur; sunt autem.

Luxatio, scilicet articuli de sede sua in alienum locum decessio, qua motus vitatur, planeque pervertitur, itemque subluxatio, ossis nempe pro parte tantum, nec omnino extra crepidinem sui acetabuli secessio. Harum autem successionum, quæ tantummodo locum habent in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis principia, seu causæ sunt vis externa certe major naturali robore articuli, ut ictus, lapsus, saltus, nisus &c. convulsiva, vel spasmodica musculorum contractio, eorundem paralyfes, ligamentorum capsularum articularium debilitas, re-  
laxa-



*laxatio*, *dialysis*, *elongatio nimia*, *intumescentia*, *conlectio synoviae lentescens*, *induratae*, aut etiam *feri*, *puris*, *alteriusve succi in cavis articulorum*, *acetabulorum intumescentia*, horumque *protuberantia ab excrescentia*, & *callo intus erumpentibus*, *schirroideus glandularum mucilaginosarum tumor*, ac tandem *capitum ossis intumescentia*.

*Diastrasis*, videlicet *offium*, & *cartilaginum immobiliter connexorum seunctio*, vel *recessus ab invicem partialis*, aut *totalis*, *cujus causae sunt vel externae*, vel *internae*. *Causae externae sunt ictus*, *lapsus &c.* *internae vero esse possunt hydrocephalus*, *narium polypus*, *protuberantiae quaelibet intus erumpentes*, *graviditas*, *partus*, *lues venerea*, *scorbutus*, *incrementum inaequale cartilaginum ossa nectentium*, *pondera*, *pressiones*, *situs*, *constans denique nonnullorum musculorum hypertoria*.

*Loxarthrus*, scilicet *perversio capitum ossis*, & *musculorum adpensorum*, *cujus saltem praecipuae causae sunt varii motus vehementissimi*, *cartilaginis obducentis acetabulum*, vel *caput ossis incrementum majus in uno*, quam in *altero latere*, *exostosis partialis acetabuli*, *materies topthacea totum articuli cavum occupans inaequaliter*, vel *tantummodo lateralem ejus partem citra anchylosin*, *tensio musculorum*, & *ligamentorum major in uno latere articuli*, quam in *alio ab hereditario vitio profecta*, vel a *pravo situ in utero*, ab *ossibus infantis rudius tractatis ab obstetricia manu*, a *mala fasciatione*, aut *validiori pressione inter brachia*, a *pravo demum situ*, eoque *diuturno*.

**Loxarthrus** tum **anisotonicus**, videlicet artuum, & maxillæ inferioris deflexio ab inæquali musculorum, ac ligamentorum tensione, itemque **loxarthrus intrarticularis**, deflexio nempe artuum a mutata partialiter libella superficierum articulatarum, quarum deflexionum causæ ex dictis haud difficile intelligi possunt.

**Enteroceles**, hoc est hernia intestinorum, cum scilicet intestina e sede sua naturali dilabuntur, & intra cavum alterius partis mollis recipiuntur. Hujusmodi causæ ad ea omnia referuntur, quibus laxari possunt sustentacula, vel claustra interiorius solvi, qualia sunt ictus externi citra continui solutionem, vulnera, cicatrices iterum dehiscentes, aposthemata, vehementes nifus deorsum directi, serum exsuperans, oleosa, pinguedinosa, usus aquæ calidæ &c. Est autem **Enterocela** vel **umbilicalis**, vel **ventralis**, vel **vaginalis**. **Enterocela fumbilicalis** plerumque infantes, & fœminas prægnantes, ac **dystocice enixas** invadens est **umbilici protuberantia**, quæ magnitudine variat, quæque ab intestino in peritonæi saccum provoluto ortum ducit; **Ventralis** est **protuberantia**, cujus edes plerumque est in **linea alba**, vel **semilunari**, vel **supra anulos**, & **arcus circulares**. Hanc parit intestinum laxatas **aponeuroseon fibras**, & **peritonæum** agens in sinum, vel eundem peritonæi saccum trans diductos musculorum fasciculos cogens. Utraque tamen **Enterocela** oriri etiam potest a **ruptura peritonæi**, quam creant solutio excitata a penetrantibus imi ventris vulneribus tum accidentalibus, tum artefactis, ab **apostemate**, a **cicatricibus iterum dehiscentibus**, Denique **enteroccele**



teroceles vaginalis est protuberantia albida, mollis vaginam primum occupans, deinde vero labia vulvæ supereminens intestino ulterius provoluto. Hæc ab intestino ipso formatur, quo vaginæ parietes multiplici partu labeſacti, laxatique vim patiuntur, & extra idcirco excedunt.

Epiplocele, seu herniosa protuberantia ab omento effermata per inguinales anulos, arcus crurales in anulo umbilici trans vaginæ parietes, vel abdominis musculos elapso. Iisdem cauſſis debetur epiplocele, quibus enteroceles, iisque addi potest nimia omenti pinguedo, ejusque ruptura ad superiora.

Gastrocele, five hernia ventriculi; Hanc facit ventriculus ipse trans laxatos, diductos epigastricæ regionis parietes, quin & per anulum umbilici elapsus ad distantiam duorum digitorum transverſorum a cartilagine xyphoidea. Hujus cauſſæ sunt vehemens vomitio spontanea, vel ab emetico procurata, vehemens item editus nixus in ponderibus elevandis, violenta scapularum retractio ad posteriora, aliaque hujusmodi.

Hysteroceler, scilicet hernia uteri. Hanc efficit ipsemet uterus trans inguinales anulos laxatos diductosque inferioris medietatis imi ventris parietes elapsus; Dividitur in inguinalem, & ventralem; Utriusque vero cauſſæ sunt ictus validi in ventrem, vehementes editi nixus, prægressa solutio peritonæi a vulnere, aut abscessu curatis præſente vel adcedente graviditate.

Cystoceler, hernia scilicet vesicæ urinariæ. efficitur cystoceler a vesica ipsa trans inguinales anulos sub arcubus cruralibus, & per laxatos, didu-

diductos perinæi, hypogastrii, & vaginæ parietes elapsi, & in inguinalem, cruralem, perinæalem, hypogastricam, & vaginalem dividitur, quarum omnium causæ ad ea omnia revocantur, quibus laxantur fibræ, earumque tonus infringitur lenta, vel subita distractione. His adcenteri possunt ampliatio parietum vesicæ ab urina retenta, singularis vesicæ figura ab utero efformata durante graviditate, tractio ab aliis visceribus prolapsis, distentio, debilitatio que parietum vaginæ a multiplici partu, fibrarum denique muscularium tum vesicalium, tum vesicæ circumpositarum secessiones ab invicem a distensione prodeuntes.

Encephalocèle, sive hernia encephali. Hanc parit cerebrum, cerebellum, aut utrumque per hiatus ossium cranii non penitus in substantiam osseam obrigescentium prorumpens, ejusque causæ sunt molitudo nimia ossium cranii, ejusque molitudinis inæquabilitas, hydrocephalus, partus difficilis, ac diuturnus, & pressio quæcumque externa major in una cranii parte, quam in reliquis.

Exania, scilicet sphincteris ani, & intestini recti inversi procidentia. Hanc faciunt planctus, clamores, dejectio fœcum duriorum cum ingenti conatu, fluxus alvi, creber acriorum purgantium usus, hæmorrhoides, ascarides, ulcera, calculi, dystocia, discissio musculorum ani levatorum in lithotomia, sessio diuturnior in fellis perforatis &c.

Exocyste, sive procidentia membranæ tum vesicæ corpus, tum ipsius collum interne obvestientis facta per meatum urinarium. Eam pariunt



riunt ureteres in sua infectione obstructi, dystocia, verbera in ventrem &c.

Hysteroptosis, nempe uteri, vel vaginæ inversio. Proficisci potest inversio uteri a partu, a polypo, ab excedente menorrhagia, aut leucorrhoea, ab obesitate, a vehementi edito nisu, nec non a tumefactione, & scirrhus uteri. Inversio autem vaginæ pendere potest a gestatione ponderum graviorum, a dejectione fœcum cum conamine, ab incessione nimia, a duriori vaginæ tractatione, diuturna leucorrhoea, dystocia, a neglecto decubitu post partum &c.

Huc etiam pertinent parorchidium, serior nempe testiculorum descensus, vel retractio, hysteroloxia, seu obliquitas uteri, paraglossæ, scilicet linguæ in fauces revolutio, vel extrusio ab ore, hypostaphyle, seu prolapsus uvulæ, exophthalmia, sive bulbi oculi procidentia, de quibus consule Viros Cl. *Gaubium*, & *Sauvagesium*.

## C A P U T V I.

### DE SEMINIS MORBORUM.

**S**emina morborum eas humano corpori insitas dispositiones adpellamus, quibus excitantur morbi, quoties potentia nocens analogæ adcesserit. Hujusmodi morborum semina sunt vel naturalia communia, vel naturalia propria, vel præternaturali. Ad priorem classem revocantur præ ceteris  
 coha-

cohæſio partium humani corporis , earumque nex-  
 us haud inſuperabilis , multitudo fluidorum , eo-  
 rumque multiplex modus , & indoles facile varia-  
 bilis , fibrarum irritabilitas , numerus ingens ,  
 ſubtilitas inſignis , & implicatio mira canalium ,  
 ſuperficies undique patens porulis , & meatibus ,  
 ſtatæ deſum leges mutui inter mentem , & cor-  
 pus commercii . Ad alteram claſſem referuntur ea  
 omnia , quæ propria ſunt cuivis homini ex inſti-  
 tuto naturæ , quibus efficitur , ut alii ſint præ-  
 aliis ad certos quosdam morbos ſuſcipiendos pro-  
 cliviores . Ad hunc item locum pertinent ætates ,  
 ſexus , temperamenta , & pathemata . Ad poſtre-  
 mam vero claſſem præſertim ſpectant adfectiones ,  
 diſpoſitioneſque tum in utero matris contractæ ,  
 tum ex lacte nutricis obortæ , debilitas , rigiditas ,  
 irritabilitas , & torpor partium ſolidarum , vitia  
 fluidorum , plethora , non nulli morbi ſolidorum ,  
 tum continentium , tum instrumentariorum , de  
 quibus ſupra egimus .

## C A P U T V I I .

### DE SYMPTOMATIBUS SINGULATIM .

**C**Um in ſymptomatibus præcipuus lateat fons ,  
 ex quo ea omnia depromuntur , quæ faciunt  
 ad morbi naturam , diagnoſim , & prognofiſim e-  
 ruendam , neceſſe eſt , ut Medicus ſingulorum ca-  
 uſſas , ſedes , variasque relationes ad morbum per-  
 ſpe-



spectas habeat, ut iisdem uti legitime possit, simulque ad perfectam cognitionem morborum compositorum pervenire, utpote qui ex diversa symptomatum concursione coalescunt. Licet autem ingens sit symptomatum numerus, refertur tamen commode ad symptomata in qualitatibus sensibilibus alienatis, seu præter naturam adfectis, quæ dicuntur symptomata in qualitate mutata, ad vitia excretorum, ad ea scilicet omnia, quæ vel retinentur in corpore, vel excernuntur, quæ vocantur symptomata in excretis, & retentis, denique ad actiones corporis læsas, & nuncupantur symptomata in actione læsa. Ad priorem classem revocantur.

Color cutis, quem præsertim mutant interceptus, vel nimius humorum influxus, eorum fusio a materiis acribus, pungentibus profecta in fibras cutis plus minus agentibus, vitiosum aliquod in sanguine genitum fermentum, aut materia per morsum venenati animalis in sanguineos canales transfusa, quibus a sanguinea massa solutis serum ipsius sanguinis præternaturali colore inficitur, humorum secretiones impeditæ, eorundem corruptio, adfectus animi &c. unde omne genus morbosæ decolorationis explicari potest, siue decolorationes ipsæ in universo corpore sedem habeant, ut contingit in morbo regio, hepatico, splenico, leucophlegmatico, & hujusmodi, vel in una tantum, aut in pluribus simul partibus, dum inflammatione, abscessu, gangræna, carbunculo, erysipellate &c. adficiuntur.

Graveolentia acida, rancida, putrida de corpore erumpens. Eam creat, ut alibi diximus, he-

terogeneum, vel acre in sanguine genitum, vel putrida solutio in corpore inchoata, cujus theoria ex iis, quæ alio loco declarata sunt, intelligi facile potest.

Calor corporis ultra modum auctus. Excedens hic caloris gradus hæmatosim ponit intensive auctam, indolem sanguinis inflammatoriam, heterogeneum, vel acre alkalinum, aut oleosum in illo genitum, auctum vitalem motum tum ab inritamento extrinsecus inlato, tum intus excitato, & pro sede, numero, intensitate, duratione conditionum concurrentium plus minus se se intendente, & vel corpus univrsam, vel unam tantum partem adficiende. Quos autem pariat effectus alibi dictum est.

Frigus, quod hæmatosim ponit intensive inminutam, adeoque acrimoniam acidam in sanguine luxuriantem, motum vitalem inminutum, & similia. Hujus autem effectus aliunde repeti, & explicari possunt.

Durities, elasticitas, siccitas partium morbosa. Hujusmodi adfectiones oriuntur ab alkalina sanguinis acrimonia. Cum enim sanguis ipse in acrimonia illa stimulantem indolem, naturamque contrahat respectu fibrarum, quas adluit, consequens est, ut in alkalina, itemque oleosa acrimonia componentes solidorum particulæ contrahantur, earumque proinde durities major fiat; elasticitas vero adhuc etiã intendatur, idque tanto magis contingat, quod ob auctam hæmatosim nimia aqueæ materiæ copia extrahatur, unde siccitas proficiscitur, & nutrientis materiæ consolidatio promovetur. At in certo quopiam, eo-  
que



que infimo acidæ , & similium acrimoniæ gradum minor fieri debet earundem fibrarum muscularium durities , elasticitas , & siccitas , nisi forte in illis fluidum vehiculum deficiat ; Quippe sanguis , qui in acida acrimonia ad summum progressu plurimum heterogeneus evadit relate ad fibras ipsas , sive cum illis vix , ac ne vix quidem adtrahitur , refracta , inminutaque eadem acrimonia minus fieri debet heterogeneus , scilicet ab iisdem fibris aliquantum adtrahi , unde minor illarum durities , elasticitas , siccitasque profluit .

Lævitas superficiei corporis vitiata . Hanc præ ceteris creat senium . Et quidem in senibus cum nutritio imperfecte , ut alibi diximus , perficiatur tum ob languide procedentem hæmatosin , & nutrientem idcirco laticem minus perfecte elaboratum , minusque solidis partibus homogeneum , tum ob perennem fluidarum , & humectantium substantiarum exhalationem , hinc fieri debet , ut musculares substantiæ integumentis subpositæ mole undique minuantur , nec amplius valeant ad integumenta ipsa , ut par est , distendenda , atque hæc proinde in plicas , & quasi sulcos contrahantur . Eandem etiam efficiunt integumenta in callum durefcentia , sive cuticulæ incrassatio a lamellis sibi invicem adpositis , dum vascula a pressione quacumque , & compressione concrescunt , & indurantur , cicatrices , sive solutionis continui restorationes , & concretiones per filamenta vasculosa prius discissa , erosiones ab acri materia , multiplices , & variæ eruptiones &c.

Tumorum omne genus aut universam corporis superficiem , aut aliquam tantum partem ad-

ficientinm . Oriuntur autem tumores ab humorum effusione , rarefcentia , congestione , obstructione , adfluxu nimio in partem , refluxu impedito , fractura , luxatione , herniis , prolapsu , mala conformatione , exostofi , fungo , sarcomate , condylomate &c.

Gracilitas denique corporis , vel partis singularis . Pendet hæc ab inopia succorum , a deficienti eorum influxu , & præsertim fluidi nervei , solidorum contractione , evacuationibus excedentibus , e languida , aut cessante circulatione , vi vitæ exsoluta , metastasi , gangræna &c.

Quoad vitia excretorum observandum est hæc tripliciter peccare , scilicet aut tota substantia , aut toto genere , aut quantitate , aut qualitate . Ad excreta toto genere , præternaturam revocantur I. Ea omnia , quæ nullo pacto dici possunt naturalia corporis elementa , ut pus de nonnullis corporis partibus effusus , variæ concretiones , & alia hujusmodi . II. Quæ præternaturali ratione e corpore eliminantur , ut dum fœces intestinales per vomitum rejiciuntur . III. Quæ excernuntur , dum contra retinenda fuerant in corpore , ut cum sanguis ejicitur vel per nares , vel per os , vel per alvum , vel per urethram &c. unde illud habetur Medicorum effatum , *profluvium sanguinis , quomodocumque fiat , excretionem esse toto genere præternaturam* . Et sane exitus sanguinis e corpore enunciat insigne aliquod adesse corporis vitium præsertim aperitionem vasorum , eorumque erosionem , & similia . Et quamvis interdum contingat , ut per hanc hæmorrhagiam animale corpus ab aliquibus morbis explicetur , id tamen nihil obstat , quo-



quominus excretio sanguinis, ut est excretio, mala sit; fluxus quippe sanguinis, quibus nonnunquam judicantur morbi, sunt fluxus sanguinis a naturali constitutione recedentis, pravisque humoribus inquinati, ex quibus tamen vires corporis infringuntur; Hinc illud requiritur maxime, ut Medicus in hisce fluxibus cautione, & solertia utatur, illudque præstet, ne excretiones ipsæ modum excedant, viresque debilitent. Qualitate vero multipliciter peccant excreta, scilicet colore, odore, fluiditate, visciditate, durtie &c. ut dum alvinæ fœces duriores, aut liquidiores, quam par est, excernuntur, nec recte coloratæ, sed modo flavæ, modo albæ, modo cineracæ, aut alterius morbose coloris, & sic de ceteris. Demum quantitate peccant excreta, cum majore, aut minore copia e corpore expelluntur. Retenta vero morbosum effectum ex eo tantum constituent, quod vitiose detineantur in corpore. Sed de excretis, & retentis vide quæ alibi dicta sunt.

Denique actiones læsas quod adtinet, plurima hic nobis se se obferunt considerata; et i. dolor. Intelligitur hoc nomine non ea tantum sensatio vivida, ac molesta, quæ ex distractione profluit fibrarum nervearum, cum scilicet partes sensu dotatæ vi externa, internave distrahuntur supra, quam ferre commode valeant, aut percussione, compressione, contusione, strictione, vulnere, contorsione læduntur, aut acrimonia aliqua stimulantur, nimiaque liquidorum homogeneitate eroduntur, sed quidquid etiam animam adficit, angit, vexat ex corporis affectione dimanans. Hinc innumeros morbos, ut symptoma comitatur,

præsertim vero morbos cavitatum excedentium, inminutarum, deficientium, fracturas, luxationes, hernias, procidentias, tumores, plethoram, cujuslibet generis acrimoniam, vitiatos fluidorum motus &c. si vehemens sit dolor inquietudinem excitat, pervigilium, angorem, laborem, delirium, ecclampsiam, irritamentum in parte adfecta, tensionem, spasmus, majorem humorum adfluxum, congestionem, difficilem transitum, calorem, inflammationem, gangrœnam, frigus, torporem, insensibilitatem, resolutionem &c. & ob mutuum cum aliis partibus consensum dolores in illis creat, spasmos, paralyfim, perturbationem vitalis circuitus fluidorum, febrim, syncope, & plura alia mala. Huc revocari potest pruritus, sensatio nempe dolori proxima qualis accidit in multis morbis exanthematicis, ut rubeola, variolis, scarlatina, scabie, tinea, herpete, psydracia, aurigine, uno verbo quam infert multiplex acrimonia, itemque pruritus ille, vel stimulus, quo ægrotantes ad sternutationem, tussim, oscitationem, pandiculationem, excretionem urinæ, alvi &c. compelluntur. Referri huc etiam potest anxietas, molestissima nempe sensatio ex dispositione corporis oriunda; scilicet invadit anxietas, quoties impeditur excretio materialium excernendarum, puta lotii, alvi, sanguinis, sudoris, perspirabilis Sanctoriani &c. vel quoties natura molitur criticas evacuationes, vel nitimur extraneas materias, & noxias e corpore eliminare, ut calculum, venena, flatus conclusos &c. Oriri eadem quoque potest ab inmeabilitate sanguinis per cor sinistrum, & majores arteriæ ramos



mos in morbis acutis, febrilibus, vel per dextrum & ramos arteriæ pulmonaris ab infarctis canalibus sanguineis tum arteriosis, tum venosis in morbo acuto pulmonum, vel ab impedito transfluxu per venam portarum in morbo acuto febrili, vel ab objice circulationi opposito intra, aut prope cor existente, ut polypo, coagulo sanguinis, aneurismate &c. Eam pariter excitat multiplex vitium pulmonis, infarctus nempe, spasmus, tumor, ulcus, vomica, compressio extrinsecus orta a sanguine, pure, tumore, aut alio thoracis adfectu, vitium item diaphragmatis, & musculorum respirationi famulantium, excedens denique aeris calor, levitas, humiditas &c. nec non varia ejusdem labes, & inquinamentum puta a fumo sulphuris, a vaporibus vitriolicis &c. sed & vehementem præcordiorum, & stomachi anxietatem pariunt hysterici, & hypocondriaci morbus, præsertim si mulieres hystericae, & homines morbo hypocondriaco laborantes per cathartica acria exagitantur, cujus quidem anxietatis causa non alia est, quam tensio supra modum aucta membranarum, ex quibus nervi coalescunt. Denique ingens excitatur anxietas, dum vis vitæ labare incipit, pendetque a debilitate nimia naturæ, quæ non amplius sufficit resistentiis circulationi oppositis superandis.

II. Tactus læsio, quæ vel inminutionem ipsius, vel nimium acumen complectitur. Inminuitur tactus a nimia cutis rigiditate, laxitate, vasculorum ejus contractione, infarctu, contusione, gelu, igne, gangræna, epidermide indurata, incrassata, aut a subjecta cute ob interpositum se-

rum, pus, sanguinem sejuncta. Nervi quoque sensum tactus minuunt, si vel quomodocumque comprimantur, contundantur, vulnerentur, erodantur, extenuentur, exsiccentur, emolliantur, ab usu narcoticorum, & similium substantiarum adficiantur, aut denique a materia morbosa sic inficiantur, obstruanturque, ut spiritus animales per eosdem fluere non amplius possint. Contra vero tactum acuunt, adtrectationemque vertunt in dolorem vulnera, inflammationes, abscessus, contusiones, dolores hysterici, podagrici, spasmi, involcrum denique organorum vel nimis tenue, vel plus æquo tensum, vel avulsum.

III. Gustus læsio ad inminutionem pariter ipsius, vel nimium acumen referenda. Utrumque vitium ab iisdem fere causis, quas supra exposuimus, proficisci potest. Profecto nullius, aut saltem remissioris saporis sensus a corporibus excitatur, si involcrum linguæ ita crassum fuerit, ut salinæ particulæ ad nerveas papillulas pertingere non possint, ut patet, vel si nimis arescat lingua ipsa, vel nimio obducatur humore salivali, vel humor ipse non naturali modo se se habeat. Et quidem deficiente humore salivali deest menstruum, quo solvantur necesse est salinæ corporum particulæ, ut linguæ poros subire possint. Contra vero si nimius sit oris humor, solvuntur quidem salinæ illæ particulæ, sed eidem menstruo innatant ita distractæ, ut in nerveas linguæ papillulas agere vix possint. Quod si humor ipse vel amarus fuerit, vel dulcis, ut in scorbuticis, vel alia quacumque labe inficiatur, amaritiei quoque, vel dulcedinis &c. sensationem efficiet. Inter-



terdum etiam salivalis humor minimam vim habet, ut proinde impar sit salinis materiis dissolvendis, quemadmodum in nonnullis fluxionibus, & in nimia linguæ mucositate contingit. Linguæ paralyfis, delirium, morbi quicumque soporosi facultatem subprimunt, qua diversi sapes percipiuntur.

IV. Olfactus læsio. Hic pariter sensus ex causa morbosa quandoque acuitur, sæpius vero obtunditur, & aboletur. Acuitur olfactus, si membrana narium oblinientis muci defectu nimium tendatur, vel morbi tum acuti, tum chronici ita nervulos adfecerint hujusce sensus proprie, vel universum systema sensorium, ut nervorum substantia flexilior fiat, mollior, rarior, nerveique fluidi elasticitas intendatur. Hinc maxime occurrit in hysterics, hypocondriacis, & hydrophobis. Obtunditur contra, & aboletur a nimia ejusdem membranæ pituitariæ siccitate in febribus, morbisque inflammatoriis, hujus mucositate nimia, ut in coryza, infarctu, ut in ozaena, obstructione narium, ut in polypo &c. ab usu nimio tabaci præsertim hispanici, ab inspiratu tenuissimi, aridique pulveris, quibus fibrillæ nervæ exsiccantur, a morbis quibuscumque soporosis, paralyticis, a contumaci nervorum olfactoriorum obstructione, compressione. Depravatur præterea olfactus, quoties ejus organum ob olente materia adficitur, puta muco, ichore, pure, a raudicis, putridis corruptis &c. in cavernis narium, in pulmonibus, trachea hospitantibus.

V. Auditus læsio, ad quam refertur 1. dyscæca, hoc est audiendi difficultas ob sonorum ob-

scu-

scuritatem . Vitiosa organi structura , qua debilitatur , aut impeditur transmissio undarum soni ad labyrinthum , dysecaeam parit . Hinc defectus alterutrius , vel utriusque auriculæ , obstructio meatus auditorii a tumefactis alvearii glandulis , a congesto induratoque cerumine , a peregrinis in meatum ipsum inlapsis corporibus , itenque atonia myringæ , seu membranæ tympani a prægresso catharro , ab excepto vento humido , otirhaea serosa , ejus pariter durities a senectâ , a glandulis tumidis , viru syphilitico , erosio a pure , fistula tympani a carie ossium ipsius tympani , hujus hydrops , obstructio tubæ a quacumque causa sunt totidem principia dysecaeæ . 2. paracusis barycoja , vel gravitas auditus , nempe adfectus , in quo ea , quæ altiori voce proferuntur , aures confuse , & vehementer percellunt , at non intelliguntur . Pendet hic adfectus a rigiditate , crassitie , infarctu rheumatico musculorum mallei , & stapedis . Sic enim , ut docet *Sauvagesius* , adfecti muscoli myringam , & fenestram ovalem aptare , ac tendere non possunt ad eum gradum , qui respondet tono chordarum vocalium loquentis , nec cuiquam ex illius harmonicis altioribus tono loquentis . 3. Paracusis oxycoja , summa nempe sensilitas auditus , quam soni intolerantia ita comitatur , ut inde dolor , convulsio , delirium , & animi etiam defectio suboriat . Debetur hic adfectus nimix tensioni , siccitatieque organi aoustici , cerebri , nervorum , membranarum , nimixque fibrarum irritabilitati . Hinc maxime recurrit in morbis harumce partium acutissimis inflammatoriis , spasmodicis , dolorosis , in mania , melancholia , & in hystericiis , hypo-

con-



condriacis , vigilantibus &c. IV. Demum cophosis, obscura nempe sonorum omnium perceptio , five impotentia sonos quoscunque percipiendi. Oritur hic adfectus ab obturatione meatus auditorii externi , five cerumen aurium copiosum , & inspissatum vices gerat obstaculi , five inlata corpora meatum ipsum obstruxerint . Oritur etiam ab obturatione tubæ Eustachianæ ob tumores in illius exitu versus nares posticas , vel ob evalitionem , aut increffationem parietum hujusce tubæ ab exulceratione profectam , vel etiam ob sordes mucosas , viscidasque eandem infarcientes . Oritur denique tum a membrana tympani introrsum depressa , aut plane rupta ob ingentem fragorem , unde *Aristoteles* sapientissime pronunciavit a magnis nimium sonis fieri surdaftros , vel nimium rigida ob susceptum frigus , vel nimium laxa ob excedentem aeris humiditatem , tum ab abscessu varioloso , tum a syphilitide inveterata auriculam , & ductum auditorium inficiente , ibique ficos herpetes excitante , & , quod deterius est , tubam exulcerante , obturante , obliterate , inque aure media , & interna exostoses efficiente , tum denique a sero exundante , a comate , ab amisso utroque malleo , & alrera incude , aliisque causis , de quibus consulantur Auctores .

VI. Visus læsio , ad quam refertur 1. glaucosis , vel cataracta , scilicet visus abolitio , quæ sensibili opacitate pone pupillam conspicua stipatur . Hanc præ ceteris inferunt crySTALLINUM intus subpuratum , hujus a nativa sede dimotio , vitrei dissolutio in rerum subluteum putre &c. 2. Caligo , hoc est visus imminutio partialis , vel totalis  
ob

ob repagulum opacum oculo citra pupillam inhærens. Eam præsertim creant palpebræ superioris coalitus cum oculi globo, vel palpebræ superioris cum inferiori, lapsus palpebræ ipsius superioris ob resolutionem musculi palpebram adtollentis, ita ut corneam obumbret, ejusdem incrassatio a tuberculis, verrucis, excrescentiis &c macula sub lucida corneæ ob guttulam aquæ inter corneæ lamellas congestam, aut lympham opacatam, ut post variolas, & ophthalmiam contingit, cruor effusus intra cameras oculi, congrugatio corneæ, hujus hernia, sarcoma, cancer, lupia &c. 3. amblyopia, seu visus habetudo. Hunc morbum efficit rerum in sanguinea massa redundans, & organa visus, ac præcipue retinam adficiens, & laxans, hujus minor sensibilitas, rigiditas uveæ, hydrophthalmia &c. 4. Myopia, visionis nempe vitium illud, quo objecta paulum distita confuse, proxima vero distincte cernuntur. Hujusmodi vitium inde profluit, quod radiorum lucis adunatio fiat antequam ad retinam pertingant, seu radii una simul coeant pone crystallinum. Pluribus autem de causis coire possunt radii pone crystallinum, antequam pervenerint ad retinam, & ad sequentes revocantur, scilicet ad majorem vim refringentem aquei humoris, & crystallini; ad distantiam retinæ majorem a cornea, & crystallino; ad distantiam nimiam objectorum; ad nimiam pupillæ dilatationem, & focum proinde lenti proximiorum; ad corneam demum nimis convexam, ut & ad faciem externam crystallini, quæ omnia constant ex opticis. 5. Presbyopia, visionis nempe contrarium priori vitium, quo nimirum proxima



xima confuse, remota distincte cernuntur. Vitium hoc ex eo nascitur, quod serior fiat adunatio radiorum a proximis objectis emanantium, scilicet ultra retinam. Serior hæc radiorum adunatio ex causis profluit, quæ myopiæ causis contrariæ sunt ut per se patet. 6. Luscitas, visionis scilicet vitium illud, quo objecta e directo oculis obversa confuse, oblique vero oculis oblata distincte cernuntur. Luscitas adcidit, vel quia pupilla oblique posita est, ut propterea plures excipiat radios obliquos, quam directos, vel quia oblique situs est crystallinus, ejusdemque axis non est idem cum axe oculi, vel quia convexitas, aut pelluciditas corneæ depravata est, ut plures idcirco radii ab alterutro latere excipiantur, quam si directe accederent, vel tandem quia polus nativa caret sensibilitate, quo efficitur, ut aliorum dirigere visum cogatur luscus, ut acutius videat. His luscitatis principiis originem quandoque præbent partialis adhæsiō palpebrarum, variæ strabismi species &c. VII. Amaurosis, nimirum subpressio, vel abolitio visus. Hujus principium est inmeabilitas nervorum opticorum sive in thalamis, sive in tota retina, sive in tractu compressus fuerit, vel obstructus, vel resectus nervus a cerebri læsione, fractura, contusione, vulnere, spasmo, scirrho, tumore, hydrocephalo, vel alia qualibet læsione. Hujus pariter principium esse potest lux ipsa subito inruens, fulgentesque radios undique circumfundens, ut ostendit crudelissimus ille mos Dionysii Siculi captivos excaecandi. 8. Vertigo, seu visionis depravatio illa, in qua circumfusa objecta licet inmota videntur tamen in gyrum  
verti

verti. Causa vertiginis est quidquid retinam, vel opticorum nervorum truncos concutere valet, proindeque a nimia sanguinis copia, & rarefcentia, ab intercepto hujus fluxu per quosdam cerebri canales, a validiori, uberiorique ejusdem motu versus superiora, ab ictu, a concussione coronam ciliarem spasmodice constringente, a venenis, & a vehementiori nervorum irritatione proficisci potest. 9. Strabismus, hoc est adfectus tonicus alterutrius oculi, quo efficitur, ut alter axis opticus cum altero minus convergar ad visionem. Strabismus pendere potest a debilitate alterutrius oculi, ab altero musculo unius tantum, vel utriusque oculi convulso, a paralyfi similis indolis in alterutro musculo. 10. Tandem suffusio, sive hallucinatio visus circa objecta, & diblophia, seu visus duplicatus huc pariter referuntur. Hujusmodi fallacias creant mala præsertim spasmodica, paralytica cerebrum, nervos opticos, retinam, & oculorum musculos adficiunt. De his vide inlustrissimum *Sauvagesium*.

VII. Sensuum internorum læsio, sive delirium. Definatur autem delirium error mentis judicantis a vitio cerebri proficiscens. Quæ igitur corporis callosi, generisque nervosi tenorem, itemque nervi fluidi motum, elasticitatem, & copiam variare possunt, ea omnia maxime valebunt ad delirium excitandum. Hujusmodi sunt morbi graves diu potrahi, evacuationes nimix, vehementes, diuturnique motus animi, pervigilium, sanguis tenax, crassus, & expers aquei vehiculi, siccitas, rigiditas, infarctus fibrarum sensorii, intensior humorum circuitus sursum directus, nimia



mia fibrarum nervearum irritabilitas , cerebri compressio , conmotio , fractura , vulnus , abscessus , hydrocephalus , mala apopletica , epileptica , hysterica , venena , imaginationis demum organa non bene evoluta . Hujus species sunt paraphrosyne , amentia , melancholia , mania , de quibus consulantur Auctores . Huc pertinet amnesia , quam pariunt usus veneris immodicus , senium , vulnus capitis , percussio , febres acutæ , diuturnus capitis dolor gravativus , pathemata , plethora , temulentia , opium , & venena dementantia . Huc denique spectat & agrypnia , quam fovant acrimonia , arthritica , pathemata , mala hysterica , hypocondriaca , contumaces capitis dolores , sensationes omnes molestæ , febres , indigestiones , senium &c.

VIII. Motricis facultatis læsio , quo revocantur . 1. Tetanus , insignis nempe , & constans totius corporis rigiditas cum respiratione difficili , & sensuum integritate . Rigiditas hæc ab auctis nervei fluidi motu , elasticitate , & copia proficiscitur , atque adeo ab aucta vi contractionis in partibus muscularibus ; Unde intelligitur tetanum oriri etiam posse a causis extra caput agentibus , ex gr. a vermibus ob consensum systematis nervosi , ut præ ceteris observavit *Bilfingerus* , qui tæniam sæviente tetano eduxit ope pulveris a *Medio* celebrati . *Sauvagesius* , qui varias tetani species enumerat , hujus morbi causis coagulationem etiam sanguinis musculos adluentis ad censet . 2. Convulsio , motus nempe spasmodicus clonicus in artubus . Plura sunt , quibus originem debet suam convulsio , puta inanitio , punctura nervi , capi-  
tis

cis ictus, hydrocephalus, masturbatio, irritantia omnia. 3. Paralysis, seu unius tantum artus, aut articuli immobilitas. Hujus causæ sunt quæcumque motum nervei fluidi per suos canales, vel musculorum texturam vitare potest, ut propterea musculus minus sit aptus ad contractionem. Hoc autem vitium creant plethora, aneurismata, fumi arsenicales diversorum mineralium intus excepti, vulnera, ulcera, ictus nervum partis solvens, materia rheumatica, biliosa, virus schrophulosum, scorbuticum, serum exundans, mora in locis humidis, recenter extractis, intempestivus aquarum mineralium potus &c. Huc referri possunt hemiplegia, paraplexia, tremor, rigor, pandiculatio, carphologia, quorum sane morborum causæ ex dictis haud ægre intelligi poterunt.

IX. Motuum vitalium læsio, quo referri primum potest læsio respirationis. Hanc parit angustata cavitas cellularum pulmonis, aut bronchiorum, omniumque canalium, quos aer ingreditur quod sane ex pluribus causis pendere potest, scilicet a vitio cordis, arteriæ magnæ, aut pulmonalis, venarumque insigniorum, quæ in thorace continentur, a calculis, aut tuberculis in pulmone genitis, a lymphæ, sanguine in canalibus pulmonum hærente, aut in cellulas exundante, a plethora, infarctu viscerum hypocondriacorum, a vomica, a contuso, icto thorace, a gastrocele ab hydrothorace, a pinguedine, ab empyemate, a fumo sulphuris, a vermibus, ab inanitione, aliisque. Varias hujusce vitii species enumerant Practici. 2. Palpitatio cordis, vel motus ejusdem convulsivus, frequentissimus, ac vehementissimus.

Ori-



Oritur hoc vitium ab intercepto fluxu sanguinis ex cordis ventriculis, ejusque intercepti fluxus causa, vel spasmus est ab hysterica, aut hypochondriaca affectione dimanans, aut excedens sanguinis copia, ejusque nimius fervor, aut dilataciones cordis, pulmonum, aut adnexorum canalium aut polyposæ concretiones, aut abscessus pericardii, vel denique aorta, ejusque valvulæ in ossæam substantiam conversæ. 3. Læsiō pulsum arteriarum in eo consistens, quod pulsus ipse a naturali statu recesserit seu vitio cordis, seu sanguinis, seu arteriarum. Sed de his legi possunt quæ alio loco a nobis explicata sunt.

X. Actionum naturalium læsiō, ac primum famis. Atque huc pertinet bulimia, seu fames nimia respectu adpetitus majoris alimentorum copię, quam quæ digeri possit. Hujus causa est morbosa fibrarum ventriculi irritatio ab alteratione pendens succi gastrici, vel quoad quantitatem ipsius, vel qualitatem, aut etiam nimia sensibilitas fibrarum ipsarum, aut excedens earundem laxitas. Huc etiam pertinet pica, scilicet consuetorum ciborum averſatio cum adpetitu inadsuetorum, & sanis corporibus insalubrium, nec non anorexia, seu insignis inminutio, vel cessatio famis in jejunis. Hujusmodi morborum causæ ex alibi constitutis facile eruuntur. II. Polydipsia, videlicet immodicus poculentorum adpetitus. Hujus pariter causæ ex iis patent, quæ de siti in physiologia differuimus, ex quibus intelligi etiam possunt causæ sitis inminutæ, vel abolitæ.

XI. Primarum viarum actiones læsæ, quo sane spectant 1. Dysphagia, difficultas nempe degluti-

tionis cum dolore conjuncta. Hanc procreant oesophagi spasmodica constrictio, hysteria, atonia, & resolutio musculorum dilatatorum laryngis, obturatio superioris partis vesophagi a scirrho, a callo aortæ adnato, a tuberculo cancroso in oesophago, ab induratione oesophagi cartilaginea &c. perforatio palati, erosio, absumptio columellæ, seu veli palatini, hydrophobia, constrictio spasmodica cardiæ ab exulcerato oesophago a succis acris in ventriculo contentis, a violentia musculorum hyopharyngeorum distractione, atque adeo luxatione adpendicum ossis hyoidis &c. 2. Vomitus, eorum nempe, quæ in oesophago, vel stomacho continentur, per os rejectio, quam excitant crapula, saburra, vermes, venena, callus pylori, nlcus ventriculi, hujus steatoma, hypocondriasis, refluxibilis in stomachum a duodeno obturato, obstructio hepatis, stomachi herpes, prolapsus cartilaginis xiphoideæ, læsiones capiris, aliaque plura. 3. Alvi adstrictio: Eam creant fœces sicciore, compactæ, duræ, defectus, aut tenacitas nimia lubricantis mucii, intestina ab obstructione, spasmo, compressione, contorsione, intus susceptione, & similibus impervia, aut nimia dilatatione infirmata, resoluta, perforata, dissecta, defectus, aut inertia bilis, diaphragmatis, & musculorum abdominis actio, vel nifus impeditus &c. 4. Diarrhea, vel materiæ liquidæ frequens per alvum excretio. Movent hanc excretionem auctus intestinorum motus a quacumque causâ irritante, excedens poculentorum, & esculentorum copia, suppressio aliarum excretionum, materies febrilis, purulenta, ichorosa, serosa, arthritica &c. animi pa-



pathemata, susceptum frigus, adfectiones hystericae, dentitio, vermes, hypercatarrhis, aliaque his similia. 5. Ileus, adfectio nimirum, in qua faeces intestinales, quae per alvum excerni debent, vomitione rejiciuntur. Oritur autem a faecibus induratis, ab inflammatione intestini tenuis, a spasmus carnae intestinorum tunicae, ab intestini compressione, a colo pituita infarcto, a bubonocoele, a mutuo intestinorum subingressu, a calculis, vermibus, venenis, a callosa coli strictura &c. 6. Cholera, scilicet adfectio, in qua æger per vomitum, simulque per alvum rejicit biliosam, vel vitiosam aliam materiam cum ingenti difficultate, & angustia. Pendere potest hic morbus a nimia ciborum, & poculentorum ingurgitatione, ab arthritide repulsa, a vermibus, venenis, ab heterogeneis substantiis in sanguine genitis, & per ductus peculiare in ventriculi, ac duodeni cavum excretis, aliisque pluribus. 7. Dysenteria, videlicet inmodica, torminosa sanguinolenta, & mucosae materiae per alvum dejectio. Eam pariunt heterogeneae materiae vel cum alimentis adsumptae, vel in sanguine genitae, & per biliferos, aliosque ductus in cavum intestinorum immisae, venena, abscessus, & vomica mesenterii, cathartica, lues celtica &c. 8. Lienteria, seu ejectio per alvum alimentorum parum, aut vix mutatorum parva interposita mora a deglutitione. Hanc movent ulcus ventriculi, & huic inflata irritatio ab aphthis, humore gingivarum sanioso ventriculum molestante, concurrente pylori laxitate, uberiusque feri intestinalis secretionem. 9. Tenesmus, vel ejectio pauca, mucosa cum magna, & assidua egerendi cupiditate, ingenti

que conatu. Oritur hæc adfectio ab acri materia a sanguine secreta in glandulis podicis, vel huc delata ab intestinali tubo, ipsumque podicem irritante, & inflammante. Oritur etiam a calculo vesicæ, ab ascaridibus, a mariscis, a scibalis, a carcinomate inter vesicam, & rectum acri ichore suo rectum irritante &c. 10. Diabetes, sive indefinens urinarum excretio. Originem debet suam hic morbus ab humorum solutione variis de causis excitata, & ab adtractione etiam aquæ in ære hospitantis. 11. Enuresis, vel mictio involuntaria. Hanc excitant paralyfis sphincteris vesicæ, ejus distractio ab exocyste, cystocele, aliisque ectopiis, graviditas, perforatio vesicæ a partu, vesicæ ipsius, ejusve sphincteris fistulæ, irritatio vesicæ inlata a calculo, à catameniis retentis, & similia. 12. Dysuria, scilicet mictio difficilis molesta, & sæpe etiam ardoris sensu stipata. Profluit hæc adfectio a spasmō hysterico sphincteris vesicæ, ab herpetibus cutaneis repressis, ab urinæ acrimonia, ab ulcere renum, a lue celtica, a mariscis tumidis, a calculo vesicæ, a cystocele, a victu falso acriore, ab usu nimio liquorum fermentatorum diureticorum, ab inmodica corporis exercitatione, & similibus. 13. Ischuria, vel urinæ subpressio, cujus causas alibi referemus. 14. Pyuria, nempe viscido-mucosæ, lutulentæ, & purulentæ materiæ cum urinis ejectio. Hujus causæ per se statim patent. 15. Demum ephidrosis, scilicet magna sudoris profusio, eaque morbosa, de qua vide quæ alibi a nobis declarata sunt.

Sexus virilis actiones læsæ, ad quas refertur  
1. Priapismus, nempe morbus, cujus præcipuum  
sym-



symtoma est ingrata penis erectio citra veneris appetentiam . 2. Satyriasis , five effrænis , & impudens veneris cupiditas cum libidinosa penis ténigine . Utrumque vitium spasms adnumerandum spasmodorum ipsorum causis debetur , atque insuper acrimoniæ virulentæ , abundantia liquoris feminalis , genitalium inflammationi , & ulcerationi , irritationi a vicinis partibus , præsertim vero , ab intestino recto , & vesica inflammatis , erosio , distentis , ab acri corpore stimulis , calculo adstrictis , frigori , deliriis lascivis , veneno hydrophobico &c. 3. Dyspermatismus , nimirum tarda , impedita , & ad generationem insufficiens seminis emissio . Debetur autem vel angustationi urethræ ab intumescencia substantiæ spongiosæ , a tumiditate glandularum ipsi adjacentium , cicatricibus eminentibus , duris , varicibus , ulceribus ad margines alatis , mutata vasorum ejaculantium directioni , & similibus , vel nodis corporum cavernosorum , ut observarunt Viri Cl. *Peyronius* , & *Lieutaudius* , vel mucos urethram infarciendi , vel validiori penis erectioni , ut docet *Cockburnius* , vel epilepsiæ spasmodicæ in coitu advenienti , vel genitalium debilitati , vel semini aquosiori , vel refluxui seminis ipsius ex urethra in vesicam , aut in vesiculas seminales , & similibus . 4. Incontinentia seminis , vel ejus effluxus involuntarius crebro repetitus sine penis erectione cum intensa libidine . Ejus causæ sunt masturbatio , virus venereum , semen copiosum , tenue , acre , magna genitalium irritabilitas , nimia ductuum laxitas , abusus aphrodisiacorum , & similia .

Fœminei sexus actiones læsæ , ad quas revocatur 1. Menostasia , sive catameniorum emanatio , inminutio , aut suppressio . Debetur hic morbus præcipue uteri spasmo , ejusdem obstructioni a materia lentefcente , ejus scirrho , vel simili vitio organico , obstructioni item hepatis , lienis , mesenterii , deficienti , aut excedenti sanguinis copię , ipsimet sanguini seroso nimium , & viscido , circulationi languidiori , intensiori , aut aliorum male directæ , & similibus . 2. Menorrhagia , vel catameniorum fluxus immodicus . Profluit hic morbus ab excedente sanguinis quantitate , tenuitate , acrimonia , motu incitatioe , reditu per venas impedito ob spasmos , constrictiones , obstructiones , a debilitate , irritatione , erosione , ruptura vasorum , abusu veneris , crebra prægnatione , dystocia , abortu , ulcere , heterogeneis utero contentis &c. 3. Leucorrhœa , sive effluxus serosi , vel flavescientis humoris ex utero , aut vagina . Oritur hic morbus a veneris abusu , salacitate cohibita , ulcere , vel scirrho uteri , viru syphilitico , conluvione feri , debilitate , & inertia vasorum &c. 4. Abortus , sive immaturi fetus exclusio ex utero . Hujus causæ sunt animi pathemata , ut ira , terror &c. quo efficitur , ut frequens sit abortus in obsessis urbibus , a terræ motu &c. violentæ corporis motiones , saltus , nixus , tussis , sternutatio , vociferatio , vomitus , insultus epileptici , coitus frequens , & petulantior , diarrhœa , dysenteria , tenesmus , ut docet *Hipp. aph. 34. sect. 5. & aph. 27. sect. 7.* emmenagoga , cathartica , emetica , plethora catamenia promovens , eadem commota in febribus acutis , & pyrexiiis ex eodem *Hipp. aph.*



30 , & 55. sect. 5. fetus mortuus , vel pabulo fraudatus , five funiculo circa collum ligatus , uterus scirrhusus , ulcerosus , ipsius uteri laxitas &c. 5. *Dystocia* , five dolorifica , & ultra modum laboriosa fetus exclusio . Hujus causæ sunt infirmitas matris , dolores , & præsertim colli , humores nimium stimulantés , pathemata , angustia viarum , rigiditas partium , hydrocephalus , ascites , aut hydrothorax fetus , vitiosus infantis situs , secundinæ e-lapsæ , mola , superfetatio &c. 6. Retentio secundinarum , cujus causæ sunt nimia illarum adhæsi-o cum interna uteri superficie , contractio osculi uterini a terrore , ab externo aere inopportune ad-misso , promptior mutatio opportuni situs , funicu-culus umbilicalis nimis solícite recisus , vel ob de-bilitatem ruptus &c. 7. *Lochia* inmodica , vel ni-mius sanguinis effluxus a partu . Pendet hic mor-bus a *dystocia* , vehementibus conatibus , vasis u-teri maxime patulis , plethora matris , frustis pla-centæ in utero relictis &c. 8. *Supressio* , vel inmi-nutio lochiorum ; eam creant constrictum uteri os-culum , subitus terror , infarctus uteri &c. De his plura habent Viri Cl. *Gaubius* , & *Sauvagesius* , quos vide .

## C A P U T V I I I

### DE DIFFERENTIIS MORBORUM ADCIDENTALIBUS

**S**I morbi considerentur ratione adfectæ partis ,  
distingui possunt in universales , & particula-  
res .

res. Universales tunc vocantur, cum totum corpus adficiunt, particulres vero, cum unicam tantum partem invadunt. Præterea ratione adfectæ partis sunt vel idiopathici, vel sympathici. Idiopathicus est qui primario in aliqua parte progignitur, in eaque suam permanentiam, & causam habet, cum nempe in eadem parte sunt simul morbus, & causæ; sic in nephralgia renes idiopathice adficiuntur vel a præsentia inflammationis, vel calculi, vel alterius cujuscumque objecti morborum in iisdem procreati, & permanentis. Sympathicus est qui in aliqua parte excitatur ob consensum cum alia primario adfecta, cum nempe in parte altera viget morbus, in altera insidet causa. Sic ab adfecto stomacho dolor capitis oritur; sic ventriculus in nephralgia per consensum adficitur, & ad vomitum incitatur. Ut autem morbus dicatur sympathicus, illud requiritur, ut sublato morbo idiopathico, ex quo ille profluxit, & sympathicus ipse tollatur; secus si idiopathico morbo sublato sympathicus perseverat, jam non amplius est sympathicus, sed idiopathicus factus est, & tunc dicitur a Medicis deuteropathicus, sive secundarius, alter vero primarius adfectus, a quo proficiscitur, adpellatur protopathicus.

Sympathicum autem morbum datæ alicujus partis vel ab officii societate profluere docent Medici, vel a communione vasorum, vel a propinquitate partium consentientium. Officii societas tunc dicitur, cum duæ partes in unum eundemque effectum ita conspirant, ut unius læsio alterius etiam læsionem inferat. Ita ex. gr. cum pulmones dilatari non possint, nisi cavum thoracis au-  
geatur



geatur, si ob morbum aliquem in musculis thoracis, aut in diaphragmate genitum thorax elevari non possit, & simul deprimi diaphragma, thoracis cavo adhuc coarctato fieri non potest, quin sanguinea pulmonis vasa ob impeditum sanguinis fluxum dilatentur, atque ita adeo dilatentur, ut continui solutiones, & rupturas ex hac officii societate patiantur.

Vasorum communionem tunc vocant, cum duæ, vel plures corporis partes communia habent vasa, per quæ is inter illas consensus intercedit, ut ipsarum altera quomodolibet adfecta ceteræ quoque eodem tempore adficiantur. Duo autem præcipua sunt vasorum genera, sanguinea scilicet, & nervosa, quorum ope consensus inter quaslibet fere partes corporis animalis intercedit. Ex priora quidem vasa quod adtinet, si aliqua motui sanguinis resistantia opponatur alicubi, puta in trunco aortæ inferiori, utique fieri debet, ut idem per superiores ramos ejusdem arteriæ uberius excurrat, eosque idcirco magis magisque distrahat. Hinc morbosæ dilatationes, & solutiones unitatis in illis contingent, compressiones item canalium alterius generis, pluresque alii effectus morborum manare poterunt. Abscessus hepatis post vulnera capitis ab horumce vasorum communionem derivantur, recteque demonstravit *Bertrandus* eosdem ab hepaticæ venæ, binarumque venarum cavarum dispositione efformari.

Quoad nervos adtinet, etsi putent Viri Cl. *Kaauvvius*, *Whyttius*. & *Astrucius* unice in cerebro, aut spinali medulla nervos uniri, quam quidem unionem ibi maxime esse ultro fatemur, communionem tamen aliquam esse truncorum nerveo-

rum præsertim patet in portione dura nervi auditorii, in pari vago, & magnis intercostalibus, & plurima experimenta demonstrant, quæ profert Cl. *Hallerus*. Ea igitur posita communione videtur non alio modo pars aliqua corporis læsionem pari posse ab adfectu, ac læsione alterius partis, quam quod aliquo canali nerveo a potentia mechanica adfecto, quæ continui solutionem, vel semisolutionem unitatis inferat, ejusdem canalis nervei resistentia minuatur. Signidem membranæ canales nerveos constituentes vi contenti fluidi ultra modum tendantur necesse est, ac veluti divellantur, eaque tensio, ac divulsio, & simul validior actio nervi fluidi ad alios quoque canales consocios, eorumque membranas propagetur, ut docent *Baglivius*, & *Henricus Rega*. Eadem etiam contingit in vicinis partibus nervosis, quoties nervei fluidi vis, & elasticitas tum intendatur, tum minuatur. Distrahuntur enim membranæ canales nerveos obvolventes in primo casu, in altero vero ob auctam partium canalem nerveum constituentium vim in mutuos contractus alibi necessario inferri debet distractio in eodem canali nerveo ob continuitatem membranarum.

Læsiones denique cum proximitatis necessitate in alias partes propagari possint tum ob effluvia morbosa ab adfecta parte emanantia, tum mediis communibus membranis, quibus proximæ illæ partes obvolvuntur, sive continuatione substantiæ ab una ad aliam partem, eadem sympathico morbo tentari poterunt. Sic moleste adficitur ventriculus ob aliquam intestini portionem in hernia strangulata compressam.



*Sauvagesius* tamen contendit absurdam esse eorum sententiam, qui docent morbos sympathicos tribuendos esse causæ, quæ remota sit a parte dolente, seu *αδυνατον* esse causam ullam agere ubi non est, ac proinde eos errare, qui causam cephalalgiae ex. gr. stomachicæ reponendam in stomacho esse arbitrantur. Verum quidem est, sic ait Vir. Cl., sæpe fieri, ut emetico præscripto illa cephalalgia evanescat; verum inde non sequitur ejus causam fuisse in stomacho; dubium est num sanguis inspissans, & vasa meningum, vel cerberi infarciens sit incusandus, num vero inspissatus fuerit ob plethoram, ob saburram inquirendum restat. Esto fuerit inspissatus a saburra e stomacho in sanguinis massam transfusa, illa cephalalgia optimo discutietur, & præavebitur usu emetici, licet principium proximum hujus referatur ad caput, quo dolor etiam refertur. Conmotio enim ab emetico facta potest sanguinem in ipso capite discutere, & saburra eliminata futuri dolores simul præcaveri possunt. Qui itaque morbi juxta quosdam sunt sympathici, juxta alios diversa theoria imbutos idiopathici sunt; arbitraria est itaque illa morborum divisio, & a theoria dependens sæpius erronea. Sed cum ex præ constitutis consensus revera aliquis inter partes intercedat, ac præsertim stomachum inter, & caput, quod præ ceteris confirmant biliosi vomitus vulnera capitis, & cranii intropressionem, aliasque læsiones ipsius subsequentes, hinc est, ut inlustri Philosophi sententia minus cum ratione, ac veritate consentire videatur, ut clarius ostendunt observationes *Halleri*, & *Καυυvii* cap. 7. de corpore consentiente.

Ab intensitate, seu magnitudine dividuntur morbi in magnos, & parvos. Magnitudo vero morborum æstimatur ex gravitate, intensione, numero, extensione, & duratione symptomatum. Horum numerus quo major est, ceteris paribus, eo major censetur morbus, siue eadem organa adficiantur, siue diversa. Ita in morbo acuto si delirium, convulsio, dyspnœa, nausea, febris simul adsint, morbus major est, quam si alterutrum adfuerit, ut docet *Sauvagesius*. Extensio autem symptomatum ejusdem speciei æstimatur ex numero partium ab illis adfectarum, atque earum spatio. Sic ex. gr. artuum omnium immobilitas morbum majorem constituit, quam si pars tantum aliqua immobilitate adficiatur. Tandem duratio, seu pertinacia symptomatum ejus magnitudinis ceteris paribus mensura est; sic quo diarrhœa longius perseverat, eo major est morbus. Parvi autem sunt morbi, qui nullis insolitis, funestisque symptomatibus terrent, quique a levi causa profisciscuntur, ut cephalalgia ab æstu solis, febris ephemera a subpressâ perspiratione &c.

Ratione moris, vel qualitatis dividuntur morbi in benignos, & malignos. Benigni vocantur illi, qui mites & adparent, & revera sunt, nullisque sævis symptomatibus copulantur, sed iis dumtaxat, quæ naturæ morbi conveniunt, ut tertiana simplex, febris ardens nonnisi cum calore. & siti; Maligni contra qui insidiosi mites, & sub phænomenis minus ominosis invadunt ægros, & ex improvise vehementiora, ac sæviora inferunt symptomata, quam quæ postulat indoles, ac natura morbi, ut si ex. gr. cum febre ardenti delirium, præ-

ceps



ceps virium lapsus, & alia hujusmodi conjungantur. Item a more illud habent morbi, ut in venenatos, pestilentes, & contagiosos distinguantur. Venenatus morbus ille est, qui qualitate quadam corpus invadit, quæ ipsi prorsus adversa est, ac plane mortifera, quæque vel ab extrinsecus propinato veneno, vel ab intrinsecus genito proficisci potest. Pestilens dicitur qui veneficam habet qualitatē, suumque virus indiscriminatim in omnes effundit. Contagiosus vero qui semina morbi ab uno in aliud corpus facile transfundit. Animadvertatur autem pestilentem morbum grassari aliquando populariter posse omni tamen contagione remota, ut quando vel vitio aeris, vel aliis de causis regionis alicujus populos invadit, ac proinde non omnes pestilentes morbos esse contagiosos; præterea neque omnes contagiosos esse pestilentes, cum revera in contagiosis venefica illa qualitas deesse possit.

A motu deducitur differentia quatuor temporum sive stadiorum in morbis, nempe paroxysmi, sive invasionis morbi, augmenti, status, & declinationis. Paroxysmus, seu principium est, in quo morbus, quem ab initio modum adcepit, eundem servat sine ullo incremento; augmentum est, cum morbus sensim increfcit; status, cum morbus ipse in summo augmento perseverat, nec ultra citraque progreditur; declinatio demum, cum manifestam suæ vehementiæ diminutionem habet. At vero quatuor hæc stadia, non in omnibus morbis observantur, sed in iis, qui ad salutem terminantur; Qui enim ad interitum ruunt nullam habent declinationem. Item quoad motum alii lente

te sua tempora percurrunt, & vocantur longi, seu chronici, iidemque juxta *Hipp.* ultra 14 dies, & juxta *Nectericos* ultra septem hebdomodas producantur; contra alii eadem brevi conficiunt, & dicuntur breves, seu celeres. Ex his nonnulli proprium nomen retinentes adpellantur breves, & sunt qui sine periculo humanum corpus adgrediuntur, & ad brevissimum tempus perseverant, ut febris ephemera. Alii vero vocantur acuti, qui ne dum celeres habent motus, sed etiam sævissima, ac vehementissima symptomata, & periculi plena, ut pleuritis. Non enim, ut falso docuit *Galenus*, brevitatis temporis, motusque celeritas dumtaxat acutum morbum constituunt, sed oportet insuper, ut una simul cum celeritate motus adcidentia pessimi ominis conjungantur. Ex acutorum autem genere nonnulli vocantur acuti, alii peracuti. Ulterius ex acutis alii simpliciter acuti nuncupantur, & sunt qui intra quartum decimum diem terminantur, alii vero non exacte acuti, qui intra viginti dies finiuntur. Et tandem nonnulli dicuntur subacuti, aut acuti decidui, qui ad quadragesimum usque diem producantur. His forte addi possent acuti recidivi, qui sexagesimo die, vel etiam serius desinunt. Qui vero hunc diem excedunt, adpellandi sunt longi. Ex peracutis decem alios exquisitè peracutos, vel acutissimos vocant, qui quarto die terminantur, alios autem non exquisitè peracutos, qui ultra quartum diem excurrunt, & ad septimum usque pertingunt. Sed enim cum modo citius, modo serius finire morbos natura possit, hinc est, ut quæ de morbis acutis attulimus non ita intelligenda sint, ut morbi



bi omnes acuti statutis hisce diebus necessario terminentur.

Relate ad modum motus qui sine inermissione a principio ad finem usque ægrum evidenter infestat morbus, & nullam habet perfectam apyrexiam, seu intermittentiam, vel cessationem, vocatur continuus, qui vero per intervalla recurrit, & aliquam in suo cursu apyrexiam, & cessationem habet, dicitur intermittens. Hæc autem intervalla si certa fuerint, ac determinata, morbus appellatur periodicus, si vero fuerint irregularia, morbus vocatur anomalus, vagus, erraticus. Inter continuos, & intermittentes morbos ambigunt continui remittentes dicti, vel exacerbantes, qui continue quidem, sed tamen per intervalla remissius adficiunt ægrotantes.

Ratione temporis, quo morbus invadit, dividuntur morbi in hæreditarios, congenitos, & acquisitos, vel adventitios. Hæreditarii sunt qui a Parentibus simili morbo, hujusve seminio adfectis in filios derivantur, & ut ait *Plinius*, per successiones quasdam quasi traduntur, tristisque, & onerosa veluti hæreditate adciipiuntur. Hos nulla medicina sanat; ut docet *Hipp.* dum ait „ morbi hominibus congeniti, & connutriti una cum illis pubescunt, consenescent, & tandem conmoriuntur, . Nam, ut sapienter monet *Seneca*, naturam mutare difficile est, nec licet semel mista nascentium elementa convertere; nunquam enim reciduntur plane vitia corporis, quæ nobiscum creverunt. Hujus generis morbi sunt epilepsia, arthritis, podagra, phthisis, trichoma, calculi &c. de quibus fuse *Rivinus*. Congeniti autem vocantur morbi,  
qui

qui fetui in utero adnascuntur, quique nec manifesti, nec in seminio latentes parentum alterutri ante conceptionem inhærebant. Hujus generis morbi sunt præ ceteris vitia organica, cophosis, monstra, nævi materni, quos, ut ait *Trillerus*, nullo fere modo eluere, aut eradicare licet, quin potius semper pene deteriores fiunt medendo, & nulla lima, nullaque politura exteri possunt. Denique adventitii dicuntur morbi, qui in lucem suscepto homini superveniunt, quique ab errore in victu, vel in motu, vel ab alia causa profiscuntur.

A loco sive regione, in qua generantur, dividuntur morbi in endemios, epidemicos, & sporadicos. Endemii dicuntur, qui alicui regioni peculiare sunt, iisdemque plerique regionis illius incolæ adficiuntur, ut proinde morbi regionales, seu vernaculi adpellari consueverint. Sic scorbutus borealibus regionibus, tabes Lusitanis, pleuritis Tridentinis, dysenteria Melitenis, adfectio hypocondrica Romanis, bronchocelle Helvetiis, Pedemontanis, Brixianis, Germanis ad Goslarium, elephantiasis Ægyptiis, carantismus apud Apulos &c. morbi endemii sunt. Horum autem morborum causa cum æqualiter constans, & adnexa locis illis, vel nationibus esse debeat, a constanti, & fixa causa repetenda videtur, cujusmodi sunt exhalationes palustres, ac præ ceteris subterraneæ, quarum indoles pro varietate materiarum exhalantium tam varia esse potest, quam varii sunt iidem morbi, sed simul constans esse debet. Epidemici sunt qui indifferenter quaslibet regiones, & quoslibet homines adoriuntur, ut pestis, variolæ, & alii hujusmodi. Sporadici denique qui nec communiter



niter grassantur , nec alicui regioni peculiares sunt , sed indiscriminatim homines corripunt , prout varia est ipsorum hominum natura , variique in victu , & rebus alii errores . Sic pleuritides , podagra , calculi , & alii similes morbi ubique sane , sed non tamen in multos grassantur .

A variis vitæ generibus distingui a se invicem possunt morbi , & ii præsertim , quos vocant artificum , de quibus consuli potest inlustri *Ramazzinus* .

Ab eventu morbus est vel salutaris , vel periculosus , vel lethalis . Salutaris est qui ex propria natura nunquam terminatur ad mortem , nisi error aliquis in ejus curatione admittatur , ut est tertiana tum simplex , tum composita . Periculosus ille dicitur qui ægotantes in vitæ discrimen adducit , licet sæpenumero citra mortem terminetur . Lethalis est qui pravas habet qualitates , ægrorum vires infirmat , & tandem ægrum ad mortem ut plurimum perducit , ad quod sane genus referri solent morbi omnes extremi , & peracuti , nec non pestilentes .

Item ratione eventus morbi vel sanabiles sunt , vel insanabiles . Sanabiles sunt , qui curationem admittunt , insanabiles qui curationem plane respuunt , licet mortem non inferant necessario . Hujus generis sunt vitia organica , cancer , scirrhus &c. Sane teterrimum canceri virus nullis medicamentis internis obtemperat , & ad omnem pene tactum sævius insurgit , idque *Aretæi* , & *Celsi* auctoritate confirmatur , quorum alter sic ait ; *Effertur carcer manuum adtrectione , & medicamentis , & quolibet medelæ genere magis exasperatur : al-*

ter vero sic scribit ; *Carcinomata curationibus irritantur , & quo major vis adhibita est , eo magis . Quidam ferro adusserunt , quidam scalpello exciderunt , neque ulla unquam medicina profuit , sed adusta protinus concitata sunt , & increverunt , donec occiderent , excisa etiam post inductam cicatricem tamen reverterunt , & causam mortis adtulerunt . Idem dicas de scirrhis , præsertim si longiore temporis tractu ita induruerint , ut durities illa superari non possit . De his ita loquitur sapientissimus Trillerus ; isti remediis emollientibus , resolventibus , & discutientibus nimium tractati , ac vexati nec mitescunt ; nec loco semel occupato cedunt , sed medelis admotis acrius exasperati quasi vitiosi parentes plerumque daturi sunt progeniem longe vitiosiore , dirros nempe cancos , & truculenta carcinomata nulla plane hominum ope , & solertia subigenda , aut extirpanda . Huc pertinent & strumæ , quæ advertente Celso præcipue Medicos fatigare solent , quod nec facile maturescant , & si curentur ferro , aliisque medicamentis , juxta cicatrices ipsas plerumque iterum exsurgant . Huc etiam referri possunt varii morbi omnis medelæ ita quidem impatientes , ut per medicamenta præsertim exterius adhibita magis semper ac magis exacerbentur , & in alios pravioris ingenii morbos recrudescent . Hujus generis sunt varii oculorum morbi , ophthalmiæ scilicet , lippitudines , & suffusiones , auditus vitia , erysipelata , gutta rosacea , impetigines , lentigines , lichenes , scabies , achores , tinea , podagra , sordidæ ani fistulæ , præcipue inveteratæ , & in corpore senili , & effæcto subortæ , ulcera annosa , sordida , humida , callosa , pedes , & crura maxime*



xime obſidentia , & alii id genus morbi , in quibus omnibus juxta *Hipp.* præceptum nec movere oportet , nec novare , neque eos medicamentis adgredi neque aliis irritamentis , ſed potius intactos relinquere ; gravius enim invaleſcunt medendo , & cohibendo latius ſerpunt . Sic ab inveterati canceris extirpatione aliquo poſt tempore tumere colli glandulas in lapidem pene dixerim induratas , & linguam , gingivæſque multis tuberculis liventibus , & foetidam ſaniem plorantibus operetas , itemque ab eadem operatione in utraque ſœminæ mamma inſtituta aliquot poſt menſibus ad uterum refluxiſſe peſtiferum virus obſervavit prælaudatus *Trillerus* . Recte igitur , ait *Hipp. aph. 38. ſect. 6. Quibus occulti canceri fiunt , eos non curare melius eſt , curati enim citius pereunt , non curati vero longius tempus perdurant .* Referunt *Hildanus* , & *Schelammerus* Centurioni male tractatum eryſipela per humida , & acria cataplaſmata , & epithemata in feralem gangrænâ , & ſphacelum pene ipſum abiſſe . Cæcitatem , febrem , mortiferam epilepſiam , lethalem hydropem , paralyſim , ſummam ſpirandi difficultatem , vehementiſſimam vertiginem , graviſſimamque totius corporis laſſitudinem , ſtuporem ſenſuum , mentis alienationem , cachexiam , hemiplegiam , apoplexiam , ac demum mortem a perversa ſcabiei medicatione profluxiſſe tradunt *Hipp. Sennertus* , *Hoffmanus* , *Rivinus* , *Schulzius* , aliique . Et ſic de ceteris morbis , quos ſupra recenſuimus , quoſque fuſe tractat *Trillerus* , quem vide .

Quoad ætatem diſtinguuntur morbi in morbos infantix , pueritix , juventutis , virilitatis , &



senectutis; quælibet enim ætas suis peculiaribus tentatur morbis. Recens natorum, & puerorum morbos recenset *Hipp. aph. 24, 25, 26, sect. 3.* Morbos juvenum exponit *aph. 29. ejusdem sect. & aph. 15, & sect. 7.* Virilitatis autem morbos declarat *aph. 30. sect. 3.* Senectutis denique morbos *aph. 31. ejusdem sect.* Sane in infantia, & pueritia fibrarum mollities, & infirmior perspiratio liquidorum congestiones, & condensationes pariunt, unde profluant aphthæ, fluxiones, eruptiones cutaneæ, tumores ad parotides convulsiones, herniæ, tusses, vomitus &c. In pubertate fiunt febres acutæ, hæmorrhagiæ, & in foeminis colores pallidi. In adolescentia ob majorem solidorum tensionem, & diversæ indolis alimenta, vehementioresque exercitationes, & vividam hæmatosim humores sunt solutiores, indeque febres putridæ, expuitiones sanguinis, inflammationesque consequuntur, & ob majorem sanguinis ipsius adfluxum ad vasa cerebri phrenitides etiam, & lethargi suboriuntur. In senectute demum cum fibræ rigescant, ac decurrentur, vimque suam elasticitatis amittant, obstruantur vasa, cutisque pori claudantur, & ob lentiolem hæmatosim parcius fiat perspiratio, pars aliqua crudorum, viscidorumque humorum in alias partes impetum faciat necesse est, atque inde apoplexiæ, catharri, copiosa seri per nares, & per sputum evacuatio, rheumatismi, stranguriæ, paralyses, surditates, glaucomata, aliaque mala proficiscantur. Quod si vitio aliquo ambientis aeris, aut aliqua corporis perfrigeratione contigerit, ut adhuc parcius procedat perspiratio, tunc retenta materies morbifica pleniori alveo in pulmones



mones inruat necesse est , aut per lateralìa intestinorum vasa uberius secernetur , atque ita peripneumonias creet , & fluxus lethales .

Ratione subiecti dividuntur morbi in morbos virorum , & foëminarum , & harum morbi in morbos virginum , gravidarum , parientium , & nutrientium . De his consule *Ramazzinum* , & Practicos adcuratiores , ut *Sauvagesium* .

Demum quoad anni tempora morbi sunt æstivi , autumnales , hyemales , & verni . Morbi quidem omnes singulis quibusque temporibus excitantur , quidam autem quibusdam præsertim temporibus & procreantur , & exacerbantur , ut idem docet *Hipp. aph. 19. sect. 3.* Singulos autem hujusmodi morbos hyeme præparari communis opinio Medicorum est , quod ea potissimum anni tempestate parum corpora perspirent . Unde nil mirum si adcedente vere turgeat sanguis perspirationis excremento saturatus , variaque inferat mala , ut alio loco demonstravimus . Æstivos morbos recenset *Hipp. aph. 11 , & 21. sect. 3.* Autumnales morbos refert *aph. 9 , 22* , aliisque ejusdem tertiæ sectionis . Hyemales vero docet *aph. 13 , & 23* ejusdem sect. ac demum vernaes *ap. 12.*

Atque hæc sunt quæ de morborum differentiis præcipue tradi solent . Consulto prætermisimus divisiones alias , cum hæ vel ex ipsis nominibus innotescant , vel in usum medicum non veniant , vel spuria sint , & falsæ . Hujusmodi est divisio morborum in legitimos , & spurios ; veros , & falsos . Profecto ut præclare animadvertit *Sauvagesius* , qui genus recte definivit , eidemque nomen indidit , ex hoc ipso exclusit species huic de-

definitioni repugnantēs , ac proinde species illæ eodem generico nomine insigniri non debent . Pleuritis ex. gr. , pergit laudatus Auctor , definitur morbus febre acuta , dolore pectoris punctorio , tussi , & dyspnœa stipatus . Si jam ea dividatur in veram , & spuriam , seu falsam , idem est , ac si divideretur in eam , quæ est pleuritis , & eam , quæ non est ; aut quæ falso pleuritis judicatur ; hanc enim falsam vocant , quod est absurdum .

Fallax item est , & erronea , ut idem contendit , divisio a Neotericis adcepta morborum febrilium in essentielles , & symptomaticos , in eos scilicet , qui sunt effectus alterius morbi , vel qui ab alio morbo suboriuntur . Cum enim juxta ipsos febris pro causa habeat vel obstructionem vasorum capillarium , vel irritationem cordis , vel nervorum distractionem , atque juxta eosdem illa vitia veri morbi sint , seu status vitiosi partium solidarum , fluidarumve , ex quo functiones læduntur , omnes febres ex his principiis esse debent symptomaticæ , nullæ essentielles . Præterea quod in sensus nunquam incurrat causa , quatenus causa , nec proinde incurrat quidpiam quatenus effectus alterius , nec proinde quatenus symptoma , atque mutata , ut sæpe fit , in scholis causarum doctrina mutaretur generalis morborum divisio , quæ subponit ex. gr. ulcus pulmonis esse causam , cujus amphimerina tabida effectus est ; fieri enim potest , ut vel a communi causa dependeant tum ulcus , tum febris , aut ut ulcus a febre promanet , cum febris subpurationem præcedat sæpissime , ideo erronea censenda est illa divisio fundamentis mutabilibus innixa .

Neque



Neque minoribus, sic ille pergit, tenetur erroribus divisio eorundem morborum febrilium in humorales, & non humorales, qui nempe a solo vitio fluidorum oriuntur, ac foveantur, & qui a solo vitio solidorum ortum ducunt. Et sane qui morbi febriles a putredine, & malignitate humorum produci putantur, a spina tendinibus infixi fieri posse ostendit *Helmontius*. Præterea certum est solida laborare non posse seorsim a fluidis. Denique ex eo, quod sit abscessus, fistula, ulcus maxime in parte dolente, an ne febris exsurgens solidis tantum tribui debet? Num sanguis inflammatus, pus acre, ichor ulceris nihil ad febrem concurrunt? Quo jure humoralem, quæ fit a bile, non humoralem, quæ a pure foveatur, adpellaveris? Cum antiqui has omnes excepta ephemera, & hæctica humorales, & putridas nuncuparent.

## C A P U T I X

### DE COCTIONE MORBIFICÆ MATERIÆ

**C**um morbi omnes ex pravis fluidorum affectionibus primum proficiantur, cumque ex pravis hisce affectionibus tandem solida corporis vitium contrahant, hinc ut morbi solvantur ad salutem, pravæ illæ affectiones tollantur necesse est, five acre, vel heterogeneous substantiam sanguinis inficiens ejiciatur, & solidarum partium vitia corrigantur. Quo vero heterogeneous illud,

vel noxium abigatur, & sanguinis qualitates omnes nativæ constitutioni proinde restituantur, scilicet morbi ad salutem terminentur, oportet, ut heterogenea illa, & morbosa materies cum sanguineo latice conmixta vel in suis adfectionibus ita mutetur, ut ejusdem fiat conditionis, ac reliquæ fluidorum partes, videlicet ad nativum statum redeat, vel ab ipsomet sanguine separetur, & per determinata vasa e corpore ejiciatur. Separationem hanc morbosæ materiæ, qua veluti fermento quopiam adjecto morbosæ fermentationes excitantur in fluidis, ejusdem materiæ coctio præcedit, & critica, ut plurimum, sive judicatoria perturbatio, ut saniores Medici adnotarunt.

Coctionem autem vocant mutationem illam animali œconomix adprime utilem, quam subit materia cruda, seu morbosa in diversis humani corporis partibus, dum eadem seu actione vitæ, seu viribus medicamentorum naturalem demum obtinet constitutionem, eam nempe, quæ sani corporis humoribus propria est, ac peculiaris, vel, ubi id fieri non possit, ad determinatam separationem, evacuationemque præparatur. Coctio illa, qua materies vitiosa ad naturalem constitutionem redigitur, pepsis nomine a veteribus Medicis vocabatur, præparatio vero ad separationem pepasmus dici consuevit. Pepsis autem, sive coctio morbosæ materiæ, qualis est ex. gr. resolutio in inflammationibus, est longe perfectior pepasmo, qui locum habet in singulis quibusque morbis, in quibus sola vitæ actione morbifica materies evacuatur, cujumodi est subpuratio in morbis inflammatoriis.

Neque



Neque difficile est rationem stabilire, quæ perficitur coctio materiæ morbificæ. Et sane non aliud est coctio, quam solutio propria substantiæ sanguineæ, sive extractio materiæ heterogeneæ, & noxiæ, quæ solventium aereorum ope conficitur, & ab aucto motu sanguinis progressivo, & majore gradu caloris humani corporis promovetur; scilicet ab aeris solventibus aliquid de sanguine sub insensibili forma educitur, quod eidem heterogeneum erat, & noxium, quo educio materia superflua vel eandem demum indolem, & constitutionem contrahit, ac humores ad sanitatis leges elaborati, & tunc plane cessat morbus; vel si id haberi ex integro non possit, quoniam materiæ superstiti minor cum solidis partibus, & humoribus easdem adluentibus heterogeneitas intercedit, eadem idcirco facilius, validiusque ab illis adtrahitur, ut deinde per excretorios canales e corpore eliminatur.

Exinde vero conligitur actionem vitæ se se intensius exferentem eam esse, quæ coctionem facit, eademque testante magno *Sydenhamio* uti naturam, ut crudos, sive heterogeneos humores a ceteris discernat, eosque utpote animali œconomix insensissimos extra corpus amandet. Unde insert Vir sapientissimus in curatione morborum illud omnibus viribus elaborandum esse, ut actio vitæ temperetur, ne ex vehementiori motu vasa cerebri, pulmonum, aut insignis alterius partis quoquo modo debilitata tandem disrumpantur, aut ita obstruantur, ut non amplius resolvi possit obstructio, vel contra ex motu debiliore morbifica materies vitiose digeratur, ejusve coctio imperfectius absolva-  
tur

tur. Quod si actio vitæ satis superque constet, quoniam tunc ipsa sufficit optimæ coctioni perficiendæ, totum curationis opus naturæ, quæ, ut *Boheravii* verbis utar, in sanandis tandem morbis principatum obtinet, omnino committendum esse prælaudatus Auctor sapientissime contendit.

Et in multis quidem morbis, in quibus Natura nullo indiget adjumento, nihil quidquam molendum est, ut testantur *Hipp.* et idem ipse *Sydenhamius*, qui optimam interdum medicinam esse docent medicinam non facere. Veritatem hanc adprime noverat *Galenus*, eosque Medicos graviter reprehendebat, qui quovis die pharmacum ægrotantibus exhibendo naturæ opus ita perturbarent, ut eadem non amplius valeret ad morbosam materiam conrigendam, atque adeo ad morbos integre fausteque sanandos. Sane coctio vitiosi humoris majorem, vel minorem requirit febrilem actionem, prout idem tenacioris est indolis, & contumacioris. Sic in febre ephemera, aliisque levioribus morbis nullus naturæ procurandus est pepercussus. At in febribus putridis, & in inflammationibus coctio majorem operam exposcit, & natura aliquo indiget auxilio, quo materiam morbosam præpareret, eandemque aptam reddat ad evacuationem. Hoc autem in casu ea omnia perutiliter adhibentur, quæ noxios humores adtenuare possunt, ac solvere; quippe ut docet *Hipp. aph. 9. sect. 2.* Corpora cum quis purgare voluerit, ea fluxilia faciat oportet; usurpantur etiam quæ valent laxare solida, quo facilius cedant, & expeditior via pateat ad evacuationem, vel contra quæ majorem solidis ipsis vim, atque elaterium in eundem finem



nem indere, si forte debita vi, atque elaterio destitui videantur.

Veteres Medici coctionis signa in excrementis præcipue requirebant, & modum plus minusve perfectum ab illorum qualitatibus inferebant, quo ipsa de corpore secesserunt. Ita *Hipp.* ab urinis & alvi fœcibus tutiora signa conligebat, quæ communia sunt coctionibus materiæ morbificæ in qualibet corporis parte confectis. Conligebat item ex sputis pulmonum statum in morbis pectoris &c. Idem statuit *Galenus* lib. 2. de crisi- bus. Generatim vero signa coctionis in excrementis felicem morbi exitum prænunciant, ut docet *Hipp.* lib. 1. Epidem. Ait enim *mutationes omnes excrementorum semper salutare esse, & ex promptis coctionibus promptum morbi exitum portendi*, quod pariter a *Galeno*, & *Prospero Alpino* confirmatum est. Oportet autem, ut signa perfectam numerisque omnibus absolutam est coctionem enuncient, eademque constanter perseverent usque dum crisis adpareat. Pepasmi enim, & cruditatis vicissitudo pessima est, ut monet *Duretus*, & *Galenus* adserit in 1. aph. Sic enim ait, *In morbis, in quibus aliqua crisis adparet cum signis cruditatis adhuc subsistentis funestum finem vel morbi diuturnitatem indicari.* Cavendum vero illud est, ne ex parte Medici, aut ægrotantis, aut adfidentium casus aliquis contingat, quo turbetur coctio; necesse enim est Medicum ægrotum, & adfidentes facere, quæ decent, ut ait *Hipp.* aph. 1. sect. 1.

Coctionis signa nunquam adparent in principiis morborum; tunc siquidem materiæ morbificæ absolute crudæ sunt; neque etiam in eorum

au-

augmento, cum revera eo ipso tempore coctiones sint imperfectæ. Hinc vero constat in principiis morborum ab instituendis evacuationibus abstinendum. Cum enim tunc temporis materia morbi cruda sit, ac proinde expulsionem maxime resistat, aut saltem minus sit aptior, quæ extra partes, quarum functiones turbat, & impedit, vitæ viribus amandetur, fieri non potest, quin sani humores, si qui sunt, de corpore expellantur, aut materia morbi nisi per maximos conatus non evacuetur. Hinc cum ægrotantis vires plurimum infringantur, haud amplius operari natura potest neque purum ab impuro secernere, morbum profligare, animalem demum œconomiam in pristinum restituere. Merito igitur ab *Hipp.* constitutum fuit aph. 22. sect. 1. *concocta medicamentis adgredi oportere, & movere non cruda, neque in principiis, si non turgeant.* Tunc enim solum evacuandam esse docet materiam, ne si diutius in corpore detineatur, naturæ vires impares fiant eidem præparandæ, & materies ipsa morbosa ægrotantem in vitæ discrimen adducat, si ad nobiliorem aliquam partem deferatur.

## C A P U T X

### DE CRISIBUS, ET DIEBUS CRITICIS

**Q**uid nomine criseos Medicinæ Parens *Hipp.* potissimum intellexerit determinari vix potest; adeo



adeo divinus ille Senex in ejus definitione multiplex fuit , & varius . Et sane quodlibet excretionis genus ab eodem dicitur crisis . Quælibet etiam morbi mutatio ab ipso vocatur nomine criseos . Idem præterea contendit tunc in dato quopiam morbo adesse crisiſim , cum hic vel plurimum intenditur , vel remittitur , vel in alium morbum inmutatur , vel denique cum morbus ipse plane extinguitur . Eodem fere sensu *Galenus* arbitratur non aliud esse crisiſim , quem subitam morbi mutationem in melius , vel in deterius , scilicet ad salutem , vel ad mortem , ex quo factum est , ut nonnulli crisiſim ipsam consideraverint veluti quandam luctæ speciem , inter naturam , & morbum , in qua natura vel superare morborum possit , vel contra ab eodem superari . Cum autem morbi omnes , si insanabiles nonnulli excipiantur , suam habent crisiſim , ejus scilicet sint indolis , qua mutantur tandem vel ad salutem , vel ad mortem , hinc statuerunt alii non aliud esse crisiſim , nisi judicium de fausta , vel infauſta morborum solutione , ratione habita ad symptomata , vires , & peculiarem ægri constitutionem .

Verum enim vero cum juxta mentem *Galenii* imminente crisi difficilis evadat respiratio , ægro-  
 tantis oculi rubeant , idem etiam quandoque delirio , vel sopore conripiatur , objecta lucida videre se putet , de dolore ventriculi , ac dorsi conqueratur , æstuet , ploret , ejus labrum inferius tremore adficiatur , totumque corpus convellatur , hypocondria interdum retrahantur , insignis denique crisiſim præcedat functionum omnium humani corporis perturbatio ob morbosam materiam peculiaribus

bus vasculis inhærentem , cumque insignes hæce mutationes tandem sudor , vel sanguinis eruptio e naribus , vel vomitus , vel alvi fluxus , vel tumor in aliqua corporis parte subsequatur , statuendum videtur non aliud esse crisin , quam celerem motum , & separationem a reliqua humorum massa peccantis materiæ , & varias corporis partes obfidentis , eundemque motum , & separationem iisdem deberi causis , sed tamen intensius agentibus , ex quibus morbificæ materiæ coctio proficiscitur .

Crisis itaque perficitur , vel terminatur per excretionem , quandoque vero per metastasin materiæ morbificæ , cum hæc scilicet fecernentibus tubulis nimium inretita remanet . Primi generis sunt crises , quæ contingunt ex. gr. per alvum , urinam , sputum , sudorem &c. secundi autem sunt quæ per insignem ex: caus. in parte aliqua erumpentem abcessum sine ulla ex dictis excretionibus perficiuntur . Neque vero putes quemlibet abcessum a morbo esse criticum ; quandoque enim partem aliquam nobiliorem , vel saltem æque nobilem invadit , vel erumpit alieno tempore , vel aliis caret conditionibus , quæ ad constituendum criticum abcessum maxime requiruntur , & tunc in perniciem cedit ægrotantis , & symptomaticus nuncupatur .

Præterea crises in eo a se invicem discrepant , quod aliæ optimæ sint , aliæ vero malæ ; perfectæ aliæ , aliæ imperfectæ , aliæ demum tutæ sint , aliæ periculosæ . Crises illæ sunt optimæ , quæ in spem adducunt fore , ut æger convalescat , malæ contra dicuntur quæ periculum adaugent . Crises perfectæ hæc sunt , quæ materiam morbificam omnino



nino evacuant, vel alio transferunt; imperfectæ vero quæ materiam morbosam ex parte tantum eliminant, ac proinde periculum portendunt, ne rursus recrudescat morbus juxta *Hipp. aph. 17. Sect. 2. quæ relinquuntur in morbis recidivam facere consueverunt*. Denique crises turæ sunt illæ, quæ periculo vacant, periculosæ contra, in quibus aeger durante crisi maximum in discrimen adducitur. Hisce omnium cricum speciebus addi posset crisis illa, quæ dicitur insensibilis, & a nonnullis nomine solutionis adpellatur. Hujusmodi autem crisis ea est, in qua materies morboſa ſenſim ſenſimque diffiatur, & quidem per copioſam inſenſibilem perſpirationem, quemadmodum contingere obſervavit *Galenus* in pueris per longum ſomnum. Sex autem adferri ſolent characteres, & conditiones perfectæ criſeos, & ſimilitutæ, ſeu ſalutaris. Earum prima, ac præcipua eſt, ut per ſigna coctionis, & præſertim aliquo die indice fuerit præmonſtrata. Hujus quidem conditionis tantam eſſe vim teſtatur idem *Galenus*, ut adfirmare non dubitaverit ſe neminem unquam vidiffe intereuntem, qui præcedentibus coctionibus criſim habuiſſet. Ex adverſo autem ſi nullis præcedentibus coctionis ſignis aliqua fiat perturbatio, aut excretio, eam non bonam criſim, ſed naturæ potius irritationem eſſe, & ſymptoma longe periculofum fidenter pronunciandum eſt. Neque vero id in gravioribus tantum morbis, ſed mitioribus quoque, & qui ſalutares judicantur, veriffimum eſſe experiemur, in quibus ſi quidpiam ſimile contingat, metuendum eſt, ne morbus novis ſupervenientibus ſymptomatibus ingra-  
veſcat

vescat, vel diuturnior factus tandem, morte finiatur. Recte igitur ab Hipp. 1. epidem scriptum est *coctiones celeritatem judicationis, & sanitatis securitatem ostendunt, cruda vero, & incocta, atque in malos abscessus conversa dolores, aut diuturnitatem, aut crimum defectum, aut mortem, aut recidivam.*

Altera perfectæ criseos conditio est, ut critico die contingat, quamvis etiam alio die haberi possit. Illud autem requiritur, ut quocumque die crisis fiat, tempestive fiat, videlicet nec ante morbi statum, nec ante materiæ morbificæ coctionem. Quæ aliter se crises habent intempestivæ dicuntur, & disruptiones vocari solent ab Hipp. quod natura intempestive ad excretionem a morbi malignitate sollicitetur, quæ propterea non ea solum, quæ vitium & læsionem inferunt, sed utiles etiam, & laudabiles succos tumultuario ejicit.

Tertia perfectæ criseos natura est, ut ea sit manifesta, scilicet cum excretionē aliqua, vel insigni, & conspicuo absolvatur abscessu. Quæ enim, ait Hipp. *sine manifesta excretionē levant, recidivam facere solent.* Licet enim contingere quandoque possit, ut morbifica materies resolvatur, quo casu nulla subsequatur oportet evacuatio, vel etiamsi materia non resolvatur, insensibili perspiratione diffilari possit, ut eam observavit Albertinus mediante halitu foetidissimo ab ægrorum corporibus erumpente, præsertim in usu corticis peruviani, id tamen perraro contingit, ut vix morbum videas, præcipue magnum, ac difficilem, sine ulla subsequenti manifesta excretionē terminari. Quin & lenti illi diuturnique morbi, quos paulatim  
solvi



solvi, diximus, aliquam fere semper evacuationem sub finem conjunctam habent.

Quarta, quæ ad perfectam crism requiritur conditio, est, ut sit *secura*, nihil scilicet incoctum relinquat, & nihil excernendum, quod non excernatur; secus enim metuendum est, ne denuo relabatur æger.

Quinta optima criseos conditio est, ut morbo, & ægri naturæ sit consentanea. Si res aliter contingat, metus est, ne morbifica materies intus relinquatur, at que adeo fida non sit hujusmodi crisis. Igitur acuti morbi excretionem aliqua, diuturni terminari solent abscessu. Febris ardens in juvene sanguinis profluvio e naribus, vel ut plurimum oborto sudore, in senes autem alvi fluxu non raro solvitur. Æstivi morbi sudore, autumnales, & hiberni urinarum, aut alvi fluxibus judicantur.

Sexto demum ad optimam crism requiritur, ut sit *secura*, seu fiat cum ægeri tolerantia, nullisque periculosis symptomatibus copuletur.

Sed non idem est in omni morbo criseos tempus, nec eadem critica evacuationis natura. Enimvero tempus quod adtinet, cum crisis ad salutem sequi coctionem debeat, coctio autem pro ratione sexus, ætatis, temperamenti, regionis, tempestatis anni, morbi, epidemicæ constitutionis modo citius, modo serius perficiatur, illud consequitur crism etiam citius, aut serius perfici oportere. Quod autem sexus, ætas, & quæ supra indicavimus, coctionis tempus variare possint, manifestum est. Coctio siquidem in eo sita est potissimum, ut vitia sanguinis conrigantur, quod

sane non eodem temporis intervallo perficere natura potest, cum revera alia sit sanguinis indoles in juvene, alia in sene, alia in homine biliosi temperamenti, alia in melancholico &c. Eandem ob causam nec eadem in omni morbo continget evacuatio, sed modo per glandulas subcutaneas, modo renales, quod sæpius accidit, modo per intestinales &c. morbifica materias de corpore secedet. Quæcumque autem fuerit evacuatio, ea salubris est & critica, quam excitat natura prius inutili, vel noxio fluidorum pondere gravata, aut irritata, ideoque eadem confert, quod necessitati proportionalis sit, ac bene feratur. Illud enim tantum detrahitur, quod copia sua gravabat, aut qualitate noxia molestiam adferebat. Recte igitur ait Hipp. *evacuaciones salubres passim bene ferri ab ægrotis, ita ut ab illis non mala solum subleventur, sed etiam robur prius prostratum restituantur.*

Quamvis autem varium esse diximus criticum tempus, veterum tamen Medicorum observatione compertum est crises plerumque certis quibusdam diebus absolvi, quos proinde criticos adpellarunt. Hinc doctrina dierum criticorum profecta est, quæ in hisce regulis innititur ab Hipp. constitutis. Morbi omnes acuti 40. diebus, vel quandoque citius terminantur, alii vero circa tricesimum absolvuntur, plurimi intra vicesimum, vel decimum quartum, vel septimum. Dies, in quibus morbi crises perficiuntur, vocantur critici, ceteri vero dicuntur non critici. Inter dies criticos nonnulli perfecte fausteque morbum judicant, cujusmodi sunt septimus, decimus quartus, & vicesimus.



cesimus, & decretorii nuncumpantur ab Hipp. qui præterea alterum statuit dierum criticorum ordinem, eosdemque adpellat indices, internuntios, vel contemplativos ea ductus ratione, quod istiusmodi dies evidenter judicent crism perfectam subsequenti septenario adfuturam. Hujus ordinis sunt quartus, undecimus, & decimus septimus; quartus est index septimi; ita Hipp. aph. 71. Sect. 4. *Quibus septima die morbi judicantur, his die quarto nubeculam habet urina.* Item quartus dies quandoque enunciat mortem ante septimum adfuturam, quæ semper pertimescenda est, quoties mutationes die quarto supervenientes consuetos limites transiliunt. Undecimus est index decimi quarti, & decimus septimus vicesimi.

Qui dies inter criticos, & indices intermedii sunt, dici solent intercalares, cæteri autem dicuntur vacui. Intercalares sunt tertius, quintus, nonus, decimus tertius, & decimus nonus, geruntque vices dierum criticorum, licet reipsa nunquam illis æquipolleant. Quod si crism aliquando moliantur, recidiva pertimescenda est, ut de die quinto peculiariter enuntiavit Hipp. Reliqui tandem dies, qui neque critici, neque indices neque intercalares sunt, vocantur vacui & medicinales; sunt quæ sextus, octavus, decimus, duodecimus, sextus decimus, decimus octavus. Hisce diebus cum nihil notabile sponte naturæ contingat, aliquid boni procurari potest artis ope, cum revera iisdem diebus exhiberi medicamenta tuto possint. Quod si forte iis ipsis diebus crises contingant, eadem pravæ, & infidæ censendæ sunt. Notatur autem præ cæteris dies

sextus utpote reliquorum pessimus. *Hipp.* in coac. sudores, inquit, sexto die erumpentes pessimi, & aph. 62. sect. 4. *Icterus sexto die lethalis*. Quid! quod in epidem plures habentur historiae, quibus evincitur crises sexta die excitatus in perniciem ægrotantis abiisse. Unicus adest casus ex sect. 3. epid. lib. 3. desumptus, qui iis opponitur, quæ hætenus de sexta die constituta sunt. Larissæa enim virgo sexta die fuit salutariter judicata. Sed advertente *Galeno* casus hic fuit rarissimus, & præter consuetudinem naturæ; extraordinario namque conatu triplicem evacuationem natura molita fuit; nempe menstruam purgationem, largam hæmorrhagiam, & copiosum sudorem; quæ autem perquam raro contingunt non sunt attendenda.

Demum qui ad quadragesimum usque diem progrediuntur morbi, ii suas crises ultra vicesimum, scilicet vicesimo septimo, tricesimo quarto, & quadragesimo die perficiunt. Huiusmodi dies septeni numerabantur a Veteribus, cum tamen à primo die usque ad vicesimum non modo septeni, sed etiam quaderni numerarentur. Septenarii majoris momenti sunt septimus, decimus quartus, vel vicesimus primus, ac propterea diligenter observari debent. Quartus, octavus, duodecimus, decimus sextus, & vicesimus sunt quaternarii magni quidem momenti, atque adeo accurate, ac diligenter attendendi. Generatim autem dies in pares, & impares distinguebant, & & imparibus diebus biliosos, paribus vero sanguineos morbos peragere motus suos existimabant.


Atque huc potissimum ea referuntur omnia; quæ circa discrimen dierum a Veteribus ad nos usque



usque delata sunt. At vero cum iidem a se invicem maxime dissentiant in adferenda ratione, qua dies definiri, & constitui debeat, cumque, quod magis est, discrepent pariter inter se in definiendo die, qui in quolibet morbo dici, & haberi possit primus, hinc est, ut nonnulli doctrinam cricum, & dierum criticorum ab *Hipp.* constitutam utpote obscuram, vagam, & erroribus obnoxiam repudiarint. Quibus tamen reponi potest 1. consentaneum rationi esse, ut qui quotidianas naturæ operationes in corpus humanum contemplandas susceperunt, easdem exposituri naturalem diem selegerint, sive commoditatis gratia, sive quod morborum cursus naturalem potius, quam artificialem diem revera respiciant, ut propterea dies medicus sit dies naturalis, & dies criticus non alius, quam medicus, sive naturalis. 2. Criticorum dierum computationem non esse quidem ab eo tempore instituendam, quo lassitudine aliqua, aut alio non ab simili incommodo adfectus decumbit æger, sed quo febrili aliquo motu conripitur: hoc enim modo fieri vix poterit, ut in enumeratione dierum criticorum aberretur.

Antequam vero huic capiti finem imponamus observandum est, quod si mulier puerpera acuta feбри concipiatur, criticorum dierum computatio a tempore partus, non vero febrilis insultus institui debeat, si partus fuerit præternaturalis; Si vero naturalis, tunc ab initio febrilis motus procedat necesse est computatio. Ut plurimum autem supervenientes febres partum subponunt a naturali modo recedentem, atque adeo ut plurimum computatio a tempore partus instituenda est, ut tra-

dit *Hipp.* lib. 3. prognost. Patet autem ratio, cur dies critici in puerpera sint hoc modo computandi; quippe præcedens partus non omnino naturalis insignem parit humorum commotionem, atque adeo tunc revera incipit morbus, quamvis labores partes ut plurimum morbi insultus, & læsiones obscurant. In vulneribus, contusionibus &c. computatio a die inflicti vulneris, &c. non a die supervenientis febris instituitur; symptomatica enim, ut aiunt, est illa febris. In recidivis morborum ab initio ipsius morbi, non a die recidivæ fieri debet enumeratio. Cum enim reliquæ materiæ morbificæ recidivam faciant, unus idemque censendus est morbus. Et ita plane dies criticos numeravit *Hipp.* ut videre est in pluribus historiis epidemiorum.





## ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ

## CAPUT I

**E**Xpediendā ex ordine sequitur quarta pars Medicinæ, quæ dicitur semiotica, quæque signa, & characteres exhibet, quorum præsidio sanitas, & morbus, variæque morborum species, & horum exitus determinari possint. Signorum nomine phænomena illa intelliguntur, quibus humani corporis habitudinem, vel statum tum præsentem, tum subsequutum detegit Medicus. Ex qua definitione inlico patet duo esse genera signorum, salubria nempe, & insalubria, quandoquidem duæ sunt habitudines, vel status corporis, sanitas scilicet, & morbus. Signa insalubria sunt vel diagnostica, vel prognostica; Diagnostica, seu indicativa præsentem corporis statum ostendunt, prognostica subsequuturas illius mutationes prænunciant.

Sed & diagnostica signa in pathognomonica, & communia distinguuntur. Pathognomonica, seu morbum significantia ea sunt, quæ essentiam, naturamque morbi ita perpetuo comitantur, ut ab eo sejungi non possint, quæque juxta morbi magnitudinem augentur, vel minuuntur. Hæc autem pathognomonica signa aliquando ex uno, aliquando vero ex pluribus una simul conjunctis phænomenis constituuntur. Sic pleuritidis signum patho-

gnomonium conformatur ex dolore lateris punctorio, difficultate spirandi, tussi, febre acuta, & sputo cruento. Signum vero pathognomonicum cardialgiæ conformatur ab unico sensu punctorii doloris vehementissimi, & plane exquisiti in superiori orificio ventriculi. Quod si in morbis nonnulla quandoque signa observentur, quæ eorum naturam minime declarent, sed ex adcidente cum illis coniungantur, & adcidentia quædam morborum ostendant, puta magnitudinem, morem, eventum, ut quando in pleuritide supervenit dolor ad jugulum, aut ad hypocondria, aut æger facilius in latus adfectum, quam in oppositum se se convertit, atque decumbit, tunc huiusmodi signa vocantur adfidentia. Communia denique dicuntur tum adfidentia illa, si occurrant, tum ea, ex quibus pathognomonicum signum constituitur, si seorsim adcipiantur.

Tres autem constitui vulgo solent signorum fontes. Vel enim sumuntur signa ab essentialiter, ut ajunt, inhærentibus, scilicet a peculiari partium textura, indole, actione, connexione, consensu cum reliquis, dispositione, & id genus aliis, vel a causis procathartæcicis, ab hæreditaria, aut congenita dispositione, ab ætate, sexu, vitæ genere, temperamenti, aliisque; vel demum ab effectibus, ad quam classem omnia symptomatum genera revocantur, pulsus item, & urina, ut & signa omnia ab juvantibus, & lædentibus desumpta. His de signorum differentiis constitutis consequens est, ut ad signa salubria, seu salutatis declaranda gradum faciamus, ut deinde ad insalubria pro viribus exponenda properemus.

CA-



## CAPUT II

## DE SIGNIS SANITATIS

**S**igna sanitatis a causis tum externis, tum internis, simulque ab effectibus desumuntur. Signa autem ab externis petita causis sunt 1. ortus a parentibus sanis, robustis, & integræ ætatis, qui corpus convenienti exercitatione roborarint, nec nimium, aut præmature veneri, curis, studiisque litarint. 2. Optima tum in utero a Matre, tum in lactatione a matrice, tum deinceps a salubribus alimentis nutritio, qua corpus & mole, & viribus ad vicesimum quintum, vel tricesimum usque ætatis annum æquabiliter augeatur. Interiores autem causæ firmam valetudinem indicantes sunt optima solidarum, & fluidarum partium constitutio, quæ in eo sita est relata ad solidas partes, ut fibra sit fortis, elastica, & sufficientem vasis omnibus, & visceribus actionem impertiat, ita ut regularitatem, & constantiam in suis functionibus semper tueantur; hoc enim modo & circulatio in minimis vasculis recte procedit, humorum stagnatio, corruptio, & acrimonia præcavetur, secretiones rite perficiuntur, nec sanguineus latex gravatur iis humoribus, qui juxta sanitatis leges diffusi debent; nervosæ autem partes non plus satis ab impressionibus adficiantur, ne machina ad leves quascunque causas perturbetur.

betur. At vero optima, & firma valetudo relate ad fluidas partes in eo sita est, ut nec nimium effrænes, nec nimium languidi sint humorum motus, iidemque nec copia peccent, nec qualitate.

Effectus quod adinet mediocritas quædam ingenii, & sensuum omnium, & motuum animi, somnus placidus, æqualis, & vires reficiens, laborum tolerantia, levitas quædam corporis, respiratio lenta, facilis, æquabilis, magna, plena, sed sine magna organorum respirationi ipsi famulantium mutatione, pulsus pariter lentus, æquabilis, magnus, plenus fortis, nec ad leviores quaslibet causas mutabilis, calor mediocris in toto corpore, appetitus, & facilis digestio, alvus mediocriter tarda, & sicca urina parcior, & cocta, rarus sudor, æquabilis perspiratio, excretiones denique omnes moderatæ indicia sunt optimæ sanitatis. His adjungit *Boheraavius* thoracem latum, amplum, abdomen gracile, & compressum, humeros, brachia, scæmorra, crura firma, torosa, carnosa, hirsuta densis, setosisque pilis hirta, cranium magnum, & capax præsertim ad occiput, non a parte faciei adabrente, sed fallaci specie, cutem duram, carnem multam, adipem parciolem; quibus addere possis calorem non valde roseum, aut candidum, sed potius nigricantem; calor enim valde candidus, aut roseus fibrarum indicat debilitatem, & aliquam sanguinei laticis solutionem.

Ut autem a generalibus ad singularem cujusvis hominis sanitatem, atque temperiem procedamus, hæc conligi possunt ex iis, quæ alio loco de temperamentis differuimus. Signa temperamenti cholericum sunt sensus omnes vividi, & exquisi-  
ti



ti, frequentes motus, quin & inconstantia, citissima contractio, & relaxatio cordis, & arteriarum, maximus caloris gradus. sanguis exaltatus, lotium aurantii coloris, & relative paucum, macilentia, statura nimia aut procerioris stature tenuitas, robur insigne corporis, venæ maxime coeruleæ, faciei color aliquanto vividus, & rubicundus, oculorum humores turbidi, & ex nigro furvi, pilorum color aut aureus, aut flammeus, pili conferti, & breviores, vox acutissima, canora, debilis, pulsus celer duriusculus, haud valde magnus, velox respiratio, aliaque ex alibi constitutis eruenda. Signa quoque temperamentorum desumi possunt ex morbis, quibus variæ temperiei homines obnoxii sunt. Sic cholericis tentari solent adfectibus spasmodicis, asthma spasmodico, cephalicis doloribus, epilepsia, stranguria, ischuria, dysuria, passione cholica, hæmorrhagia, hemothysi, phthysi omnis generis, aliis que similibus.

Signa phlegmatici temperamenti sunt segnities, minimus ciborum adpetitus, sensuum hebetudo, tenacia propositi, lentissima contractio, & relaxatio cordis, & arteriarum, minimus caloris gradus, sanguis pallidus, & flavoruber, urina pallida, turbida, & viscida, obesitas prominentia, & insignis corporis crassities, minimum robur, venæ pallidæ, & obscuræ, facies item pallida, oculorum humores turbidi; ac viscidi, pilorum color albus, lacteus, nec splendens, pili longissimi, & rari, vox gravis, fortis, & racua, pulsus parvus, ratdissimus, ac mollissimus, longa inspiratio, ac segnis expiratio, aliaque ex dictis conligenda. Conripi autem solent phlegmatici diarrhœis

rhœis, lienteris, diabete, sudoribus conliquantibus, asthma pituitoso, paralyfi; leucophlegmatia, hydrope, tumoribus glandularum, adfectibus, soporosis, & similibus.

Signa temperamenti melancholici sunt sensus non valde exquisiti, constantia propositi, lenta cordis, & arteriarum contractio, & alterna relaxatio, mediocris caloris gradus, sanguis fuscus aut saltem atrorubens, urina maxime pallida, turbida, & pauca, statura mediocris, mediocre item robur, color faciei fere atro rubens, humores oculorum densissimi, & non nisi pulli coloris, pili non impense crispatis, duri, splendentes, ac breves, vox fortis, & paulo acutior, simulque rauca, pullus magnus, tardus, ac durissimus, profunda, & gravis respiratio, aliaque ex constitutis desumenda. Adfici autem solent melancholici adfectibus spasmodicis, apothematibus, ictero tum flavo, tum nigro, passione hypocondriaca, melancholia, mania, viscerum obstructionibus, apoplexia, & similibus morbis.

Denique sanguinei temperamenti signa sunt sensationes non tam fortes, quam in melancholicis, nec tandiu perdurantes, minor, quam in choleris inconstantia, cita contractio, & relaxatio cordis, & arteriarum, magnus caloris gradus, sanguis floridus, urina citrei fere coloris, & paulo copiosior, quam in choleris, statura procera, mediocre corporis robur, sanguis vividus, & rubicundus, color oculorum nigerrimus, aut etiam cæruleus, & splendens, pili valde crispatis, paulum splendentes, teneri, & coloris furvi, mediocris eorum copia, & longitudo, vox debilis, a-  
cura



cuta , clara , omnium optima respiratio . Obnoxii vero sunt sanguinei , diarrhoeis , sudoribus conluctivis , diabete , paralyfi , hæmorrhagiis , graviori apoplexiæ , inflammationibus omnis generis , vericibus , aneurismatibus , abscessibus , asthmati sanguineo , phthisi pulmonali , aliis que similibus morbis .

## C A P U T I I I

### DE SIGNIS PLETHORÆ .

**S**igna plethoræ in sanguineis , & biliosis sunt color floridus , rubicundus totius corporis , ac præsertim faciei , & labiorum , sensus caloris vel in ipsis corporis extremitatibus , in phlegmaticis autem , & melancholicis adspectus vividior . Generatim vero plethoræ signa sunt firma valetudo , & robur corporis , inflatio vasorum omnium , pullus plenitudo , & vehementia , appetitus optime sibi constans , somnus quietus , profundus , præsertim in loco temperato , membrorum gravitas , & subita , a motu defatigatio , aliæque huiusmodi .

## C A P U T I V

### DE SIGNIS CACOCHIMIÆ.

**C** Acochimix nomine variæ acrimoniæ species intelliguntur. Signa acrimoniæ alkalinæ sunt sitis ingens, adpetitus dejectio, & averfatio ab alimentis alkalescentibus, ructus nidorosi saporem ovi corrupti in ove relinquentes ob portionem falium putridorum, rancidique olei, quod cum ære extricatur, materiæ crassæ linguam, & palatum obsidentes, & ex ranciditate succorum digerentium, seu vitio bilis ad corruptionem vergentis amaritiei sensationem excitantes, fœces alvi nigræ, urinæ crassæ, fuscæ, fœtidæ parum aut nihil sedimenti demittentes, sudor aut pessime olens, aut nullus, cutis ariditas, sanguis tenuis, floridus, & dissolutus, dolores stomachi ab irritatione falium acrimoniosarum profecti, sensus caloris, spontanea lassitudo, anxietas, inquietudo, ubi vero acrimonia alkalina eo devenit, ut ad morbos excitandos valeat, ejusdem signa sunt dolores ad ilia inflammatorii, erosia cinericia, plumbea, nigra, celerrime serpens, pustulæ ichorosæ, rubellæ, fuscæ, plumbeæ, nigræ subitam gangrænam inferentes, maculæ purpureæ, bubones, anthraces, inflammationes acutissimæ, sphaceli, & alia hujusmodi.

Signa acrimoniæ acidæ sunt halitus corporis acidum redolens, sapor similis, pallidus faciei, labio-



labiorum, & gingivarum color, fitis haud valde intensa, adpetitus plerumque ingens, celerrima digestio, desiderium verum terrestrium, alvi tormina, frigus, alvinæ fœces virides, & acidum spirantes, urina stranguriosa, alba crassa, & copiosum, crassumque demittens sedimentum, sudor acidus, & una largus, sanguis crassus, quandoque pallidus, quandoque vero niger, & dum eadem acrimonia intenditur, lentæ erosiones, lentæ item, ac leves inflammationes.

Signa acrimoniæ muriaticæ sunt sapor salus, fitis ingens, & constans; rigiditas, siccitasque corporis, urina salsa lente putrescens spissum relinquens sedimentum, erosiones lentæ, prurientes &c.

Denique signa acrimoniæ oleosæ putrefactæ sunt foetor empyreumaticus, sapor amarus, rancidus, pinguis, acer, nausea, dejectio adpetitus, facies exurens, fitis ingens, urinæ flammea, & foetidæ, oris siccitas, totius cutis ariditas, sanguis ambustus, erosiones fervidæ, nigrae, celeres, acres, & pertinaces inflammationes, similes subpurationes, gangrænæ foetidissimæ &c.

## C A P U T V

### DE SIGNIS PARTIUM TUM IDIOPATHICE, TUM SYMPATHICE AFFECTARUM.

**S**igna cujuscumque partis idiopatice affectæ desumuntur 1. ab indole, figura, & situ ejusdem

dem partis. 2. A causis affectionis. 3. A symptomatibus, quæ affectionem ipsam consequuntur. Itaque si pars fuerit ultra modum, aut calida, aut frigida &c. vel præter modum dura, vel mollis, eandem præter naturam affectionem esse dicimus. Sic dum pars plurimum incalescere deprehenditur, erysipelatis, dubitatio succurrit. Sic pariter si in hypocondriis duritiem, & tactui resistantiam percipiamus; de obstructione subjectorum viscerum dubitamus. Sic etiam si tumor occurrat in dextro hypocondrio lunarem obtinens figuram, argumento est partem hepatis gibbam affectam esse. Si vero oblongus sit tumor, & magis ad superficiem accedens, male affectos indicat rectos musculos abdominis. Ex situ etiam conjici potest partem quampiam morbasse adfici, ut patet.

Causas quod adinet, ex vel externæ sunt, vel internæ. De externis nihil opus est dicere. Internus quod spectat, earum loco considerari solent affectus ipsi. Ita ex hydrope vitium hepatis conjectamus, & lymphaticorum ductuum læsionem. Effectus, & symptomata comprehendunt actiones; ita ut ex earum læsione facile in cognitionem affectæ partis deducamur. Sic sensus, & motus abolitio, nimia vigilia, nimius somnus, & delirium affectionem cerebri significant. Sic læsio peculiaris alicujus sensus læsionem indicat organi, ex quo sensus ille proficiscitur.

Effectus item ea comprehendunt, quæ per partes corporis excernuntur; ex his enim non leve desumitur affectæ partis indicium. Hinc quoties cartilaginosa substantia per tussim ejicitur, cum talis substantia ad asperam arteriam spectet, ejusque  
bronchia



bronchia, huiusmodi partes adfectas esse merito statuimus. Secus vero, si fungosæ carnis frustulum excernatur; indicat enim male adfectam ipsius pulmonis substantiam; quemadmodum spumosæ excretionibus cum tussi ejusdem pulmonis adfectionem enunciant, quam etiam declarant copiosæ sanguinis excretionibus; vasa enim insignia pulmones obtinent, non trachea. Quod autem spectat ad excrementa, quæ naturaliter continentur in corpore, quoties a vulnere excernuntur fœces, aut urina, statim intestina, aut vesicam vulneratam enunciamus. Si reddatur cibus, vulneratum ventriculum inferimus. At præter naturam contenta quod adtinet, si arenulæ, vel lapilluli cum urina excernantur, adfectionem cognoscimus vesicæ, & renum; & si lumbrici adpareant, signant adfectionem intestinorum. Qualitates etiam excrementorum adfectionem partis enunciant. Hinc si aer expiratus sit calidior, aut frigidior, has ipsas qualitates inesse pulmoni statuendum est, neque frigiditas citra proximam mortem contingit. Si saporem acidum ructus redoleant, argumento est ventriculum cruditate laborare. Si sanguis tenuior, aut flavior fuerit, & cum saltu exiliat, arteriam indicat vulneratam. Item ex modo excretionis in cognitionem venimus partis adfectæ. Sic excrementa, quæ exspuendo reddimus, signant os adfectum, quæ screando fauces, quæ tussiendo pulmones, atque tracheam, quæ vomendo ventriculum. Nec levis momenti est ordo, in excernendo. Sic in dysenteria si ante fœces excernatur sanguis, aut pus, verosimile est male adfectum esse intestinum rectum. Si vero excernatur post fœces, aut cum his val-

de permixtum, vulneratio denotatur intestinorum. Qualitates etiam mutatae partem sistunt laborantem. Sic ubi calor, aut frigus est, ibi morbus est monente *Hipp.* Nimius, & pertinax in genis rubor pulmonem indicat inflammatum. Sapor amarus bilem vel e ventriculo regurgitantem, vel potius ejusdem bilis redundantiam significat, atque ita de ceteris.

Signa partis sympathice adfectae desumi posse videntur ab juvantibus, & laedentibus. Nam quoties pars aliqua laborat idiopathice, nisi eidem parti remediis succurratur, nullum, aut saltem non sensibile levamen æger percipit; secus autem si laborat per consensum. Nam admotis remediis parti illi, ex qua derivari morbum suspicamur, cessat morbus, quin laboranti eidem parti per immediatum contactum prospiciamus. Sic urgente capitis dolore absque manifesta causa, quæ caput ipsum lædat, si stomacho medeamur, etsi manifestam hic adfectionem non exhibeat, & felici cum successu id contingat, capitis nempe dolor evanescat, aut mitescat, argumentum est dolorem capitis propter consensum cum ventriculo excitari. Præterea quoties duabus partibus simul laborantibus alteri admota medicamenta parem utilitatem, paremve noxam alteri adferunt, palam est hanc sympathice adfieri illa idiopathice laborante. Sic tam ventriculo, quam capite male adfectis si medicamenta soli ventriculo adhibita æque capiti profuisse comperiantur, vel æque lædant utrumque, significant ventriculum primario, caput vero secundario, & sympathice laborare. Ut plurimum autem adfectus sympathicus non adeo vehemens est,  
ut



ut idiopathicus ; quare ex duabus partibus una simul laborantibus ea primario adficitur , quæ magis vexatur , altera per consensum . Tandem quæ pars idiopathice patitur gravius in exacerbatione tentatur , quam quæ per sympathiam laborat .

## C A P U T V I

### DE SIGNIS MORBORUM, ET TEMPORUM MORBI

**I**Nter morborum signa alia imminentis , alia præsentis morbi sunt signa . De signis præsentis morbi dictum est , igitur potiora de signis morbi imminentis adferemus . Hæc autem sunt insolitæ , atque insignes functionum mutationes ; scilicet malum prænunciant somnus gravis , infomnia turbulenta , vigiliæ perpetuæ , torpor animi , aut sine manifesta causa inquietudo , capitis gravitas , arteriarum temporalium distensio , & pulsatio , frequentes oscitationes , sudores intempestive oborti , & præsertim circa cervicem , pectus , genua , coxas ; *Ubi enim sudor est , inquit Hipp. , ibi est morbus* . Malum quoque prænunciant animi defectiones ; Eodem enim docente *qui sæpe , & sine manifesta causa animo delinquant , ii de repente moriuntur* . Idem portendunt spiritus gravior dejectio adpetitus , alvus tardior , urina parcior , & præ ceteris inminuta perspiratio , infueta quædam universi corporis lassitudo ; *Spontanei quippe labores*

*morbos prænunciant*, ut idem docet *Hipp.* Ad hæc si quis & coloratior, & speciosior se ipso fieri videatur, suspecta, ut ait *Celsus*, habere sua bona debet. Cujus rei causam adfert *Hipp.* quod neque in eodem habitu manere, nec ultra progredi potest, sed decidat in deterius oportet. Pejus tamen signum est, si quis præter causam emacruit, & vividum illum colorem amisit; Ubi enim macies adest, virium infirmitas, & gravis morbi tollerantia expectari possunt, quippe extenuatio, ut restatur *Galenus*, imbecillitatis virium signum est.

Jam vero quoties indoles, & natura morbi sensibilis innotescit, toties innotescunt ipsius morbi tempora. Sic febrem adhuc in principio esse cognoscimus, quoties inceptus calor per corpus diffusus tenorem eundem servat, in augmento, cum sensibilibiter crescit, in statu cum adauctus perseverat, in declinatione tandem, cum incipit paulatim decrescere. In genere autem tenendum illud est, quod in principiis morborum leviora sint omnia, in augmento pejora, in statu pessima, & persistentia, in declinatione actiones magis ad naturalem statum adcedunt. Præterea ab excrementorum cruditate desumuntur indicia; scilicet dum excernenda omnino cruda sunt, nec ullum coctionis rudimentum ostendunt morbi principium significant. Cum aliquod, sed leve initium coctionis adparet morbi augmentum ostenditur, & cum maxima coctionis adparent indicia status ejusdem morbi designatur. Absoluta denique, ac perfecta coctio, & excrementorum in melius commutatio exoptatam enunciant ipsius morbi declinationem.



Ex inde vero acuti morbi characteres decerni possunt, & varius acutiei gradus prænosci. Et quidem signa eruuntur 1. ex velocitate, & vehementia incrementi. 2. Ex vehementia symptomatum; *Ubi enim morbus obtinet, statim extremos habet labores ex Hipp.* 3. ex læsione functionum. 4. Ab excretis. 5. A constitutione epidemica. 6. Ab anni tempestate. 7. Demum ab effectuum observatione, qui ab humorum peculiari vicio proficiuntur. At vero celerior, aut tardior acuti morbi solutio prænosci potest ex signis coctionis celerius, aut tardius adparentibus, seu ex signis cruditatis celerius, aut tardius evanescentibus.

Signa morbi periculosi repeti debent ab intensitate majori causæ noxiæ, sive materiae morbificæ, & simul a debili facultate naturæ, & magno virium ejus dispendio. Cum enim extremum malum imminet, quoties vires causæ noxiæ, & naturæ facultas ad æquilibrium adcedunt, aut hæc ab illis superatur, cumque eo sit facilius facultatem ipsam naturæ vi causæ noxiæ æquare, vel etiam ab illa superari, quo minor est naturæ ipsius facultas, ejusque virium majus dispendium, hinc est, ut status ille periculosus censendus sit. Hinc si magna sit intensitas causæ noxiæ, & una minor naturæ facultas, aegrotanti certa mors impendet.

Denique cruditas morbificæ materiae patet ex vigore morbi durante, vel crescente, ab jugi symptomatum augmento, ab exercitio functionum læso, denique ab excretorum cruditate. Coctio vero ex quiete morbi, ejusque decremento, vitæ viribus vel constantibus, vel invalescentibus, ab

inminutione, & sedatione symptomatum, concomitante vitae robore, a restitutione functionum, & excretorum coctione.

## C A P U T V I I

DE SIGNIS, QUORUM OPE CRISES ET MORBORUM EXITUS PRÆNOSCI POSSINT.

**S**igna proximam crisin præmonstrantia plurimum faciunt ad morbum, ut par est, tractandum; tunc enim remediorum usus inhibendus est, ne naturam mederi morbo studentem ab opere dimoveamus. Morborum autem solutio per crisin absolvenda duplici modo contingit, paulatim scilicet, aut subito; prior chronicis, seu parvis morbis, hæc acutis convenit. Si ergo ex signis alio loco constitutis prænosci possit morbum esse acutum, præsagiri tuto poterit eundem per crisin terminaturum. Contrarium vero prononuciare licebit, quamvis non ita tuto, & constanter, si eundem lente progredi, sive chronicum, & parvum esse deprehendas. Fieri enim potest, ut morbus, qui & lentus est, & parvus, oborta aliqua crisi terminetur.

Neque vero satis est prænoscere, utrum morbus paulatim, utrum vero per crisin terminaturus sit, sed præterea & tempus, & criseos species, & quae plurima ad ipsam pertinent sunt accurate pernosceda. Itaque signa, quae circa crisi-

fin



sim versantur, triplici modo considerari possunt. Etenim alia crīsim ipsam antecedunt, alia comitantur, alia subsequuntur. Per signa, quae crīsim antecedunt & tempus, & crīseos species praenunciatur. Tempus autem crīseos tum ex signis cruditis, & subsequēntis coctionis, tum etiam ex vehementia symptomatum innotescit.

Verum coctionis signa, & simul vehementia symptomatum considerata sunt, ut tempus subsequuturæ crīseos praesagiri tutius possit; quo enim celerius ingravescit morbus, eo citius expectanda est solutio. Instare autem crīsim indicant perturbatio illa quae critica dicitur, nec non symptomata, quae pariter critica nuncupantur, quaeque supra a nobis constituta sunt. Ut enim testatur *Galenus* crīsim futuram inde praecognoscimus, quod urgeatur, & vehementer irritetur natura a morbo, atque ex subita praeter rationem facta circa corpus perturbatione. Quibus addit, *quando crīsis futura est, omnino fit aliqua novitas vel circa respirationem, vel circa mentem, vel auditum, vel visum, vel ferendi facilitatem.* Et sane dum natura omnibus viribus morbificæ materiæ expulsionem molitur, fieri non potest, quin omnia exacerben-  
tur. Hinc legimus apud *Hipp. aph. 13. sect. 2.* *Quibuscumque crīsis fit, iis nox gravis ante adfectionem existit.*

Jam vero ut judicium aliquod ferre possimus, num per excretionem, num vero per abscessum expectanda sit crīsis, observandum est, quod si morbus sit acutus, & vires materiam morbificam moventes validæ sint, expectanda est judicatio per excretionem aliquam, non vero per abscessum.

At si morbus fuerit diuturnus, aut vires morbo-  
 am ipsam materiam moventes sint languidiores,  
 tunc morbus ipse per abscessum terminabitur. *Quos  
 febres longæ exercent*, inquit Hipp. aph. 44. sect. 4.  
*iis tubercula, vel labores fiunt in articulis.* Tutius  
 vero id præ sagietur, si urinæ tenues, & crudæ  
 diu præcesserint, quod pariter idem docuit Hipp.  
 2. prognost. his verbis. *Quicumque urinas tenues,  
 & crudas multo tempore mingunt, si alia veluti su-  
 perstitibus futuris signa fuerint, in his oportet expe-  
 ctare abscessus in regionibus infra septum transversum.*  
 Abscessum etiam quandoque indicat natura morbi  
 ad eisdem proclivis, ut febres pestilentes acutæ ex  
 decidentia, & nulla signa perfectæ criseos. Ex ad-  
 verso autem ab omni metu abscessus liberantur  
 quibus urinæ albæ, & crassæ fluxus supervenit, ut  
 idem scribit aph. 47. sect. 4. *Quibus spes est ad ar-  
 ticulos futurum abscessum, liberat ab abscessu urinæ  
 multa crassa, & alba exiens.* Locum vero, ad quem  
 futura traductio est morbosæ materiæ, præ cete-  
 ris ostendit cognita relativa partis debilitas, tum  
 pruritus, aut dolor, aut calor, aut rubor, tum  
 demum quicumque in universum molestiæ sensus  
 in parte ipsa percipitur, quæ quidem indicavit  
 Hipp. aph. 32. sect. 4. *Quibus convalescentibus ex  
 morbo aliquid laboraverit, illic abscessus fiunt, & si  
 ante morbum aliqua parte doluerint, hic morbus fir-  
 matur.* Galenus autem 3. de crisibus cap. 2. ait,  
 quod nisi morbus fuerit valde diuturnus, & subi-  
 to difficultas anhelitus morbo superveniat, deinde  
 adquiescat, atque subsequatur gravitas, & capitis  
 dolor, somnus gravis, & surditas, necesse est,  
 ut in glandulis post aures abscessus fiant.

Nunc



Nunc vero ad tradenda signa progrediamur singularum excretionum, per quas sæpius, quam per abscessum judicantur morbi. Sanguinis itaque e naribus effluxuri hæc habentur signa. Splendores oculis obversantes, eorundem habetudo, lacrymatio, & rubor, lucis averfatio, rubor item genarum, & narium, colli dolor, temporum gravitas, leves vertiginosi insultus, spirandi difficultas, hypocondriorum tensio, sed sine dolore. Nam si cum dolore conjuncta fuerit, eorum utique inflammationem non profluvium sanguinis portendit. Ad hæc si nares pruriant, jam jam erupturus est sanguis, præsertim si dolor circa faciem, & tempora, dissentio, pulsatio, & calor adfuerit.

Futuri autem vomitus indicia sunt morsus oris ventriculi, dolor capitis, vertigo, & obversantes oculis tenebræ, inferioris labri agitatio, frequens sputatio, profluxus ex ore tenuis, & copiosæ salivæ, nausea, & cibi fastidium, & algor superveniens.

At expectandus erit alvi fluxus, si toto morbi decursu, præsertim vero die indice paulo fluidior fuerit alvus, si indicia desint ceterarum excretionum, rugitus autem plurimi in imo ventre percipiantur, ejusque inflatio cum sensu quodam gravitatis, & mordicationis adcesserit.

Sudore ut plurimum terminantur morbi acutissimi. In iis etiam, qui mollioris, & laxioris sunt habitus, facilius erumpit sudor. Eo autem instante rigor vehemens persentitur anxietas multa circum præcordia, & inquietudo ægrum excruciant, mox levis quidem vapor ab ejus corpore adsurgit, pulsus est mollis, fluctuans, undosus, exte-

exteriora calent, & rubent, cutis mollis est, & tandem sudore tota perfunditur.

Futura crisis per urinam præcipua hæc habet indicia, scilicet sensum gravitatis in perinæo, pruritus, & ardorem ad extremum pudendi. Quod si die indice urinæ fuerint uberes, spes adfulget fore, ut eadem die critico copiosissimæ adsint, morbumque solvant, præsertim si reliquæ deficiant excretiones.

Signa futuræ excretionis per menses innotescunt ex gravitate, & æstu lumborum, dolore, ac tensione hypogastrii, præsertim si tempus instet, quo fluere illi solent in statu sanitatis, & ea omnia recurrant symptomata, quæ ægris superveniunt instantibus catameniis.

Denique criticæ excretionis per hæmorrhoides signa sunt æstus circa spinam dorsi, dolor, ac tensio lumborum, dolor item in abdomine, præsertim circa intestinum rectum.

Signa, quæ crisin comitantur, ea sunt, quorum præsidio cognosci debet, utrum dum actu perficitur crisis, hæc perfecta sit, utrum vero imperfecta, salutaris, an lethalis. De hisce autem crisis alio loco differuimus. Denique ut ea etiam signa referantur, quæ crisin subsequuntur, signa nempe quid post crisin futuram sit demonstrantia, observandum ducimus illud contingere posse, ut morbus, qui jam per crisin depulsus videbatur, in alium morbum commutetur. Utrumque autem hoc malum iisdem signis prænosci poterit, quibus optima, ac perfecta crisis præmonstratur. Si enim vero per signa illa cognosci possit crisin in morbo minime omnium perfectam fuisse, aut recidiva



cidiva in priorem morbum, aut in novum conversio pertimescenda est.

Denique, ut multa paucis contrahamus, animadvertendum est ea omnia, quibus coctio, expulsioque morbificae materiae retardari, aut alia quavis ratione impediri, ac tubari potest, ea, inquam, omnia aptissima, esse ad recidivas faciendas, aut novos morbos excitandos. Hinc est, ut morbi maligni, & mali moris, & quos viscerum, lentique pariunt humores, item qui per autumnum, & qui male adfectos homines invadunt, diuturni tandem omnes magis obnoxii sint recidivis, quam benigni, verni, aestivi, acuti omnes, & qui bene constituta corpora adgrediuntur. Majorem tamen recidivae, aut alterius morbi metum injiciunt functiones, excretionisque adhuc depravatae, vel nondum ad naturae statum restitutae. Ea de causa si nec vires, nec adpetitus post crifim erigantur, nec bonus adpareat color, si aliquot tantum res juvent, plurimae autem laedant, si urina parum colorata, & tenuis diu excernatur, & id genus alia observentur in aegris, illi certe in morbum levi quacunque de causa relabentur.

## C A P U T V I I I

DE SIGNIS, QUIBUS MORBORUM  
DURATIO PRÆNOSCI POSSIT.

**P**Lura sunt, ex quibus magna ad praesagiendam morbi durationem indicia desumi possunt:

Ea

Ea scilicet nobis exhibent in primis morbificæ materiæ indoles, & natura, ejusmodi motus, status cruditatis, aut coctionis, excrementa, & habitus corporis. Itaque si materiam morbificam non valde heterogeneam esse constiterit, sed talem, quæ subigi facile posse videatur, conjicere dabitur morbum non adeo in longum abiturum. Contrarium vero continget, si contrariæ sit indolis materia morbum inferens. Exinde autem est, ut regio, tempestas, juvenilis ætas, bona corporis constitutio temperies ægri biliosa breviores morbos efficere soleant, contra vero clima; anni tempus, senium, corpus male adfectum, temperamentum ægri phlegmaticum, terrestris, salina, & fluidi viscidiorum constitutio diuturnos morbos excitare consueverint. Quare ex hisce omnibus materiæ morbificæ conditio, atque adeo brevitās etiam, aut diuturnitas morbi primum innotescunt.

Hæc autem adhuc certius statuentur, si ejusdem materiæ morbificæ motus consideretur, quem sane nobis exhibent adcessio, & coctionis progressio. Bene in hanc rem animadvertit *Galenus*, dum ait, quod quæcunque morborum adcessionēs celerime perficiuntur, cito solutum iri morbum significant; quare vehemens ille motus crīsim brevi futuram portendit. Contra vero tanto longiorem futurum morbum prænuunciant adcessionēs, quo fuerint illæ longiores. Item quæ citius invadunt adcessionēs breviorē indicant morbum, quæ vero lentius, aut statā semper hora diuturniorem fore significant. Quod sane docuit *Hipp.* 3. Sect. 4. *Quibuscumque, inquit, adcessionēs fiunt, quacumque tandem hora febris dimiserit, si postridie eadem*



*eadem*, qua antea, hora conripuerit, *judicium habent difficile*; scilicet *reditus ille constans vim*, atque *heterogeneitatem causæ morbosæ* haud facile mutabilem ostendit. Demum quicumque morbi tertio quoque die suas habent exacerbationes, breviores esse solent, quam qui singulis diebus exacerbantur; maxime vero omnium diuturni sunt qui quarto semper die recrodesunt. Breviores item esse consueverunt qui circa mecidium, quam qui matutinis, aut vespertinis horis invalescunt.

Coctionem vero quod adtinet, ex iis, quæ supra a nobis constituta sunt intelligi satis potest, quantum faciat coctio ipsa ad durationem morbi prænunciandam. Quo citius igitur ejus adparebunt indicia, & quo celerius erit ipsius incrementum, eo citius expectanda est morbi solutio; nunquam enim mala reputantur signa coctionis, quocumque tempore adpareant.

Sunt præterea qui certam aliquam, ac definitam totius morbi mensuram ab eadem coctione definiri posse contendunt, statuantque tantum temporis ad integram morbi salutionem requiri, quantum interjicitur ab initio morbi ad usque manifesta coctionis indicia, quod quidem ex plurimis historiis ab *Hipp.* traditis confirmant. Verum in hac re caute pronunciet Medicus oportet, si sapiat. Enim vero contingere multa possunt in processu morbi, quibus coctionis progressus, & expulsio materiæ morbificæ aut adceleretur, aut turbetur, atque adeo morbus ipse aut breviari, aut produci potest.

Quod tandem pertinet ad actiones, excrementa, & habitum corporis quo plures sunt, &  
majo-

maiores actionum laesiones, eo longior pertimescendus est morbus, modo tamen evasurus sit æger. Item quo magis excrementa, & habitus corporis a naturali constitutione recesserint, eo magis de pertinacia morbi, deque ægrotantis vita timendum est. Sic urina, quæ tenuis est, ac decolor nullumve, aut valde tenue, aut contra nimis crassum, & grave sedimentum demittit, quæque modo in melius, modo in deterius conmutatur, vel cui innatant bullæ, morbi diuturnitatem prænunciat, ut pluribus in locis docet *Hipp.* Sic citissime solvetur morbus vel ad salutem, vel ad mortem, aut in alium morbum pravioris naturæ degenerabit, si pessimæ adfectiones in urinis occurrant, simulque morbi symptomata vividius recrudescant. Sic etiam in febre mediocri sudores frigidi diuturnam fore febrem portendunt. Habitus vero corporis si plurimum extenuatus fuerit, vel si ut aph. 28. Sect. 2. habet idem *Hipp.* *non omnino leviter febricitanti permaneat, & nihil minuat corpus, longitudo morbi significatur.* Idem etiam portendit color vehementer pallidus, aut citrinus.

Ad hæc tandem anni tempus attendendum est; quippe quod certi aliquid de longitudine, aut brevitate morbi prænunciare potest. Quare eadem morbi species diutius autumnali, quam verno tempore protrahetur.



## CAPUT IX

DE SIGNIS PROGNOSTICIS EORUMQUE:  
DIVISIONE, ET NATURA.

**P**rognosis, quæ a nobis hoc loco consideratur, tum circa eventum morbi versatur, tum circa modum eventus. Quo ad primum præfagitur, an morbus futurus sit salutaris, an vero lethalis; alterum quod spectat, prædicitur quonam crisis genere terminaturus sit morbus. Hinc duplex oritur prognosticorum signorum genus, ut alia vocentur signa salutis, aut mortis, alia critica, seu judicatoria. Prognostica signa salutis, aut mortis sunt ea, quæ cum urinis, fœcibus, & cum sudore excernuntur. Item facilis, aut difficilis respiratio, lenis, aut difficilis morbi tolerantia, pulsus, & facies a naturali non multum recedentes, decens corporis decubitus, aut his contraria. Signa vero critica sunt quæ subitam mutationem, ac turbationem prænunciant, & ex his quædam sunt tanquam signa, & causæ simul, ut vomitus, utinæ copia, fluxus sanguinis e naribus, sudores, parotides, & similia. Quædam autem sunt tantum signa, ut delirium, sopor, vigilia, inquietudo, aurium sonitus, tenebræ ob oculos obortæ, aut splendores oculis obversantes, nox absque evidenti ratione molesta, & id genus alia, hoc tamen cum discrimine, quod illorum nonnulla maximam vim habeant ad futuram crisin præfagiendam, alia

alia vero non eadem polleant virtute, sed minus efficacia sint.

Critica signa, nisi se obferant in statu morbi, semper suspecta esse debent, ut in principio, aut augmento; neque enim vomitus, sudor, alvi profluvium, tumores ad aures si in principio adpareant, motu critico morbos solvunt, adeoque nec ea quibus hæc ipsa præfagiuntur, in principio laudantur. Sic deliria, vigiliæ, dolores, difficultates spirandi, tenebræ ob oculos, aut splendores si crudo adhuc existente stomacho adpareant, nihil boni significant, sed pessimæ constitutionis sunt signa. Prognostica ex variis fontibus desumuntur, ut ex dicendis constabit.

## C A P U T X

### DE PROGNOSTICIS EX ACTIONUM LÆSIONE REPETENDIS ET PRIMUM DE PROGNOSTICIS EX DELIRIO.

**I**N quovis morbo mente constare, & bene ad ea, quæ adsumuntur, habere, bonum, contrarium vero malum, ut docet Hipp. aph. 33. Sect. 2. Neque solum est malum teneri delirio, sed periculosissimum etiam est, delirium audax, & temerarium observante Galeno. Minus adhuc periculosum, quod est cum mœstitia, tutius, quod est cum risu. Neque vero ad solum delirium, sed & ad alia, quæ adsunt signa, respiciendum est. Ubi enim  
cum



cum delirio, eoque miti bona signa jungantur, minus adest periculi; ubi vero cum delirio reliqua prava conspirant, exitiale. Tria autem sunt, quæ præ ceteris adtendi debent in præfagiendo ex delirio, ut notat *Galenus*, videlicet robur pulsus, respiratio inculpata, & salvus adpetitus; quare si delirium cum robore pulsus, respiratione inculpata, & salvo adpetitu jungatur, certissimum est argumentum satis virium naturæ inesse ad servandum ægrum per integrum morbi decursum. Delirium cum minori periculo est, si sedetur a somno, ut habet *Hipp. aph. 2. Sect. 2.* Perniciosa vero deliria judicantur ex ipsorum magnitudine, tempore, aliisque signis, quæ cum illis copulantur. Nam prava signa cum deliriis adparentia mortem minantur, lethalia vero certum, & instans exitium significant. De his multa observat *Hipp.* Præcipue generale est, quod habetur 1. prorrhēt; *Desipientiæ*, ait, quæ jam admodum fractis, debilitatisque viribus succedunt, pessimæ. Et in *coac. 4.* In febribus insaniæ vehementes silente ægro, sed non privato voce lethales sunt. Et 1. prorrhēt. Mente ob melancholiam aberrantibus tremores supervenientes maligni. Et in *coac. 3.* qui cum his, quæ supra dicta sunt, furiosa, & vehementi mentis motione tenentur, ii si tremuli evadant, maligne habere judicantur. Iterum in vehementi phrenitide tremores mortiferi. Et rursus vacillationes mentis cum voce clangosa, & linguæ conversiones cum tremore, & voces ipsæ obtremiscentes mentis judicant alienationem. Pessimum præterea signum est ex *Hipp. & Gal.* si æger non dormiat, aut si cum somno delirium augetur. Infausta quoque pertendit phrenesia levis in principio sed quæ variat. Præterea

summopere pertimescendum est delirium in principio cujusvis morbi, nec ullo proinde coctionis signo adparente, cum in phrenesim abeat observante *Gal.* Denique, ut plura alia hic omittamus, subitus reditus rationis in ægro phrenesi laborante mortem proximam prænunciant, si nec minuatur febris, nec crisis præcesserit.

Contra nullum periculum portendit delirium, si ad breve tempus duret, nec ulli funesto signo jungatur, & vires ægri constant; secus ipsum ferre natura non potest. Item ex pluribus locis *Hipp.* docemur delirium fausta portendere, si aliqua evacuatio salutaris subsequatur. Infausta contra prænunciat, si precedat evacuationem malæ speciei, ex gr. aliquot guttarum sanguinis pernares, sudores frigidos capitis, & similia. Salutares autem sunt evacuationes, cum ipsarum quantitas proportionem respondet humorum peccantium quantitati, cum ejus sunt qualitatis, ut ejici debeant, cum sunt per conveniens emunctorium, & opportune, scilicet in vigore morbi, vel in die critico, cum subsequitur imminutio morbi, ejusque symptomatum, vel morbus, & symptomata prenitens auferuntur. Ita salutaris est fluxus copiosus sanguinis e naribus, menstrua delirium comitantia, vel subsequentia, hæmorrhoides delirium subsequentes, ut habet *Hipp. aph. 21. Sect. 6.* Idem præfagit somnus tranquillus post delirium, ut & cessatio delirii a somno, quod supra etiam adnotavimus.



## CAPUT XI

## DE PROGNOSTICIS EX OBLIVIONE.

**A**lter læsæ facultatis effectus est rerum oblivio. De hac autem Hipp. 2. prorrh. ait. Ignorantia cum rigore mala, mala item oblivio. At vero quæ cum delirio adcedit oblivio minus periculosa censetur, si delirium, cum quo adpareat, non sit periculosum.

## CAPUT XII

DE PROGNOSTICIS EX VIGILIA,  
ET SOMNO.

**P**urima desumi possunt a vigilia, & somno indicia læsæ facultatis, aut contra inculpatæ. Hipp. 2. prænot. ait de somno. Quemadmodum ex natura, & consuetudine est interdum vigilandum, noctu dormiendum, si contra commutetur, pejus est; minime vero offendit, si quis dormiat prima luce ad tertiam diei partem, qui vero ab hoc tempore fit somnus deterior est. Pessimum vero est signum, si neque interdum, neque noctu dormiat; dolor enim, ac labor, vel desipientia ab eo signatur. Idem aph. 3. Sect. 2. ait. Somnus, & vigilia utraque

*modum excedentia, malum.* De vigilia hic notandum occurrit, quod licet mala dicatur, quoties est inmodica, nihilominus mala non fit, quoties addit nocte, quæ crîsim præcedit. Nam monente Hipp. aph. 13. Sect. 2. *Quibus crîsis fit, nox, quæ adfectionem præcedit, molesta.* Et in prorrh. *Vigilia recensetur inter syntomata, quæ criticas sanguinis profusiones præcedere solent.* Ceterum semper malæ sunt vigiliæ iis præsertim ægrotis, qui fictiori sunt corporis habitu. Malæ item sunt vigilia, quæ cum vomitu æruginoso, dolore capitis, delirio, frigore, sudore capitis constanti, & copioso copulantur; funestæ etiam quas subsequitur coma.

Ad somnum quod adtinet, non leve hic indicium nobis adfert de futuro morbi eventu. Nam ubi somnus in morbo laborem adfert, lethale est ex Hipp. aph. 1. Sect. 2., ubi vero levamen, non est mortiferum. In convalescentia a morbis acutis somnolentia salutatis, initio autem febrium periculosa. In coac. hæc habentur; somni profundi, neque turbulenti, sed tranquilli, & sereni firmum iudicium signant, sive bona præsagiunt. Contrarium vero censendum de adfectibus soporosis, & comatosi, in quibus quo fortior, & profundior somnus est, eo deterior est morbus. Hac autem conjectura naturalis profundus somnus a lethargico, & comatoso distinguitur, in hoc siquidem vix exsperscuntur ægri, quamvis ab extrinseco tententur. Contra in naturali sine difficultate expergefiunt. Huc pertinet dormiendi modus; Funestum enim est hianti patuloque ore dormire; quin sopor extremus, sive adfectio lethargica post longas vigi-



vigilias lethalis est ex eodem Hipp. . Huc etiam spectat , quod idem habet aph. 52. Sect. 6. scilicet considerata esse quæ ex oculis per somnum subadparent . Nam si quid ex albo non commissis palbris subadpareat , neque id ex alvi profluvio , aut medicamenti potione contingat , prævum signum est , & valde lethale .

## C A P U T   X I I I

### DE PROGNOSTICIS EX LÆSIONE SENSUUM EXTERNORUM

**L**Æsiones sensuum externorum notabiles exhibent conjecturas de natura morbi ; in primis autem visus læsio summe periculosa esse solet post crism imperfectam , ut habet Hipp. aph. 49. sect. 4. Ait enim *in febre non intermittente si ager non videat imbecillo jam corpore , mors est proxima* . Eadem quoque docet in coac. Auditus autem læsio , si ex crisi adcidat , non semper mala est , ut deliria , tenebræ oculis obortæ , anxietates , & alia id genus symptomata . Est vero pessima , si languescen-  
tibus viribus citra crism adcidat . Præterea mala est post modicam sanguinis eruptionem , nigram-  
que dejectionem in morbis acutis , ut ex prorrhēt. & ex coac. edocemur . Surditas in acutis post septimum diem , cum aliis bonis signis reconvalescen-  
tiæ indicia præbet , ut observat Baglivius . Docet autem Hipp. quod quibus in febribus ardentibus

aures obsurdescunt, iis non soluta febre necessum est delirare; solvit vero inter alia vel hæmorrhagia narium vel diarrhœa biliosa. *Qui capite dolent cum aliqua surditate, manuum tremore, cervicis dolore, nigricantes reddentes urinas, & densas, ii si nigra evomuerint, perniciose habent.* Iterum in coac. Surditas in acutis, & turbulentis morbis obveniens mala est. Quin & in longis morbis malum portendit. Sonitus quoque & tinnitus aurium continuus si cum signis accidat cruditatis, atque die non critico, & viribus languidis lethalem portendit phreptidem. Ceterum in vigore morbi, & diebus decretoriis accidens hæmorrhagiam indicat narium. Tinnunt autem aures iis, quibus fluxurus est sanguis e naribus, & iste tinnitus perfecta crisi terminatur, ut monet *Riverius*. Olfactus vitium nihil peculiare videtur portendere, nisi quatenus multum, aut parum a naturali statu ille recedit, & a putredine humorum plus minus læditur. Quod adtinet ad gustum, accidit interdum, ut æger cuncta amara, vel salsa, quæ obferuntur, percipiat, quod certe naturam peccantium humorum declarat. At hoc pro præsagiis efficiendis non magnum habet momentum, nisi magnus, atque continuus fuerit a natura recessus; habet tamen, si æger extincta facultate gustu privetur, reliquis pravis signis concurrentibus. Tactus denique vitiatum læsam indicat facultatem, & quidem si stupor accidat, qui vel extinctum in partibus calorem, vel præpeditum, aut maxime vitiatum arguat influxum per nervos, maximam indicat vim morbi. Et *Hipp.* in coac. ait, quod *rigores multi torporem ferentes maligni sint.*



## CAPUT XIV

## DE PROGNOSTICIS EX DOLORIBUS

**D**olores, qui ad læsionem pertinent alicujus facultatis, dupliciter considerantur, nimirum vel in principio morbi, vel post adparentes coctiones. Qui sub initium contingunt rationem plerumque habent signorum pathognomonicorum, & viscus aliquod inflammatum denunciant, & inflammatorii nuncupantur, si quando dolor cum febre, tumore, vel tensione, aut punctura partem conripiat. Hujusmodi autem dolores parum mali portendunt, nisi fuerint vehementes vel constantes, sed post aliquam aut spontaneam, aut arte paratam evacuationem remittantur. Qui contra diu perseverant abscessus sæpe prænunciant. Qui procedente morbo eveniunt haud censentur mali, quod scilicet crisim enuncient post sanguinis eruptionem, vel vomitum, vel aliquam aliam evacuationem adfuturam. Unde Hipp. 1. epidem. ait. *In ardentibus, ceterisque febribus, quos colli dolor, temporum gravitas, caligo oculorum, vel hypocondrii contentio cum dolore conripit, his e naribus sanguis profluit.* Et 3. prorrh. *Cervicis dolores, & impense rubri oculi sanguinis eruptionem ostendunt.* Bonum omen portendunt dolores, adparente jam coctione, si in partibus remotis, & a visceribus longe distantibus die præsertim decretorio percipiuntur; indicant enim morbificam materiam ad

partes ignobiles devolvi, quod sane optimum est in quolibet morbo. Hinc Hipp. in coac. ait. In longis febribus vel tubercula, vel labores fiunt in articulis, & si fiant non inutile. Idem aph. 40. sect. 4. ait. Si adsit oolor circa præcordia sine inflammatione, & febris superveniat, hæc dolorem pellet. Et aph. 52. sect. 7. Si adsit dolor circa jecur, & superveniat febris, hæc dolorem ejiciet. Idem prorrh. 152. Dolores capitis, & colli cum debilitate, & tremore totius corporis conjuncti processu temporis cessabunt, vel hæmorrhagia terminabuntur. Item in prognost. Dolores, & tumores hypocondriorum si recentes fuerint, & sine inflammatione, terminabunt cum horborigmis in illis partibus, vel efficacius cum evacuatione flatuum per secessum, vel per urinas. Et in coac. Dolor lateris in febribus mitigabitur copiosa evacuatione materiae aquosæ, & biliosæ per alvum; ibidemque fluxus puris per nasum, vel evacuatio materiae densæ, & purulentæ per sputum cephallalgiam sistit, quæ interdum terminatur eruptione pustularum, somno, vel fluxu ventris. Et aph. 10. sect. 6. Fluxus puris, aquæ, aut sanguinis per os, nares, aures, vehementem capitis dolorem sistit. Dolores mali sunt dolores omnes, qui principes partes infestant, præsertim si cum febre continua, aliisque malis adcidentibus jungantur. Hinc Hipp. aph. 65. sect. 4. ait In febribus circa ventriculum vehemens æstus, & cordis morsus, malum. Et sequenti aph. In acutis febribus convulsiones, & circa viscera vehementes dolores, malum. Et i. prorrh. Desperandum est de salute ægri, quem vehemens gutturis dolor adprehenderit cum tumore, anxietate, & subfocatione. Idem in prognost. scribit hujusmodi  
dolorem



dolorem gutturis , & oedophnæam sine ullo tumoris indicio in gutture , vel collo cito ægrum interimere . Ibidem 3. Capitis dolor vehemens , & continuus cum febre si quid ex indiciis extiterit exitiosi , lethalis admodum est . Ibidem etiam 2. Dolores , qui cum febre adfligunt circa lumbos , & inferas sedes , si præcordia adtigerint inferas relinquentes sedes sunt admodum exitiales . Itaque considerari debent & alia signa ; Nam si aliquod & horum prævum extiterit , depravatus est æger ; si vero adscendente ad præcordia morbo alia signa non prava extiterint , talem fore purulentum admodum expectamus . Et aph. 26. sect. 7. In vehementi ventris dolore extremorum perfrigeratio , malum . Et in prorrhæ. docet , quod dolor fixus pectoris cum stupore triste symptoma sit ; nam si febris superveniat , dolor ille inflammatorius erit , & lethalis . Ibidem etiam ait . In doloribus capitis vomitus æruginosos , vigiliam , & surditatem proximum delirium prænunciare . Monet præterea , quod si pleuritico dolor lateris sine ratione sufficienti evanescat , delirium præsto sit , & intra 12. horas mors . In sect. autem 7. aph. 22. docet dolores continuos signum esse subpurationis . Et in prorrhæ. quod dolor capitis , coma , surditas indicent formationem abscessus pone aurem . Ibidem quoque ait dolores subfo-cantes gutturis sine tumore minantur convulsiones , præsertim si ex capite proveniant . Eodem pariter loco docet , quod dolor renum , cephalalgia , cardialgia , & expectoratio difficilis prænuncient convulsiones . Idem denique in prognost. ait . Aurium dolor cum febre continua , ac vehementi difficilis est ; periculum enim delirii , & mortis imminet ; natu minores septimo die , aut citius ab hoc morbo interimuntur , natu

*en vero majores multo tardius; febris enim ac delirium minus eosdem infestat.*

## C A P U T X V

### DE PROGNOSTICIS EX GRAVEDINE PARTIUM, LASSITUDINE, ET VIRIUM EXSOLUTIONE

**D**OLORI proxima est gravedo partium. De hac ait Hipp. in coac. Gravitas totius corporis, manuum item, ac pedum pestifera. Ibidem dolores capitis acuti cum stupore, & sensu gravitatis conjuncti indicant dispositionem ad convulsiones. Et in epidem. Dolores, & gravitas capitis, & colli cum febre, vel sine febre in iis, qui phrenesi laborant, terminantur vel convulsione, vel vomitu æruginoso, & putrido, & hoc postremo casu ager de repente moritur. Idem aph. 31. 32. sect. 4. docet a lassitudine locali in febribus declinantibus apostemata, seu abscessum prænunciari. Dejectio autem virium in iis, qui morbo aliquo laborarunt, nihil mali portendit; sed ex Hipp. pessimum symptoma est in ægrotantibus, si nullæ præcesserint evacuationes, & in sanis etiam, si nec ab exercitatione aliqua, nec a pathemate, nec ab ulla manifesta causa proficiatur.



## CAPUT XVI.

DE PROGNOSTICIS EX MOTU,  
ET DECUBITU.

**E**X motu non levia de salutari, vel mortifero statu facultatum indicia desumuntur. *Hipp.* 2. prognost. ait. *Qui morbo vexatur, facile convertatur, & sit resurgendo levis oportet.* Huc spectat ægri decubitus, qui censetur optimus, quoties secundum sanorum constitutionem servatur; hyperbolicæ quippe constitutiones, ut *Galen*i verbis utar, periculum semper indicant; nempe cum ægri decumbunt aut omnino contracti, aut omnino distenti. Et *Hipp.* in prognost. ait ægrum a Medico cubantem offendi oportere in latus dextrum, aut sinistrum, ac manus, cervicem, crura paulum retracta habentem, & omne corpus molliter positum; ita enim plerique bene valentium cubant. Profecto nisi decubitus secundum consuetudinem servetur, manifestum est argumentum aut desipientiæ, aut doloris naturalem constitutionem præpedientis. Maxime autem adtendendæ sunt *Hipp.* animadversiones de decubitu in 1. prognost. ubi hæc habet. *Supinum vero cubare manibus, & cruribus extentis minus bonum est. Si vero procliviores, ac deorsum delabuntur subinde ad pedes, majori periculo est. Ubi pedes nudat, neque iis calor subest, ubi brachia, cervicem, & crura inæquabiliter dispergit, ac nudat, mali morbi, agonisque signum est. Perniciosissimum est ubi*  
quis

quis hians adfidue dormit, ubi fupinus jacet crucibus vehementer contortis, & complicatis; fed longe peffimum eft indicium in iis, qui pulmonibus laborant, fi in ipfo morbi vigore refidere velint erecti, quanquam hoc fit femper malum in morbo quolibet acuto.

## C A P U T X V I I

### DE PROGNOSTICIS EX ANXIETATE

**A**Nxietas, & inquietudo dicitur, cum ægri in plures decubitus formas tranfmutantur, nec uno in loco quiefcunt, fed huc illuc fe fe jactant. Hujusmodi inquietudo, & corporis jactatio, fi crifim præcedat, non adeo periculofa eft, ut alibi diximus; neque item admodum metuenda in adfectibus ventriculi, qui ut plurimum vomitu tolluntur; neque rurfus in febre ardente, dum viget paroxyfmus, dummodo declinante febre declinet & ipfa jactatio. Ceteris etiam multo minus periculofa eft illa præcordiorum, & ftomachi anxietas vehemens, quæ hystericas mulieres, & hypochondriacos homines, & qui delicatiori, & molliori genere nervoso præditi funt, fæpius difcruciat, præfertim fi per cathartica acria exagitentur; cito enim difcutitur mictione urinæ uberri-  
mæ, & limpida, flatibus ano, vel cato erumpen-  
tibus, fpirituoforum odoratu, & aliis hujusmodi auxiliis. Ceterum inquietudines omnes fi notabi-  
les



les fuerint, malæ sunt, ut ex 2. prorrh. patet, & ex his, quæ cum refrigeratione fiunt, vel cum sudoribus mali moris die critico superveniunt, pessimæ reputantur ab Hipp. in coac. Item perniciosissimæ, & lethales inquietudines, & anxietates, quæ conjunguntur maximæ debilitati ortæ ab excedentibus evacuationibus.

## C A P U T X V I I I

### DE PROGNOSTICIS EX CONVUSIONIBUS, TREMORIBUS, HORRORIBUS, RIGORIBUS, ET TORPORIBUS.

**D**epravatum respiciunt motum convulsiones, tremores, horrores, rigores, resolutiones quarundam partium, & ex his argumenta desumuntur futuri morborum eventus. Quo validior itaque fuerit convulsio, & magis depravatus motus, eo validior signatur morbus. Perniciosa censetur quæ difficilem reddit respirationem, interruptam atque suspiriosam, & quæ copiosum subsequitur fluxum sanguinis, ut habetur ex aph. 3. Sect. 5. Quæ item ab helleboro, & a medicamenti potione, ut ex aph. 1. ejusdem Sect. & ex aph. 25. 7. atque ex aph. 56. 5. De muliebri profluvio habetur in specie, quod convulsio, aut animi defectus si ei superveniat, malum; malum quoque, si convulsio fiat ex vulnere, ut docet aph. 2. Sect. 5. In coac. autem habetur; *convulsio fe-*  
*bri*

*brī succedens lethalis, minime vero pueris. Minus periculosa censetur convulsio, quæ ex aliquo adcidente suboritur, nec diu perseverat; quo respicit Hipp. adsertum in coac. Convulsio in febre facta si quidem eodem die conquiescit, bonum. Ubi addit; Convulsio in febre suborta febrem solvit ea dem die, aut altera, aut certe tertia, quod si tempus transgrediatur, quo incæpit, nec desinat, malum. In coac. rursus de reliquis convulsionibus habet. Cum febre acuta convulsiones lethales. Et aph. 49. Sect. 4. ait. In quavis febre non intermittente si labia, cilia, oculi, vel nasus convulsionibus corripiantur, æger visum amittat, vel auditum, & sit maxime debilis, mors proxima est. Idem alio loco ait, Convulsiones, & dolores viscerum nihil boni in febribus acutis ominari, sed mortem ostia pulsare, quoties cum debilitate summa conjungantur. Convulsiones ortæ a doloribus, aut obstinatis vigiliis in febribus acutis lethales sunt, ut habetur ex aph. 18. Sect. 7. & hujus generis sunt illæ, quæ ex purgatione copiosa profluunt, vel ab ingenti aliqua evacuatione, ut constat ex aph. 3. Sect. 5. & 56. 4. Convulsio orta ab inflammatione ilei perniciosa. Vide aph. 10. Sect. 5. & plura alia Hipp. loca. Ut autem certiora sumi possint indicia ex convulsione, perpedenda sunt reliqua signa; nisi enim & hæc prava fuerint, non omnino periculum imminet.*

Tremor, qui est musculorum, & nervorum adfectio, & virium imbecillitatem significat, periculum auget, si prava fuerint reliqua symptomata, & perpetuo malus existit in febribus ardentibus, in inflammatione cerebri, & similibus nervorum læsio-



læſionibus prope originem , unde delirium illi ſuccedit , ut habet aph. 26. Sect. 6. Boni ominis eſt , ſi paralyſi ſuperveniat .

Horror quoque morbis ſupervenienti non eſt contemnendus . Nam monente Hipp. aph. 4. Sect. 7. *a ſudore horrores , non bonum* . Qui crebris , levibusque horroribus deſudant ; difficili morbo laborant . Rigores , qui periodice in intermittentibus adcidunt , periculoſi eſſe non ſolent , neque item in continuis , ſi poſt coctionis ſigna ſupervenerint , immo ſunt criſium argumenta . Nam ut docemur ex aph. 58. Sect. 4 ; *ſi febre ardente laboranti rigor ſuperveniat , ſolutio fit* . Ceterum qui rigores adcidunt cruda adhuc materia , a quibus corpus non incaleſcit , quos nulla , aut mala evacuatio , aut morbi remiſſio ſequitur , omnes mali cenſentur . Hinc Hipp. aph. 29. Sect. 4. *Febricitantibus , ait , ſi ſexto die rigores fiant , indicationem habeat difficilem* . Et in prorrh. *In rigore refrigerationes , quæ non recaleſcunt , malæ* . Et aph. 46. Sect. 4. *atque in coac. ſi rigor in febre continua agro jam debili incidat , lethale eſt* . Plures alii occurrunt de rigoribus Hipp. textus , quos vide .

Torpor demum , qui eſt pravæ cujuſdam paralyſeos ſpecies ; perpetuo malum ſignificat . Si enim citra febrim fiat , apoplexiam enunciat , ſi in febre adcidat , malignitatem ex Hipp. in coac.

His addi poſſet ſtridor , vel conſiſio dentium , quæ ex Hipp. omnino funeſta eſt in delirantibus ; ſemper autem fanaticum , & mortiferum eſt ſtridere dentesve conſidere , ſi cui a puero familiare non ſit .

## CAPUT XIX

DE PROGNOSTICIS EX SINGULTIBUS  
STERNUTATIONE, ET OSCEDINE

**E**st convulsioni adfinis singultus, qui si citra febrim accidat, aut alium morbum, non est periculosus, sed periculum portendit in febribus inflammatoriis, & post nimiam evacuationem, unde post copiosum sanguinis fluxum, aut nimiam purgationem malus dicitur aph. 3. & 4. sect. 5. *A vomitu quoque singultus, & oculorum rubor, malum,* ut docet aph. 3. sect. 7. Perniciosus est singultus ab hepatis inflammatione, ut habetur ex aph. 58. sect. 5 & 17. 7. Item *ab ileo singultus, malum,* ut patet ex aph. 10. sect. 7. Si singultus febribus malignis superveniens circa dies criticos occurrat, & reliqua signa præsertim coctionis in urina fuerint bona, hunc singultum nihil mali portendere, sed vomitum, aut alvi fluxum criticum prænunciare testatur *Hoffmannus*. Si in febre trietophia singultus, & aurigo quinto die superveniant, lethale est ex *Hipp*. Convalescere tamen aliquem vidit *Sauvagesius*, ut refert. In singultu typhode si adsint signa terrifica, ut magna sitis, magna item debilitas, vigiliæ, delirium, ardor ingens, tremor maxillæ, convulsio, vocis interceptio, urina diluta, mortiferum ex eodem *Hoffmanno*. Lethalis etiam cito a vulnere ventriculi, si cum vomitu, & pulsu parvo copuletur ex *Sauvagesio*. Animad-  
ver-



vertendum generatim est de singultu non omnino periculum ab ipso imminere, nisi reliqua signa prava fuerint.

Sternutatio critica, seu salutaris est in febribus malignis, ut testantur *Hipp.* & *Riverius*; quin desperatis etiam rebus salutem promittit. Insalubris autem est in morbis inflammatoriis pectoris, cujus dolores intendit. Quamvis autem bona sit ex *Hipp.* in gysteria, & in partu difficili, interdum tamen præmatuum foetum expellit, & menorrhagiam, nec non hæmorrhagiam narium movet importuna sternutatio.

Oscedo in morbis hæmorrhagicis metuenda est, ut patet ex canicidiis; convulsiones lethiferas præfagit observantibus *Schrodero*, & *Buchnero*. Exitiosum symptomata est in parturitione superveniens; prodromus enim est cari funesti, & cardialgiæ, nec non colici adfectus, & morbi hysterici, ut docet illustrissimus *Sauvagesius*.

## C A P U T X X.

### DE PROGNOTICIS EX VITIIS VOCIS

**V**itia vocis sunt depravati motus adfectiones, & præclara de hisce vitiis docet *Hipp.* Sic 1. prorrhēt. ait. *Ex vomitu gravi, fastidiosoque vox clangosa, oculique concretum pulvisculum habentes vesaniam ostendunt.* Et rursus *Vacillationes mentis cum voce clangosa, & linguæ convulsiones cum tre-*  
*Tom. II. I more*

*more , & voces ipsæ obtremiscentes mentis indicant alienationem . Et in coac. Vox acuta , & lugubris , & oculorum hebetudo convulsiones minantur . Et inferius . Cum voce tremula alvi præter rationem solutio in iis longiori tempore perseverante malo , lethale . Aphonia etsi non semper lethalis sit , ut in nonnullis adcidentibus contingit , est tamen ut plurimum exitialis . Habetur in coac. Vocis defectiões cum exsolutione virium pessimæ . Ibidem Quos vox cum febre absque ulla indicatione deficit , ii tremuli intereunt . Quibus ex dolore aphoniæ adcidunt , ii tandem cum gravi cruciatu moriuntur . Docet aph. 5. sect. 5. quod si quis ebrius repente voce privetur , convulsus moritur , si non febris conripuerit , aut ubi ad horam , qua crapulæ solvuntur , loquatur . Tandem. aph. 51. sect. 6. hæc habet . Quibuscumque sanis de repente dolores fiunt in capite , & statim voce intercepta jacent , ac stertunt , in septem diebus pereunt , si non febris adprehenderit .*

## C A P U T X X I

### DE PROGNOTICIS EX FAME, ET SITI.

**C**Um animale corpus esculentis , & poculentis reficiatur , ab iisque vires conserventur , idcirco expendendum est Medico , an corpus rite hæc obeat officia , atque adeo animadvertat oportet quomodo adpetat , quo modo concoquat . Et  
si



si quidem cibum bene adpetat æger, ipsumque iuxta consuetudinem concoquat, optimum est indicium, ut monet *Hipp. aph. 33. sect. 2.* Si vero cibum non modo non adpetat, sed oblatum omnino aversetur, pessimum est. Et in morbo diuturno cibi fastidium, & sinceræ dejectiones malæ, eodem monente *Hipp. aph. 6. sect. 7.* Idem etiam ait *aph. 3. ejusdem sectionis.* In longis dysenteris cibi fastidium malum, & cum febre pejus. Inappetentia periculum portendit in fine morbi post longam debilitatem, & copiosam evacuationem. Præterea semper mala, semper suspecta, semper timenda in omnibus morbis, sed potissimum in cacheticis. Post curatos morbos superstes recidivam prænunciat, quo respiciens *Baglivius* jure optimo dicere consueverat se nullis aliis bonis signis exhilarari, si fames desit. Mala etiam est in pueris, qui natura edones sunt; indicat enim magnam functionum depravationem. Diuturnæ quidem inappetentiæ malæ sunt. Verum si inappetentia ab aliqua bilis portione ad ventriculum adscendente suboritur, non ita periculosa est; sed neque erit diuturna; bile enim utcumque discussa recedit nausea.

Sitis pariter, quæ & morbo, & temperamento, & aliis respondeat, periculo vacat. Sed si inmanis fuerit ardente non vigente febris, vel contra, semper suspecta est, ut habetur ex 2. prorrhæti. Quin defectus sitis est signum mortis in calidis morbis, in quibus delirium abest, sed qui cum siccitate, & ariditate lingue conjunguntur, præsertim si sitis, qua prius tenebatur aeger, de repente sine manifesta causa cesset. Defectus sitis in morbis

acutis, ut in tritacophia ardente, in qua fervor, & siccitas potum requirere videntur, delirium significat. Quod si nullo adparente delirii signo, & frequentia pulsus decrescente sedetur sitis, argumentum est fervorem febris mitigari, & ex sanguine jam soluto serosum liquidum, ex glandulis oris salivam secerni.

## C A P U T   X X I I .

### DE PROGNOSTICIS EX PULSU.

**P**ulsus quoque sua habent judicia, & significationes. Et sane pulsus vehemens, seu fortis optimi semper est ominis, & salutem spondet aegrotantis, si uno eodemque tempore mollis fuerit, & expansus, modice frequens, nec a retardato alicubi motu sanguinis per arterias proficiatur. Quod si eidem alia mala signa conjungantur, morbi longitudo praenunciatur. Ex adverso pulsus debilis funesti praesagii esse solet, dummodo non profluat a nimia sanguinis copia, vel a nimia pinguedine, vel ab aliis causis alibi expositis, tunc enim nulla minuitur mala. Debilis erat pulsus homini, cui sinister cordis ventriculus polypo obstruebatur. Fallax tamen esse aliquando potest uterque pulsus. Sic in morbis apoplecticis pulsus quandoque validus observatur, ut & in nonnullis aliis morbis, in quibus patent viae a cerebello ad cor, reliquae autem a cerebro ad visce-



viscera obstructae sunt. Quin etiam in aneurisma-  
te cordis quandoque pulsus validus est, & una  
plenus, cum scilicet auricula dextra sanguini tran-  
situro obstitit, & liberi simul sunt ventriculi, ut  
*Lancisius*, & *Senacus* observarunt. Pulsus fortis post  
debilem semper bona portendit, ac debilis post  
fortem semper mala minitatur.

Pulsus magnus, & expansus bona praesagit,  
cum a nimia sanguinis quantitate proficiscitur.  
Contra pulsus magnus ex ingenti copia sanguinis  
in arterioso tubo collecta ob insignes praecordio-  
rum laesiones praesertim in dextris cavitatibus  
suspectus esse debet, ut *Lancisius* animadvertit;  
quinimmo quo amplior est pulsus, eo majus adesse  
discrimen ostendit.

Pulsus parvus nisi pendeat a plethora, quo ca-  
su haud mali est ominis, semper censendus est  
pessimus, praesertim si fuerit simul vacuus. Quin  
etiam pulsus parvus in morbis, in quibus ob da-  
tum alicubi obstaculum expansus esse solet, fune-  
sti semper praesagii reputandus; pessimus etiam esse  
consuevit in febribus malignis, ac praecipue si  
fuerit simul frequens.

Pulsus modice frequens, expansus & mollis  
non adeo malus est, si cetera respondeant. Fre-  
quentissimus autem, parvus, simulque durus pes-  
simae naturae censendus est, dummodo a morbo  
aliquo convulsivo non profluat. Pulsus etiam fre-  
quens, simulque parvus, & celer pessimus omnium  
habendus est. Pulsus item frequentissimus, & mi-  
nimus pessima portendit. Et quidem observante  
*Sauvagesio* hujusmodi pulsus erat homini, in quo  
valvulae aortae in substantiam osseam conversae

dimidium orificii clauderant. Contra vero bonae est indolis, & augurii pulsus moderate rarus. Non malus est quoque pulsus rarissimus, qui a morbo convulsivo proficiscitur; vel qui natus est; Et quidem historiae medicae testantur sanissimam vitam duxisse multos, qui rarissimo pulsu gaudebant. Quod si raritas pulsus ab obstaculo quoque in praecordiis haerente proficiscatur, malus est.

Celer pulsus non omnino malus censendus est, quippe non aliud enunciat, quam vehementiorem stimulum cordi, & arteriis inlatum, quod in gravioribus animi adfectibus, & in morbis acutis patet. At cum celeritate parvus pulsus saepissime in periculosis febribus observatur, atque adeo nunquam periculo caret in febribus.

Pulsus durus semper est malus, praesertim si fuerit simul parvus, & valde frequens, indicat enim spasmodicam, & convulsivam adfectionem fibrarum machinam cordis, & arteriarum tunicas constituentium, quin & absorptionem humidi, ac proinde aestus, & inflammationes. Et quidem huiusmodi pulsus internarum partium inflammationes, ut pleuritidem comitatur. Si durities cum alia differentia, v. gr. cum languore conjungatur, etiam in hoc casu maxime periculosus est, & syncopen praenunciat.

Pulsus mollis vel fausta, vel pessima portendit, quod quidem ex natura morbi eruendum est. Sane in omni morbo inflammatorio pulsus mollis bona portendit excepta peripneumonia, in qua pulsus mollis malus est, durus e contrario bonus. In inflammationibus, in quibus nec resolutio, nec subpuratio obtineri potest, pulsus mollis lethalis esse



esse consuevit, cum gangraenam, & sphacelum inflammatae partis minuetur. Mollis itemprehenditur pulsus in leucophlegmatia, & anasarcate, qui tamen morbi vitae discrimen inferunt. Denique pulsus nimium mollis mali potius augurii censendus est, cum observante *Bellinio* extenuationem, laxitatem, & nimiam cedentiam indicet, quae signa sunt exsolutionis virium.

Pulsus aequalis bona portendit, quoties cum aliis optimi pulsus characteribus jungatur, praesertim vero quoties morbos illos comitatur, quos aliunde novimus in aegri salutem abituros. Item pulsus inaequalis in febribus, morbisque convulsivis nunquam aegrum in vitae discrimen adducit. Siquidem irregularem tantummodo contractionem cordis, & arteriarum enunciat. At vero si cum iis jungatur symptomatibus, quae aliquam praecordiorum laesionem innuant, lethalis esse consuevit.

Pulsus intermittens terrere solet Medicum, & mali esse ominis. Profecto in pessimis febribus, ut in pestilentialibus, pulsus intermittens periculosus est. Nihil vero mali portendit, si a stomacho mole gravato pendeat, aut nativus sit; nihil quippe frequentius est, quam sic adfecto stomacho pulsum tum inaequale, tum etiam intermittentem fieri, & diurnam pulsus intermissionem, sine periculo tamen, in multis quotidie observari, ut testantur historiae medicae. Falsum ergo est quod scripsit *Salenus*, nempe hominem vix superstitem esse posse, si arteria non pulset tempore duarum pulsationum. Quin *Etmullerus* certe hic solidus, & adcuratus, ut advertit *Hof-*

*Smannus*, tres excipit calus, in quibus intermittere solet pulsus, minori cum periculo, scilicet in febribus malignis, in pleuritide, & in adfectionibus hypocondriacis, & scorbuticis praesertim confirmatis, quibus addi etiam possunt hystericae, aliaeque adfectiones convulsivae, in quibus omnibus licet inaequalitates, & intermissiones pulsum una cum palpitatione cordis observentur, nihil tamen funesti praesagiunt. Antequam ergo mali aliquid de hoc pulsu pronunciet Medicus, omnia prius expendat oportet, ne in suis prognosticis decipiatur.

Pulsus undosus fausta praenunciat, & in iis observatur, qui aut in lecto sudant, aut si non adsit, certe tamen imminens est sudor.

Pulsus myurus, & dicrotus plerumque sunt mali ominis. *Solanus* tamen longa observationum serie comperiit pulsu dicroto narium haemorrhagiam, inciduo sudorem, intermittenti diarrhoeam praenunciari. *Solani* observationes alii confirmarunt, maxime vero *Nihellius*. & *Senacus*. Quinimo cum *Bourdeus* omnem operam in iis stabilien-  
dis conlocasset, ulterius progressus est, & peculiarem pulsum detexit, quo hemopthysis, alterum quo haemorrhoides &c. praedici possint. Fatetur tamen magnus *Hallerus* observatam a se fuisse crifim per haemorrhagiam sine pulsu dicroto, ac proinde non multum novis illis pulsibustribuendum contendit, in quo sane summos alios in arte viros adstipulatores habet.

Pulsus praeternaturalis deficiens, & a morbo-  
sa aliqua constitutione pendens, ut a polypo cor-  
dis, ab occupato arteriae ostio, aut impedito pul-  
mone,



mone, aut ab angustia cordis pessimus est, nec nisi funesta praesagia ex ipso plerumque deduci possunt. Animadvertatur autem plurima in medicis historiis exempla hominum reperiri, in quibus pulsus plane deficiebant, licet integra valetudine fruerentur.

Denique pulsus convulsivus pessimi est praesagii, cum observante *Etmullero* imminentes convulsiones, & epilepsiam cum aliqua contractura praenunciet.

## C A P U T   X X I I I .

### DE PROGNOSTICIS EX RESPIRATIONE.

**C**Um in praxi medica magni referat observare qualis in omni morbo, & praesertim in acutis sit respiratio, cum ex ea non eorum modo instrumentorum, quae ad respirationem ipsam peragendam conspirant, pulmonum scilicet, diaphragmatis, & musculorum tum thoracicorum, tum abdominalium, sed & earum etiam partium, quae cum his communicant, cordis vero in primis, quin & sanguinis universi, nerveique fluidi conditio dignoscatur, nonnulla hic de respiratione exposuisse juverit, ex quibus tyrones Medici de statu aegrotantium, deque morborum exitu iudicium ferre possint. Monendum autem in ipso limine ducimus solertem, maximeque cautum in consideratione respirationis esse Medicum oportere.

re, quod illud ipsum adcidat in respiratione, quod de pulsibus alibi animadvertimus, ut nempe pro nativa cujusque hominis constitutione, variaeque pulmonum, thoracis, diaphragmatis, & imi ventris structura, itemque pro varietate sexus, aetatis, regionum, anni tempestatis, adfectuum animi &c. respiratio ipsa insigniter varietur.

Itaque respiratio facilis, & levis, nulloque doloris sensu stipata bona est. Id primus docuit Hipp. qui i. prognost. scribit *Spirandi facilitatem semper magnam habere spem salutis in omnibus morbis acutis, qui sunt cum febre.* Et quidem hujusmodi respiratio rectam organorum omnium eidem inservientium constitutionem, & facilem, commodumque per singula quaeque corporis vasa, maxime vero per pulmones facile explicabiles transfluxum sanguinis enunciat.

Respiratio magna boni est omnis, cum praeter exposita virium etiam robur significet; quod si cum celeritate jungatur, bonam coctionem, & crisin adfuturam declarat.

Respiratio aequabilis fausta praenunciat, cum ex ea aequalis spirituum influxus in nervos, aequalis etiam excursus per nervos ipsos, ut & aequalis impulsus, & motus sanguinis arguatur.

Respiratio lenta, dummodo omnis absit molestia, & desipientia haud mali est augurii. Aerorum nempe canalium libertatem, aequabilem sanguinis distributionem, ejusque fluxilitatem ostendit. At in febribus ardentibus respiratio lenta, & in qua magnum intercedat intervallum inter expirationem, & inspirationem sine crisi, aut bonis signis orta suspecta esse debet; vel enim  
postea-



postera die desipiunt aegri, vel convelluntur, & cito moriuntur.

Denique ea in primis censetur optima respiratio, quae facilis est, aequalis, magna, lenta, lienis, & reficiens, & inter signa maxime salubria recensetur.

At vero respiratio contrarias his referens notas mali semper ominis reputanda; quare mala est respiratio, quae difficilis est; pulmones enim obstructos enunciat, & difficilem per pulmones ipsos excursus sanguinis declarat, nisi difficultas illa ex convulsione proficiscatur, quemadmodum in hystericis. & hypocondriacis contingit, aut in consuetudinem abierit, ut in asthmaticis. Pessima est respiratio, & instare jam mortem enunciat, si claviculis elevatis, sterni agitatione magna, & narium diductione perficiatur. Lethalis etiam est respiratio in febre ardenti, si cum delirio conjungatur teste *Hipp.*

Respiratio parva mali est augurii; vitium enim inde arguitur organorum respirationi ipsi famulantium, ut scilicet eadem pro eo ac opus esset, explicari non possint; portendit autem ut plurimum pulmonem concretione sanguinis, vel alterius materiae praepediri, vel pulmonalem fistulam tumore, aut aliqua materia infarciri. Quod si hujusmodi respirationi stertor, & sybilus conjungatur, instantis mortis indicium est.

Non boni item est ominis respiratio inaequalis; demonstrat enim irritationem aliquam, vel impedimentum, vel aliud simile organorum vitium adjungi.

Respiratio frequens terrere solet Medicum;  
Aereo-



Aereorum enim organorum laesionem, pulmonum obstructionem, & rigiditatem, & difficilem sanguinis excursum significat.

Respiratio cum dolore conjuncta mala est; Ut plurimum enim internam quampiam inflammationem enunciat.

Pessima, & lethalis est respiratio foetida, & frigida; quippe quae viscerum gangraenam plerumque demonstrat.

Respiratio frequens, & parva, nisi a dolore parvitas proficiatur, mala est, & malum morbi exitum praenunciat; frequens quippe respiratio magnas ad respirandum vires impendi, parva vero facultatis robur simul inminutum significat. Cum itaque facultatis robore inminuto, & magna interim impensa virium perdurante tandem totalis exhaustio consequatur, hinc est, ut de malo exitu morbi metuendum sit.

Respiratio frequens, & magna in febribus acutis boni est ominis; Enimvero frequentia respirationis ostendit quidem magnas ad respirandum vires impendi, sed ejusdem magnitudo simul significat robustam adhuc esse facultatem, & materiae morbificae viribus validiorem, atque adeo bene sperandum esse.

In morbis acutis respiratio rarior, & major solito imminens delirium, aut soporosos adfectus portendit. Et sane qui delirio, aut sopore tenentur, minus percipiunt statum sui corporis, ex. gr. minus sentiunt respirandi necessitatem, adeoque circa hujusmodi necessitatem negligentiores sunt, atque eam minime explent, nisi forte sit urgentior, scilicet nisi respirandi necessitas ipsos ad respira-

tio-



tionem instaurandam cogat, quae quidem tanto major sit oportet, quo magis retardata fuit. Nil ergo mirum, si dum respiratio rarior est, & solito major, delirium, vel sopor aut jam adsit, aut immineat.

Respiratio, quae difficilis est, parva, rara, inaequalis &c. pessima est omnium, & procul dubio lethalis. Quod si aliquot tantum ex pravis hisce adfectionibus habeat, quo plures eae fuerint, eo peior censenda erit.

Denique respiratio obscura, sive inconspicua mala est ex *Hipp.* in coac. Mala item revocata duplex, sive singultuosa. De hac sic loquitur divus Senex aph. 54. sect. 6. *In neutris adfectionibus quae cum febre fiunt, luctuosae respiraciones, malum.*

## C A P U T X X I V

### DE PROGNOTICIS EX ALVI DEJECTIONIBUS

**C**Um natura morbi ex alvi dejectionibus sapius innotescat, adeoque prognosis de eventu ipsius morbi institui possit, nonnulla ex *Hipp.* referemus ad rem praesentem, scilicet ad alvi dejectiones pertinentia. *Hipp.* ergo 2. prognosticorum haec habet. *Alvi excrementa bonis indiciis adnumerantur, si mollia, si figurata, si eodem fere tempore, quo in secunda valetudine dejici solebant, excernantur, & sint pro ratione ciborum ingestorum, haec enim omnia*

*nia inferiorem ventrem recte valere declarant. Et ibidem subjungit ; Corpulenta reddatur dejectio morbo cunte in judicationem oportet. Item subrufa vero, nec admodum gravæelens esto; & id genus alia ibidem notat Hipp. de laudabilibus alvi excrementis, non quidem de iis, quæ ad intestina aliunde confluunt, sed quæ ex adsumto cibo, potuque procedunt. Quæ vero excrementa ex vasis defluunt in ventrem, si critice excernantur, nempe in statu morbi cum signis coctionis, & die decretorio, bona sunt, & ægrum a morbo liberant. Hinc Hipp. aph. 2. Sect. 1. In perturbationibus alvi, & vomitionibus, quæ sponte naturæ obveniunt, si talia purgentur, qualia oportet, confert, & leviter ferunt. Et aph. 28. Sect. 4. Quibus dejectiones sunt biliosæ superveniente surditate cessant, & contra quibus surditas adest, biliosa dejectione finitur. Alia hujus generis legere est in ejusdem operibus.*

Sed non desunt ipsius Hipp. testimonia, quibus contrarium ex fœcum notis prædicatur. In prorrhæ. Si intercepta, ait, alvus, parva, nigra, & inspiras circumducta ad necessitatem demiserit, & per nares eruptio fiat, malum. Atque hæc ad substantiam fœcum referuntur. De illarum liquiditate adserit hæc 2. prognost., *Dejectio madens ex usu est, si nec stridet, nec crebro, aut paulatim excernitur; frequens enim desidendi labor insomnem facit. At si universim, & sæpe dejiciat, periculum defectionis animæ indicat. Ubi patet, quod liquiditas nisi cum aliis pravis signis copuletur, mala non fit. Aquosa vero dejectio prava est; mala etiam censetur candida admodum, aut admodum crocea, aut spumens dejectio; item damnatur*  
cxi-



exigua, glutinosa, candida & levis, ut & quæ nigra est, pinguis, livida, aut quæ peioris est odoris, quam pro consuetudine. Idem Hipp. 2. prorrh. ait, *Dejectiones in spumosas, sinceræque desinentes exacerbant*. Ibidem 1. In phreneticis *alba dejectio, malum*. Et aph. 47. Sect. 4. *Excretiones, inquit, in febribus non intermittentibus livida, cruenta, fœtida, biliosæ omnes malæ*. In coac. vero. *Quibus procedente egestionē alvi biliosa ad pectus morsus, & amaritudo sentitur, malum*. Ut autem prælagiturus Medicus rubenti fœcum colore minime decipiatur, sedulo animadvertat oportet hujusmodi colorem plures ob causas dejectionibus adcedere posse, nempe quando sanguis sola quantitate peccans repente aperto vasis osculo effunditur, ut contingit in inmodica sanguinis congestionē, aut quando exulcerata sunt intestina, ut in dysenteria, aut cum hæmorrhoidales venæ aperiuntur, quibus addunt communiter adfectionem hepatis, qua fluxus humoris inferatur sanguinei laticis naturam, & indolem referentis; forsan tunc separantur in glandulis intestinorum humores aliquo rubore saturati. Quare ne incautus prælagiat Medicus, hæc singula rimetur oportet, quoties fœces rubrum colorem referunt. Nec minus sollicitum se præstet, quoties nigræ dejectiones adparent. Nam aliquando sanguis ipse aliqua de causa effusus in intestinorum anfractibus detinetur, nigrescit proinde, nigerque tandem dejicitur, aliquando vero excernitur bilis atra, de qua Hipp. sic ait, *Dysenteriam ab atrabile incipere, lethale*. Cum ergo variæ pro varietate prædictarum rerum prognoses institui debeant

beant, animadvertendum est, quod quando nigredo profluit a sanguine, hoc ingrumos conlectus deficitur, propterea lintæ rubro colore inficit, & si niger adpareat. Quando vero ab atrabile profluit nigredo, hisce signis deprehenditur. Dejectio splendet, acidumque foetet, terram fermentat, nec a muscis gustatur, estque substantia acris, mordax, & erodens. Tandem Hipp. 2. prognost. habet, *si versicolor est dejectio, diuturnior quidem est, sed nihilominus exitialis, & aph. 21. Sect. 4. Quo colores ipsarum peiores plures fuerint, eo sunt deteriores.*

## C A P U T X X V

### DE PROGNOSTICIS EX VOMITU.

**D**E iis, quæ per vomitum excernuntur, eadem fere est ratio, ac de alvi dejectionibus, ut nimirum boni censeantur vomitus, qui diebus criticis, & coctione peracta contingunt, quique morborum causas aut maxima ex parte minuunt, aut omnino tollunt, quo respicit aph. 2. Sect. 1. Contra vero qui morbos non minuunt, quique sinceri sunt, & implacidi, ut habetur ex 2. prorrh. & 2. prognost. In vomitu critico pulsus est omnium maxime contractus, & minus inæqualis, arteria sub digito rigescit, & fremere videtur. Si vomitus fuerit porraceus, aut niger, censendus est pravus, exitiale vero admodum est, si  
quis



quis colores omnes evomuerit, & ad ultima ventum esse testatur lividus vomitus, maxime vero, si male oleat; siquidem foetores mali sunt in quolibet vomitu. Docet hæc Hipp. qui præterea aph. 22. Sect. 4. ait. *Morbis quibuscvis incipientibus si atra bilis sursum, aut deorsum exierit, lethale.* Pessimus quoque est vomitus ab ileo, ut docet aph. 10. Sect. 7. nullumque servatum vidit Galenus ex iis, qui fœculentum vomitum passi sunt. Denique ex 2. prorrh. habetur, quod pravus sit vomitus exiguus, & biliosus, præcipue si ægri supervigilaverint, & extillaverint nares; hæc enim fieri necesse est non propter crism; in crisi namque nihil exiguum. De vomitu sanguineo hæc habet idem Hipp. aph. 25. Sect. 4. *Sanguis ex supernis partibus exiens, undecumque exierit malus est.* Fatetur tamen aph. 37. Sect. 7. sanguinem vomitu ejectum cum febre malum esse, sine febre non malum. Et quidem plura sunt exempla tum fœminarum, tum virorum, qui cum crebro vomitu sanguinis vitam ad plurimos annos produxerunt, ut de Maligno Fisco, & Volusio Saturnino testatur Plinius.

## C A P U T X X V I

### DE PROGNOSTICIS EX SUDORIBUS

**S**Æpe ex corporibus ægrorum sudores fluunt, ex quibus signa futuri eventus prænunciantur.

Optimus, ait *Hipp.* 1. prognost. sudor est per omnes acutos morbos, si per decretorium diem eveniat, & febrim omnino tollat; bonus, si prodeat ex toto corpore, efficiatque, ut æger facilius ferat morbum. Et aph. 36. sect. 4. inquit. Sudores febricitantibus boni, qui manare cœperint die 3. 5. 7. 9. 11. 14. 17. 21. 27. 31. & 34. ii enim sudores morbos judicant. Sudores pravi sunt, si fluant cruda adhuc existente materia, nec ullo coctionis signo adparente, si nimia peccent quantitate, aut pauca, si fuerint frigidi, si non ex toto corpore erumpant, si cum ægri conferentia, & tolerantia non fiant. Passim apud *Hipp.* extant de iis testimonia; inter alia aph. 42. sect. 4, qui hæc habet; *sudor multus frigidus calidusque semper fluens, frigidus graviolem, calidus leviolem morbum significat.* Et 2. prorrh. *sudor multus si cum febribus acutis fiat, inutilis.* Et in coac. *Qui in febre non intermittente tenuiter, & crebro sudant cum hypocondrii tensione, ii ut plurimum maligno morbo laborant;* Periculosi quoque sunt ex *Hipp.* aph. 37. sect. 4. frigidi sudores, qui cum febre acuta mortem, cum mitiore vero morbi longitudinem significant. Cumque sudores perpetuo morbi præsentiam indicent, ita ut ubi sudor, ibi sit morbus, hinc est, quod erumpentibus ex solo capite sudoribus gravis morbus imminet ratione nobilissimæ partis adfectæ. Qui sudor ægrum a morbo vindicare consuevit, tenuis esse solet, sed cum aliqua visciditate conjunctus, quo forsan respicit dictum *Hipp.* in coac. ubi narrat sudorem, qui in febre continua crebro, & tenuiter accidit. Sed de sudore vide *Hipp.* ipsum pluribus in locis,



## CAPUT XXVII.

## DE PROGNOSTICIS EX HÆMORRHAGIA

**P**urima desumuntur futuri eventus indicia ex fluente in morbis sanguine e naribus, per uterum, & hæmorrhoides. Excretio autem sanguinis ut bona sit, postulat 1. tempus, ut nempe excernatur coctione jam facta testantibus Hipp. & Gal. 2. sufficientem quantitatem; unde Hipp. 4. de rat. vict. in acut. ait. *Si e naribus fluxerit sanguis solvitur morbus*. Et in coac. *Sanguinis fluxus, quæ 7. 9. 14. die adcidit, ut plurimum febres solvit*. 3. diem criticum; excretiones enim, quæ tunc temporis contingunt, vel bonæ sint, vel malæ, multum adjuvant ad salutem, vel mortem ægri præsagiendam. Recte igitur observat Hipp. morbos acutos per sanguinem e naribus, & copiosum sudorem diebus cricum judicari. 4. anticipatam in die aliquo indice prognosim; Natura enim altero ex his diebus excretionem moderatæ sanguinis quantitatis procurare solet tanquam indicationem illius, quæ die critico uberius continget. 5. proportionem cum natura, & qualitate morbi, nec non temperamento ægri, ratione vitæ, temperie aeris, & anni temporibus. 6. relationem cum locis adfectis ita, ut ab ipsis copiosa fiat evacuatio, vel ex parte illis opposita, ut revulsio hoc modo fiat; Unde Hipp. aph. 21. sect. 6. ait. *Maniacos, quibus superveniunt hæmorrhoides, vel varices sanari unde*



invaluit usus mittendi sanguinem in mania per venas hæmorrhoidales: & aph. 25. Sect. 4. evacuationem sanguinis per alvum bonam esse, & ipsis salutarem; item aph. 32. Sect. 5. mulieres per eruptionem menstruorum a vomitu sanguinis curari: 7. inminutionem, vel integram morbi extinctionem, levamen ægri, & cessionem symptomatum, aut eorum mitigationem, ut docet Hipp. 3. epidem. Idem aph. 60. Sect. 4. inquit sanguinem per nares salutarem esse, si surditatem tollat, & alio loco affectos dolore capitis, vel colli a debilitate, & tremore totius corporis sanari per hæmorrhagiam. Tandem meliores hæmorrhagiæ sunt quæ vires ægroantis instaurant, ejusque pulsum magis regularem efficiunt.

Excretiones sanguinis malæ, & funestum morbi exitum prænunciantes habent signa contraria, nempe non sunt cum signis coctionis, cum aliis malis signis copulantur, nempe delirio, sopore, spasmodicis moribus, pulsu molli, parvo, inæquali &c. vel hæc illas subsequuntur. De his signis Hipp. 1. prorrh. ait; ubi sanguis e naribus effluit cum tenuibus sudoribus, & totius corporis perfrigeratione morbi malignitas, & perniciës indicatur; & inferius; post sanguinis eruptiones dejectiones nigre malæ, prave autem & intense rubre, præsertim si hæmorrhagia die quarto superveniat, ut confirmat Galen. Idem Hipp. aph. 9. sect. 7. ait. A profluvio sanguinis convulsio, & desipientia, malum. Ab eodem damnatur vomitus sanguinis in febribus, ut pessimus, de quo alibi, præsertim cum sanguis niger est, & febrientes maxime debilitat. De his hæc profert aph. 23. sect. 4. Omnis excretio bilis  
nigra



nigræ, vel alterius substantiæ nigro sanguini persimilis prænunciat mortem die sequenti adfuturam in iis, qui morbo acuto, vel chronico, vel ulceribus debilitati sunt. Alibi autem inquit, sanguinem ex naribus malum esse prognosticum in iis casibus, in quibus venter ita constipatus est, ut pauca excrementa reddat similia sterco caprino, & alio loco hæmorrhagiam per nares cum sudoribus frigidis, & refrigeratione totius corporis malum esse signum, & refrigerationem extraordinariam diebus criticis supervenientem post aliquam hæmorrhagiam esse perniciosissimam, quod testatur etiam Duretus. Quæ sanguinis excretio mutationem non infert in statum ægri mala censetur præcipue si morbus in pejus ruat. Item effusio modica sanguinis nunquam bona est, sed plerumque mala, exsolvit enim vires, unde pulsus parvus, inæqualis, mentis terror, & spasmi subsequitur, præterea multum detrahait de calore vitali, quo efficitur, ut natura sub vehementia morbi tandem succumbat. Hinc ait Hipp. ventrem pati ex nimia duratione hæmorrhagiarum; cum partem nimium refrigerent, & hæmorrhagias violentas, quas perfrigeratio subsequitur, generatim esse perniciosissimas. Cum corpus ob excedentem sanguinis effusionem exhaustum est, æger quandoque mortali delirio corripitur, & quandoque etiam terribilibus convulsionibus, ut idem docet aph. 9. sect. 7. Sanguinis fluxus per nares, aut quamlibet aliam corporis partem, si exigua copia fiat, interdum bona prælagit, quod principium criseos indicet, ut advertit Hipp. Plerumque tamen mala prænunciat, quoties scilicet morbus est in statu perfectæ cruditatis, multoque magis, si

excretio cum pernicioso aliquo signo jungatur. Stillicidium sanguinis e naribus maxime damnatur, præsertim in febribus ardentibus, ut monet Hipp. 1. epidem. nisi stillicidium illud imminentem crissim enunciet, quod ex aliis signis deprehenditur. Quin etiam huiusmodi stillicidium funestissimum est, si illud alia mala signa subsequantur, nempe surditas, coma, vigiliæ, deliria, sudor frigidus, & extremitatum perfrigeratio, ut testatur Galenus. Denique hæmaturia in variolis certissimum est mortis præsagium. Unus tantum æger servatus memoratur in transactionibus philosoph. Idem dicas de mictu cruento in petechiis, miliaribus, purpura, &c.

## C A P U T X X V I I I

### DE PROGNOSTICIS EX SPUTO, ET SCREATIONE

**I**N morbis thoracis signa ex sputo, & screatione præsertim adtenduntur. Hipp. 2. prognost. ait. In pulmonibus costarumque doloribus oportet ut sputum celerrime moveatur; si enim multo post ab initio doloris screetur bilis flava, aut rufa, aut multum inferens tussim, aut non admodum permista deterior est. Et in coac. Omnino autem pravum flavum, si sincerum est, & glutinosum, & candidum, & rotundum, itemque vehementer ex virore pallens, quod quoque spumosum est, & lividum, & a-  
rugi-



*ruginosum, aliquanto vero deterius, quod sic est sincerum, ut nigrum quoque videatur. At flavum, cui paulum sanguinis permistum est, initio quidem salutem pollicetur, quod vero septimo die, aut longiori spatio tale adparet, non adeo tutum. Admodum autem sanguinolentum, aut quod statim initio lutescit perniciem praesefert. Sputo obiter adnectamus lentorem illum, & viscidam materiam, de qua loquitur Hipp. aph. 53. sect. 4. Quibus circa dentes in febribus quidam lentores nascuntur, his fortes sunt febres.*

## C A P U T X X I X.

### DE PROGNOTICIS EX ABSCESSIBUS.

**A**bscessus, qui in cute erumpunt, boni sunt; si diebus decretoriis fiant; fiunt autem in partibus corporis, quae longo intervallo a nobilioribus sejunguntur, qui perseverant, suppurantur, aegrisque conferunt. Eos describit Hipp. 6. epidem. *Tubercula, inquit, foras extumescuntia, & acuminata in turbinem qua gracilescentia non circum dura aequaliter maturescentia declivia, & non bifida meliora. Contraria vero mala, & si quamplurimum contraria pessima. Pertimescendi quoque sunt abscessus, qui sine praecedente aliqua evacuatione retrocedunt, & evanescunt. Unde Hipp. 2. prognost. Si abscessus, ait, evanescit, & retrocedit nequaquam egrediente scuratione, ac febre perseverante,*

*rante*, difficilis morbus est; periculum enim delirii, mortisque imminet.

## C A P U T   X X X.

### DE PROGNOSTICIS EX URINIS, ET I. DE EARUM NATURA.

**Q**uid sit urina, & quae ipsius componentia in physiologia declaravimus. Nunc vero de prognosticis, quae ab eadem erui possunt, nobis est differendum. Sed ne ipsimet urinae tanquam signo ultra, quam par est, tribuatur, animadvertendum est maximam urinae varietatem non modo in aegrotantibus ob innumeras fere causas deprehendi, sed in hominibus etiam bene valentibus, & quidem ratione aetatis, temperamenti, sexus, tempestatum anni, verum non naturalium &c. Item aliam esse urinam ab adsumto cibo, & potu, aliam ab elaborato, confectoque chylo, aliam ab ipsomet chylo in sanguinem conmutato, ut proinde alia sit urina potus, alia chyli, alia sanguinis. Haec autem omnia diligenter adnotanda sunt, ut Medicus ex ipsis aliquod non fallax iudicium ferre possit; praesertim vero habenda ratio urinae sanguinis in corpore bene valente, quae citrini, seu subflavi coloris est, pellucida, mediocris quantitatis, & consistentiae, aequalis specificae densitatis, odoris non valde gravis, saporis subsalsi, quaeque proinde naturalis, & omnium



nium optima censenda est, & ad quam veluti ad normam reliquae omnes referantur. Optima est urina, inquit *Aristoteles*, cum ex omni latere mediocritatem servat, & sanorum urinae simillima est quod itidem docet *Galenus*. Si igitur urina ab hac mediocritate recedat, recessum sane aliquem ab optima, & naturali constitutione enunciet necesse est. Recedere autem ab hujusmodi constitutione potest vel copia, vel consistentia, vel colore, vel odore, vel contentis. Et quod primum urinae copia, vel aucta est, vel inminuta, vel omnis aliquando deficit urina. II. haec vel tenuis est, & fluida, ut aqua, vel crassa, & oleoginosa. Tenuis rursus vel pellucida est, & aquosa, vel colorata, & turbida; haec autem vel constanter turbida perseverat, vel aliquanto post a mictu clarescit, vel clara primum redditur, postea vero turbatur. III. Varii sunt coloris gradus in urina; ea siquidem colores omnes praesefere potest, qui medii sunt inter album, & nigrum. Quae in albedinem vergit urina vel cristallina est, vel aquea, vel lactea. Ad has autem revocari possunt urinae glaucae, cinericiae, viridescentes, & plumbeae, quae quidem urinae eorum corporum nominibus appellantur, quorum aemulantur colores. Urinam albam sequitur pallida, vel spicea, & si eidem plus adcedat tincturae sit subrufa, deinde rufa, vel aurea, quod auri colorem referat. Post hanc venit subflava, mox flava, vel crocea, quam subsequitur rubra, ad eamque revocari potest flammea, rosea, vinea, purpurea, ferruginea, nigricans, & tandem nigra. IV. Urina vel nullum habet odorem, & tunc dicitur

citur inodora , vel gravi urinoso odore , & praeternaturali imbuatur variis nominibus distinguendo . V. Tandem urina quoad contenta varia est indolis . Contenta vero vel per liquorem universum diffusa sunt , vel alicubi collecta . Si eadem ad fundum subsidant , hyposthasim , vel sedimentum constituunt , si medio in loco conligantur , suspensum , vel eneorema , nubeculam demum , si in superiori liquoris parte consistent . Varias etiam indolis est urina prout contenta ipsa , & praesertim sedimentum deficiunt , vel magna , aut parva est ipsius sedimenti copia , vel inficitur colore vario , vel arenosum est , vel farinosum , vel membranaceum , vel squamosum , vel denique foliaceum . Haec autem contenta vocantur naturalia , praeternaturalia sunt arenae , calculi , bilis , sanguis , mucus , pus , carunculae , pili , grumi , aliaque his similia , quae saepe in urinis observantur . Denique urinae in coctas , & crudas generatim distinguuntur . Cocta dicitur urina , quae parum in qualitatibus suis a naturali recedit , cruda quae plurimum .

Observandum hic est plures ex recensitis urinarum speciebus conjungi simul posse . Sic dari potest urina , quae tenuis sit , inodora , pellucida , & sine contentis , ut saepissime deprehenditur .

His constitutis explicandae nobis sunt causae illae , quibus urinae a naturali constitutione recedunt . Atque ut ab urina quoad copiam morbosa exordium sumamus , ex pluribus causis proficisci potest aucta urinae copia . Et I. quidem a nimio potu aquae praesertim mineralis , ut & a balneis ejusdem naturae ; siquidem adtractionis ope ,



ope; quae balneum inter, & corpus intercedit, balnei fluidum per inhalantes, seu absorbentes cutis poros vasa corporis pervadit, & in sanguineos canales inlapsum molem auget serosi vehiculi sanguinis, ex quo per emulgentes arterias ad renes adfluente, & majore feri copia diluto uberioris urina secernatur necesse est. II. Ab inminutis ceteris omnibus secretionibus, & praesertim ab inminuta insensibili perspiratione; unde Hipp. aph. 83. sect. 4. *Mictio noctu multa fiens modicam alvi egestionem significat.* III. A superfluitate, & fusione humorum, quorum excretio critico modo perficitur, quod plurimis exemplis ab Hipp. ipso desumptis confirmatur. IV. Ab excedente laxitate renalium tubulorum, & glandularum, quo casu aliquantulum turbida redditur urina. V. Ex velociori facto motu serosi liquidi alicubi stagnantis. VI. Ex lentiori haematosi, atque adeo inminuta perspiratione, ut patet ex insultibus hysteris, & hypocondriacis, in quibus lente ut plurimum procedit haematosi. VII. Demum ex solutione lentoris, qui vigente inflammatorio aliquo morbo in fluidis humani corporis observatur. Contra vero causae morbosam urinam quoad copiam inminutam efficientes sunt potus penuria, humorum tenacitas, qua fiat, ut urinae materia ab illorum massa aegre secedat serosi liquidi absumptio per febrilem calorem, aliarumque excretionum augmentum. Causae demum urinae subpressionem inferentes sunt inflammatio renum, eorundem calculi, exterior compressio, praesertim a plethora, qua sanguinei canales distenduntur, & laterales urgentur, fibrarum renalium spasmus, convulsio, passio



passio hysterica ; hypocondriaca , dolor vehemens ventris , lumborum , intestinorum , coxae , uteri , menstruatio , vermes , grumi sanguinis , pituita , mucus , pus renes infarciētes , eorum paralyfis , evacuationes aliae defectum urinae subplētes , uretaerum etiam inflammatio , calculi , grumi sanguinis , pituita , pus , clausura inferioris ureterum orificii , inflammatio itidem , grumi sanguinis , mucus , pus , lapis vesicae , ejusdem paralyfis , ectopia , exocyste , spasmus sphincteris ipsius vesicae , intestinum rectum inflammatione , calculo , flatibus , scybalis , abscessu , haemorrhoidibus turgens , hydrops , & procidentia uteri , ejusque distentio a tumoribus , menstrua in vagina retenta , tumor perinaei , calculus urethrae impactus , mucus eandem infarciens , sanguinis grumi vermes urethram ipsam opplētes , pus eam obstruens , ejusdem inflammatio , intumescētia textus spongiosi ipsius urethrae , ejusque varices , cicatrices , ulcera , callus , fungus , contractio , schirrodæa glandularum lacunarum , Cuvperianarum , Litrianae prostaticae tumor , callus , ulcus , urethrae ruptura in scrotum hians , retractio penis intra corpus , urethrae ipsius clausura , & similia alia , quae omnia certissimis gravissimorum Medicorum observationibus confirmantur .

Urinarum crassities repetenda est vel a minori aquei humoris copia relate ad alias materias solidas , quas in urina latere alibi demonstravimus , vel ab aucta earundem materiarum quantitate eadem manente copia aquei vehiculi , vel ab aliis extraneis substantiis minime fluidis urinae admistis ; tenuitas contra ab iis omnibus causis  
 peu-



pendere potest, ex quibus eandem quoad aqueum fluidum fieri uberiores ostendimus, praesertim vero ab aquei ipsius fluidi redundantia, sed minori simul facta ceterorum urinae componentium quantitate proficiscitur. Patet autem, quod si ex copiosiori aqueo vehiculo tenuis fuerit urina, eadem tunc excernetur pellucida; quod pariter continget, si materiae componentes ita per ejus volumen dispersae fuerint, ut inde uniformis specifica densitas habeatur, licet ceteroquin materiae ipsae sat magna copia in urina contineantur. Contra haec excernetur turbida, si specifica densitas fuerit inaequalis ex doctrinis summi *Newtoni*. Hoc autem tunc evenit, cum humores integram coctionem, & adtenuationem nondum subierunt.

Urinarum colorem ab oleosis, & salinis substantiis, quae in illis continentur, repetendum esse alibi innuimus. Et sane eo coloratiores excernuntur urinae, quo major in illis adest copia eorundem componentium. Unde patet urinarum albedinem pendere vel ab exigua earundem materialium quantitate, vel ab aliis corporibus, quibus materia praesertim oleosa prohibetur, quominus regelari possit, & adtenuari, ut in lenta haematosi contingit, flammeum vero illius colorem ab intensiori haematosi proficisci, ab haematosi nempe, in qua ob nimiam acidae materiae extractionem pars oleosa plurimum adtenuatur, & cum aquea, ac terrestri parte arctius conjungitur. Urinam rubram non cruentam saepius observari in scorbuticis, qui ex quartana convalescunt, docet *Sennertus*.

Observandum est autem croceum urinae colorem



lorem ab extraneis corporibus urinae admistis proficisci aliquando posse, ut evenit in ictero, colorem rubrum a sanguine in urinis latente, nigrum denique vel a melasictero, & gangraena alicujus partis, praesertim vero renum, & vesicae. Distinguitur autem sanguis in urina, si linteum album eidem inmergatur; rubedine scilicet sanguinea tinctum adparebit, quod non contingit, si rubedo urinae fiat a causis supra memoratis. Praeterea ab admisto sanguine urina opacitatem ostendit cum sedimento grumoso nigro; si vero rubedo aliter fiat, ea est cum pelluciditate, & sedimento paucio, eoque cinnabarino. Ceterum cum sanguis in urinis adparens non modo ex vasis renum & ureterum sed & colli vesicae, aut urethrae effluere possit, hinc consequitur non semper cum veritate consentire aph. 78. sect. 4., quo statuitur, quod qui sua sponte sanguinem mingunt; his venae ruptio in renibus significatur.

Urina oleosa duplicis est speciei; vel enim omnino simillima est oleo tum quoad colorem, tum quoad consistentiam; vel ejus substantia est vere oleosa, & plurimum adipem continet ex Hipp. Utraque vero profluit a conliquatione adipis totius corporis, vel renum dumtaxat. De his idem Hipp. aph. 35. sect. 7. sic loquitur. *Quibus pingue est id, quod superstat, & acervatum, his renum adfectiones, easque acutas significat.* A conliquatione pariter oriuntur sedimenta farinosa, membranacea, squammosa, foliacea, quae in urinis interdum conspiciuntur. Humores enim acres, salini postquam adipem fuderunt, vasa partium solidarum adrodunt modo magis, modo minus, pro



proque varia erosione varia illa sedimenta constituunt. Has autem urinarum species ab igneo calore sanguinem adurente, & carnes extraordinario quodam modo absumente proficisci docet *Galenus*. Denique urina arenosa, vel sedimentum arenosum pendet ab arenosa materia in renibus haerente, quidquid in contrarium doceat *Hipp.* qui aph. 79. sect. 4. sedimentum arenosum a vesicae calculo suboriri contendit. Enim vero saepe contingit, ut impacto renibus, aut vesicae calculo nunquam excernantur arenulae, & saepe etiam prodeuntibus arenulis nec vesica, nec renes calculo adficiantur.

Urina omnis expers odoris pendet a defectu salinae, & oleosae praesertim materiae, vel ab alterius substantiae quantitate, qua fiat, ut salinae illae, & oleosae materiae evolvi non possint, ac regelescere. At vero urinae odor, & quidem solito gravior profluit ab evolutione, & quasi putrescentia earundem materiarum a magno corporis motu, ab aucto humorum circuitu, & majore gradu caloris humani corporis profecta, vel ab extraneis corporibus urinae admistis, ut pure, sanguine &c.

Denique defectus separationum in urinis repetendus est ab exigua oleosae, salinae, & terrestris materiae copia ingenti aquae quantitati admista, vel ab arctiori earundem materiarum adhaesione tum inter se, tum etiam cum ipsamet aqua, vel ab aliquo secernentium organorum vicio, quo fiat, ut salinae, ac terrestres particulae a reliquis humoribus non secernantur.

Nunc vero ad praesagia progrediamur, quae  
ex

ex urinis desumuntur. Itaque si tenuis urinae quantitatis solito major ab uberiori aquei potus adsumta copia, a balneis, aliisque similibus proficiscatur, nihil mali praenunciat. Boni autem ominis sunt urinae tenues, & colore naturales, licet ratione tenuitatis suae insignis tempus requirant ad coctionem subeundam, & ad salutem aegri praesagiendam, ut in casu Cleonastidis, Clazomerii, & Gherionis patet. Urina tenuis, & pallida, ubi signa sanitatis occurrant, abscessum praenunciat infra septum transversum, ut Pitio-  
ni contigit. At si nullum salutare signum occur-  
rat, hujusmodi urinae fluxus haud boni est omi-  
nis; & *Hipp.* in prognost. ait urinam aqueam esse omnium pessimam; praesertim in pueris. *Gale-  
nus* autem testatur in morbis mali moris, ut & in febribus acutis certam mortem aegro impen-  
dere, si urina tenuis, & copiosa sine colore diu excernatur. Et quidem fieri non potest, quin fluidorum crassiores partes, & phlogisticus lentor inde augeantur, repletionesque, & gravitates, & torpores, & deliria, & convulsiones, & acrimonia residuae humorum massae, & tabes etiam procreentur, hinc mors. Haec urinae species perniciosior est, si diu perseveret, & aliquot post diebus ab invasione morbi incipiat excerni, ut patet in casu Tasi 3. epidem. sect. 3. aegr. 2. qui undecimo die urinam tenuem & aquosam emisit, cujus excretio ad quadragesimum usque diem perduravit. At parcior urinae tenuis excretio in febribus ardentibus, & inflammationibus acutis perniciosissima est quandoquidem serosi liquidi absorptionem enunciat, praesertim vero si cum uri-  
nae



nae parcite pravae aliae qualitates conjungantur, ut patet in casu filiae Eurinatis, uxoris Dromeadis, & juvenis Meliboei. Funesta etiam ominatur in febribus urinae subpressio ex absorptione feri profecta, ut de Sileno, & uxore Ciziaci refert *Hipp.*

Urina copiosa, & crassa si ex solutione phlogistici lentoris oriatur, bona existimanda est in morbis acutis, & in febribus inflammatoriis, cum post signa coctionis adparet; admistam enim cum habeat materiam, quae morbum inferebat, quaeque per canales urinarios secerne jam coepit, morbi solutionem pollicetur, & abscessus avertit ex *Hipp.* Contra mala est, si excernatur sub initium morbi, quandoquidem tunc temporis plerumque tenuis esse solet, ut adfirmat *Galenus*. Mala etiam reputatur, si a praeternaturali fusione, & solutione materiae oleosae, aut lymphaticae sanguinis aliisque similibus causis proficiscatur. Urina vero parca, & simul crassa ob aliquam auctam evacuationem non mala censenda est; at pessima existimanda est, si urina deficiente partes oedemate conripiantur.

Urinae, quae sub initium morbi albae, lacteae aut glaucae excernuntur, haud boni sunt ominis; siquidem in morbis acutis morbosae materiae copiam indigitant, in chronicis vero infirmitatem haematoseos, nisi forte lacteus color originem suam referat mucosae substantiae, quae in urinis soluta fuerit, dum per renes, aut ureteres, aut vesicam fluebant. Interdum tamen uber fluxus urinae albae, & simul crassae articulorum abscessus avertit. De ea sic loquitur *Hipp. aph. 74.*

sect. 4. Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa, & crassa, & alba prodiens. Idem 6. epidem. sect. 4. Urina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febribus quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Et quidem talis urina morbificam materiam critice evacuat, praesertim si in morbis acutis signa coctionis praecesserint.

Urina, quae constanter turbida perseverat, semper funesta ominatur, praesertim si ab ejus excretionem nihil levetur aeger; quae vero clara excernitur, sed paulo post turbatur, dummodo reliqua bona signa concurrant, bona reputatur in morbis acutis, quod inchoatam coctionem enunciare perhibeatur, idem dicas de urina illa, quae crassa primum redditur, ac deinde clarescit. At quae jumentorum urinae persimilis est, imminentes capitis dolores praenunciat ex Hipp. Si post crassam urinam sequatur urina aquosa, limpida, in acutis malum est; significatur enim convulsioni delirium, aut soporem adcessurum. Ceterum urina turbida perniciosior existimanda est in principio morbi, quam in ejus augmento, quo sane tempore natura coctionem molitur.

Urina subrufa cum sedimento itidem subrufo, etsi longitudinem morbi praenunciet, salutaris tamen censetur ab Hipp. At ruber ipsius color malus est, quandoquidem oleosae materiae solutionem, & alkalinam humorum indolem enunciat, eoque magis, si color urinarum splendens sit & flammeus in morbis inflammatoriis. Si color ruber profluat a sanguine in urinis latente, ea praenunciat mala, quae ab haemorrhagia diuturno-



turniori proficisci possunt, nimirum oedematiam, ascitem, lassitudinem, auriginem, dispnoeam, inappetentiam, sitim inmodicam, amphimerinam &c. Croceus urinae color auriginem indicat, de qua ea facienda sunt praesagia, quae in illius historia proponuntur. Interdum vero in iis observatur, qui febribus intermittentibus torquentur, & alkalinam humorum indolem declarat. Viridis urinae color naturam atrabilem indicat in sanguine luxuriantem, & ea ominatur mala, quae ab ipsa derivantur. Denique niger urinarum color non mali semper est ominis, praesertim si pendeat ab extrinseca causa; sic malus non est in adfectibus lienis, ut videre est in casu Erofonis. Lienosum, cui vere, & autumnio lien intumescebat, cum dolore, & facie sublivida, sive melaniectero adfectum, toties liberatum, quoties urinas atramento similes per aliquot dies excrevisset, observavit *Valesius* in *Hollerium*. Sic pariter haud malus est, si pendeat a solutione nonnullarum febrium quartanarum. Urinas nigras in hydrope fundi docet *Sennertus*, & observent naturae Curiosi, idemque a scabie retropulsa contingere testantur. Nullum etiam periculum portendit urinae nigredo, si adjunctam habeat haemorrhogiam, ut patet in casu Mentonis, aut uberem fluxum menstrualementi illi non absimilem, quo conreptam fuisse legimus aegram 3. epid. sect. 3. aegr. 2. At mala praesagit in morbis acutis, nisi sub iisdem circumstantiis excernatur testante *Hipp.* in prognost. Urina nigra, tenuis, parca mortem praesagivit aegro tritaeophia casu conrepto, ut docet *Hipp.* 1. epid. sect. 2. Idem etiam refert urina-

nam nigram, quae in aquosam commutatur, funestam esse. Vid. 3. epid. sect. 3. aegr. 2. Lethalis procul dubio est urina nigra, & simul foetida; mortem etiam praenunciat quae constanter nigra est, tenuis, & aquosa, ut patet in foemina 3. epidem.

Urina oleosa expers adipis, & oleo similis tum quoad colorem, tum quoad consistentiam salutaris esse solet, nec unquam talis excernitur urina, quin materia morbifica integram coctionem subierit. Et quidem hujusmodi urinam a se plerumque observatam refert *Galenus* sine periculo aegrotantis. At quæ aranei telis similis est superne instans pinguedo mala reputatur ab *Hipp.* & *Galen.*, utpote conliquationem enuncians.

Urina constanter inodora mala est; absolutam enim cruditatem ostendit; ejusdem vero odor solito gravior periculum in morbis praenunciat, & non facilem sanationem; dummodo foetor non sit in adsumtis; putredinosus autem urinarum odor in inflammatione tum renum, tum vesicæ imminuentem earundem partium gangranam, & mortificationem portendit.

Sedimentum squamosum, & furfuraceum mortiferum est in febribus acutis utpote a conliquatione pendens ex *Hipp.* nisi forte a vitio renum, aut vesicæ proficiatur. Facile vero cognoscitur hujusmodi sedimenta a vitio renum minime profluere, si febris adsit acuta, & conliquativa, nec ulla urgeant symptomata, quæ renum vitia comitantur. Generatim sedimenta extranea in urinis cum a materiis pendeant, quæ ab urinariis canalibus ut plurimum abraduntur, ea ominari solent



lent, quæ de morbis earundem partium constituta sunt.

Constans eorum defectus, quæ in urinis contineri debent, pessima prænunciat tum in acutis, tum in chronicis morbis, difficilem, ac fere nullam esse coctionem, sed salinas, ac terrestres particulas a reliquis humoribus minime secerni demonstrat. Idem ominandum, si nonnulla ex iis se præbeant conspicienda, & mox evanescant.

Denique urina acris, quæ cum dolore, & uberrime excernitur, sæpe critica est in morbis acutis, ut docet *Hipp.* i. epidem. sect. i. At excretio modica urinæ acris, qua nihil sublevetur æger, lethalis est; quippe serosum liquidum ab urenti calore internas partes adficiente absumtum ostendit. De Sileno refert *Hipp.* quod paulo ante mortem modicum urinæ acris excreverit; & in multis ardenti febre conreptis paulo ante quam postremum diem obirent similem acris urinæ excretionem a se observatam fuisse testatur *Prosper Alpinus*.

Observandum hic est excretionem urinæ, quæ fiunt insciente ægro, pessima ominari. De his ita loquitur *Hipp.* in coac. *Urinæ, quæ minguntur a non recordantibus, nec commonesactis, pessimæ sunt*; quippe ut docet *Galenus*, privationem sensus, & functionum naturalium enunciant.

Observandum etiam in multis febribus acutis urinam nihil discrepare ab urina sanorum, quoad colorem, consistentiam, & hyposthasim, & tamen ægri mortem ab ea pronuciari; ostendit enim nihil morbosæ materiæ per urinas evacuari, sed ad insigne aliquod viscus deportari, quod lethale est

in phrænesi, pleuritide, & peripneumonia.

Quid! quod instantes morbi ex urinis sensibilibiter mutatis præfagiri possunt. Sic urinæ præter morem tenues, & crudæ sine repletionem in iis, qui comitiali morbo tentari solent, morbi insultum prænunciant, præsertim si dolor summum humerum, cervicem, aut dorsum adfecerit. Sic in febribus intermittentibus urina tenuis, & minimo colore imbuta ut plurimum instantem febrilem paroxysmum portendit. Sic pariter in fœminis hystericalibus, & hominibus hypocondriacis uberior aqueæ urinæ copia imminentes eorundem morborum paroxysmos enunciat, atque ita de reliquis.

Denique ex urinarum indole inferri potest quam criseos specie solvetur morbus ad salutem terminaturus. Ita si coctionis signis occurrentibus copiosæ, & constanter tenues excernantur urinæ, statuendum est morbosam materiam per abscessum e sanguine decessuram. Ita quoque si urinæ quidem coctæ, at parva quantitate reddantur, interim vero mitiora fiant morbi symptomata, & cutis sit humida cum pulsu molli, & undoso, feliciter solvetur morbus per criticum sudorem, per diuresim vero, si urinæ sint coctæ, crassæ, & eodem tempore uberiores. Ita pariter si cocta excernatur urina, & surditas adsit, per hæmorrhagiam fiet morbi solutio. Tandem si flavæ excernantur urinæ adeo, ut ab ipsis alba corpora flavo colore inficiantur decerni poterit per icterum solutum iri morbum; & sic de reliquis, dummodo cum urinis alia signa datæ cujusvis criticæ evacuationis occurrant. Sed de urinis plura habet Hipp.



## CAPUT XXXI.

## DE PROGNOSTICIS EX LACRYMIS.

**D**E lacrymis pluries loquutus est Hipp. & ubique confirmat quod monuit aph. 52. sect. 4. scilicet, quod quibus in febribus, vel in aliis morbis non sponte lacrymæ erumpunt, malum; qui enim sponte inlacrymant, nullum hoc de nomine periculum subeunt. Sæpe tamen in morbis acutis, si non sint cum signis exitiis, hæmorrhagiam narium præpunciant lacrymæ ex eodem Hipp. i. epidem. sect. 2.

## CAPUT XXXII.

DE PROGNOSTICIS EX MUTATIONE  
QUALITATUM CORPORIS  
GENERATIM.

**M**utationem qualitatum corporis quod adtinet, illud in genere animadvertendum est, quod si in morbis maxima fiat corporis mutatio, qualiscumque ipsa fuerit, malum semper prænunciatur; ubi notandum, quod nec bonum sit nullam fieri mutationem corporis existente morbo, ut scite monuit Hipp. aph. 28. sect. 2. quo ait non omnino leviter febricitantium permanere, & nihil mi-

*uni corpus, aut etiam magis, quam pro ratione contubescere, malum; illud enim morbi longitudinem, hoc imbecillitatem significat. Malum quoque est in declinatione morbi corpus alimento non refici ex e-  
iusdem aph. 31. ubi docet, quod si a morbo bene comedenti corpus non proficiat, malum. Ut autem malum est corpora in morbis vehementer extenuari, & cotabescere, ita & inflari Hipp. 2. prognost. hæc habet. Aqua inter cutem si ex acuto morbo accipit periculosa est; neque enim febrem solvit, sed doloribus torquet, atque interficit; ubi signatur ab ipso Hipp. habitus corporis præter rationem univ-  
erse tumescentis. Quod si ad peculiarem corporis partem fiat mutatio, hoc, prout illæ nobiles fuerint, aut ignobiles, signa profert. Ita in acutis, siue etiam in longis morbis si tumescant pedes, non inde tamen pravum signum desumitur, oculis autem, & facie tumescentibus præsertim in acutis, malum.*

## C A P U T   X X X I I I.

### DE PROGNOSTICIS EX COLORE.

**C**olor utiliter quandoque mutatur in corpore, & ex hujus mutatione præsagia desumuntur. Sed nihil mutabilius occurrit flavo colore, qui in iëtericis conspicitur. Iëterus autem aliquando morbis supervenit; & quoniam diversa est pro diversitate temporum, quibus adcidit, ratio præsagien-  
di



di, propterea notandum quod utilis censeatur icterus, si morbo post coctionem humorum superveniat teste Hipp. aph. 64. sect. 6. ubi sic ait; quibus per febres morbus regius die septimo, aut nono, aut undecimo, aut decimo quarto supervenerit, bonum, nisi dextrum hypocondrium durum sit, alioquin minime bonum. Qui contrario modo adparet icterus pro malo habetur. Certe Hipp. aph. 62. sect. 4. sic habet. Quibus per febres morbus regius supervenerit ante diem septimum, malum; quæ tamen sententia non est habenda pro universali, ut testantur Averrhoes, & Hollerius, utque constat ex epidem. ipsius Hipp. dummodo superveniat hæmorrhagia, vel sudor &c. De his consulatur Schenckius. Critica est aurigo in pleuritide biliosa, si septimo adcedat die, ut observat Forestus.

## C A P U T X X X I V.

### DE PROGNOSTICIS EX FACIE.

**A**D mutationes quod spectat peculiarium partium, nihil contemplabilius occurrit facie ægrotantis, quæ si cum sano homine similitudinem servare comperiatur, & præsertim cum ægro, antequam morbo conriperetur, tunc licebit bene de illo ominari, ut habetur ex 1. prognost. Prava vero erit facies, cujus notas Hipp. ibidem recensuit, & idcirco dicitur Hippocratica. Talis autem fuerit; oculi cavi, nasus acutus, tempora conlapsa

lapſa, aures frigidae, & contractae, cutis dura, color pallidus, aut niger; atque hæc quidem facies lethalis erit, niſi monente ibidem Hipp. talis fuerit propter antecedentem vigiliam, aut alvi dejectionem; quamquam & hæc ipſa cum tali facie copulata nihil boni exhibeant. Idem etiam ait 2. prorrhēt. *Faciei color bonus, & mæſtitia multa, malum*; ut videas mutationem ne dum in pejorem qualitatem, ſed etiam in meliorem eſſe metuendam; quod confirmatur ex aliis locis prorrhēt. & ex coac. quoque, ubi ait, *qui capite dolent firmiter delirantes, alvo ſubpreſſa, feroci adſpectu, rubore in facie effloſcente in poſteriorem partem convelluntur*. Sed & partes faciei ſua ſingillatim exhibent ſigna futuri exitus, Nam oculi ut ait Hip. 6. epidem. ut valent, ita corpus, atque in primis caput. Bene autem valent oculi, ſi ſanis ſimiles fuerint, ſi ſplendidi, pleni, ſi lumen non averſentur, ſi palpebris obcludantur, & per occaſionem aperiantur libere, nec ulla moleſtia adficiantur, ſi lacrymis, atque excrementis non ſcantent. Hæc omnia patent ex 1. prognōſt. ubi legantur adtente, & expendantur ſigna, quæ ex oculis tum vigilantibus, tum per ſomnum clauſis deſumuntur. Damnantur in ægris oculi feroces, & horridi, quippe qui delirium portendunt. Damnantur & oculi nimis adtenti, & fixi, quos concretos, & ſtabiles vocant, de quibus 2. prorrhēt. habetur; *hebetatus oculus, vitiatusque, & concretus, immobilisque, & tenebroſus ſi fuerit, malum*. Ad nares quod adtinet, jam de acuto ſupra diximus naſo in facie hippocratica. Nunc monendum reſtat de ejuſdem naſi contorſione, & convulſione



fione ; itemque de nimio pruritu , nisi hic sit indicium sanguinis jam jam effluxuri . Sunt enim pravi morbi argumenta , & pruritus delirium prænunciat . Lethale etiam signum est livor , aut nigredo narium , quæ jam sint contractæ , quemadmodum & similis in maxillis color , præsertim talis sub morbi initium adparens .

## C A P U T X X X V.

### DE PROGNOSTICIS EX MUTATIONIBUS. IN LINGUA ADPARENTIBUS.

**S** Edulo expendendæ sunt mutationes in lingua adparentes ; nam ejus color , qui ad lividum , vel nigrum vergit , semper suspectus , præsertim si cum colore conjungatur asperitas . De lingua i. prorrh. ait . Hipp. densæ linguæ phreniticæ . Et in coac. *Lingua , quæ in principio horrida , in eodem vero colore perseverans est , procedente vero tempore , ubi exasperatur , livescit , funditur , mortem denunciat . Quod si valde nigrescat , die decimo quarto judicationem promittit .* Periculi autem maxime plena est lingua nigra , & ex virore pallescens . Quod si lingua fuerit aspera , & nigra , æger autem non siciat , omnium maxime periculosus est morbus .

X 172 X  
CAPUT XXXVI.

DE PROGNOSTICIS EX MUTATIONIBUS  
IN FAUCIBUS ADPARENTIBUS.

**F** Auces quoque sua præbent indicia, & significationes, ut habetur 3. prognost. Neque leviter terreri debemus, ubi fauces febrienti exulcerantur, cui si aliud quoque ex magnis, quæ supra declaravimus, adcesserit, in periculo ægrum versari putandum est. Hipp. 1. prorrh. ait. *In acutis morbis faucium sine tumore dolores, & pusilli, & strangulantes, atque cum æger hiaverit, non facile os tum cogere, tum claudere, mentis alienationem portendunt, ex his phrenetici fiunt, & perniciose habent. Et aph. 35. sect. 4. Si febre detento repente collum intorqueatur, ut vix deglutire queat, nullo existente tumore, mortiferum.*

CAPUT XXXVII.

DE PRONOSTICIS EX HYPOCONDRIIS,  
VENTRE, ET EXTREMITATIBUS.

**E**x hypocondriis etiam, & ventre conliguntur signa non contemnenda. Hipp. 1. progn. hæc habet. *Ilia saluberrima sunt, si dolore vacant, si mollia, & æqualia sunt dextra, & sinistra parte. Ibidem 2. Venter sit corporatus, ac moliis necesse est.*  
Et



Et aph. 33. sect. 2. In quovis morbo partes circa umbilicum, & pectinem habere crassitudinem melius est. At vehemens tenuitas, & eliquatio prava est. Periculosa vero talis est etiam ad infernas purgationes. Extremitates tandem corporis prognosim subpeditant, nempe aures, manus, nares, pedes, ut docet aph. 48. sect. 4. & pressius aph. 1. sect. 7. Legitur 2. prognost. Si manus, ac pedes frigidi sunt ventre, costisque calentibus, malum. Ibidem gravitas corporis, quæ vel manus, & pedes, vel reliquum quoque corpus premit, periculum significat. Quod si cum gravitate unguis etiam, ac digitus adficiantur livore, continuo mors expectanda est. Si vero cum nigredine pedum, & digitorum salutaria signa copulentur, sperandus erit abscessus, & subpuratio, adeoque exitus salutaris.



## Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η

## C A P U T I.

DE INDICATIS, INDICANTIBUS, ET  
INDICATIONIBUS.

**P**ostquam Medicus diagnosticorum signorum praesidio morbi nomen, varios ejusdem gradus, partem adfectam, & indolem materiae morbum interentis determinavit, per signa vero prognostica detexit quid sperandum sit, quidve metuendum, jam eo processit, ut inferre tuto possit quid sibi faciundum sit, idque illud est, quod dicitur indicatum, scilicet ea omnia, quae aegrotanti corpori convenire, ac prodesse judicantur vocari solent a Medicis indicata; indicantia vero ea adpellantur, quae in corpore ipso aegrotante occurrunt aliquid opis innuentia, qua aeger a morbo levare possit; nempe indicantia dicuntur phaenomena, vel effectus morborum, qui, cum naturam morbi, ejusque causas patefaciant, ostendunt Medico quid sibi praestandum sit ad curationem ipsius morbi feliciter adsequendam. Demum indicatio non aliud est, quam selectus, & determinatio modi, quo curationem instituere debeat,



beat, & remedia exhibere ratione habita ad indicantia, ut ea proinde nihil sit aliud, quam ratio illa, qua Medicus ipsemet ex iisdem indicantibus ea conligit, statuitque, quibus propositum sibi finem adsequi possit, morbosas nempe fluidorum, & solidorum adfectiones ad naturalem statum revocare.

Indicationem autem vulgo dividunt in prophylacticam, curatoriam, vitalem, & symptomaticam, prout auferendas censent morbi causas, morbum ipsum, virium debilitatem, & symptomata; quae tamen divisio observante *Pitcarnio* inanis est, & absurda. Cum enim, ut praeclare animadvertit *Sauvagesius* sublato morbo tollatur & causa, cujus est effectus, & simul tollantur symptomata, quorum concursus morbum constituit, vel est morbus ipse, indicatio curatoria prophylactica simul est, & symptomatica. Sed & ipsa debilitas est symptoma, atque adeo sublato symptomatum concursu, scilicet morbo, restituntur, & servantur vires ipsae, hinc est ut indicatio vitalis a curatoria perperam separetur. Indicatio vel est rationalis, vel empirica. Prior est cognitio utilitatis, vel opportunitatis cujusdam porrigendi auxilii in dato quopiam morbo, ex qua voluntas ad id, quod profuturum cognoscimus, agendum, vel praescribendum determinatur. Altera est memoria utilitatis, quam certum quoddam auxilium in simili casu adhibitum adtulit, licet agendi modus, & morbi conditio, vel causa ingoretur. Valet haec in usu remediorum specificorum, quorum utilitatem sola experientia, vel historia proferre in medium potest.

Indi-

Indicantia ad duas classes revocantur ; primae classis ea sunt , quae supra definivimus . Ad alteram referuntur aetas , sexus , temperamentum , vitae genus , aegri consuetudo , adfectarum partium conditiones , scilicet earundem sensibilitas , peculiaris consensus , & necessitas ad vitam , aer , regio , temporis constitutio , tempora morborum , & alia hujusmodi , quibus omnibus confirmantur indicationes , quae ab indole , causa quo morbi profuxerunt . Hinc licet ex his alia abeant in coindicantia , alia tamen evadunt contraindicantia . Coindicantia tunc vocantur , cum illud ipsum indicant , quod ab indicante primae classis indicatum fuit . Ex. gr. si excedens copia sanguinis sit indicatum primae classis , & curanti Medico se se obferant aetas juvenilis , temperamentum sanguineum , & insignis virium gradus , quandoquidem singula haec detractionem , sive inminutionem sanguinis coindicant , idcirco dicuntur coindicantia .

Quod si in morbo aliqua contingant , quae indicanti primae classis adversentur , haec dicuntur contraindicantia . Ita ex. gr. pleuritis inflammatoria detractionem sanguinis indicat , sed aegri debilitas indicat contrarium .

Prohibentium vero nomine tunc vocantur contraindicantia , cum non solum indicanti primae classis adversantur , sed contrarium etiam omnino indicant ; sic prohibens esset insignis virium exolutio in aegrotante , cui secundam venam inflammatoria pleuritis indicaret . Eadem exolutio virium purgationem prohibet , & sic de ceteris .



Tandem ea nuncupantur permittentia, quae non omnino, & absolute, sed ex parte tantummodo coindicant, aut repugnant, adeoque sinunt, ut indicatum remedium aliqua ratione adhiberi possit.

## C A P U T I I.

### DE MEDICAMENTIS EX PHARMECEUTICO FONTE DESUMTIS AC PRIMO DE SALINIS ACIDIS.

CUM vires mechanicae per se, ut alibi diximus, minime omnium sufficiant naturalibus effectibus procreandis, hinc ne tyrones Medici aliquid ex eo difficultatis offendant, quod medicamentorum vires ex legibus plane mechanicis deduxerint Physiologi plerique omnes, ac praecipue *Boerhaavius*, iidemque proinde falsa pro veris, ut *Ixion* pro *Junone* nebulas complectantur, operae pretium est, ut medicamentorum ipsorum vires, & agendi rationem ex physicis principiis explicemus. Atque ut a medicamentis salinis exordiamur, observandum est haec vel acida esse, vel alkalica, vel media. Primi generis medicamenta sunt acetum, acetosa, fraga ribesum, uvae inmaturae, citrea mala, cydonia, aurantia, spiritus ex vitriolo, alumine, sale marino, nitro, & sulphure educti &c. Haec autem medicamenta cum fixiori donentur acido maxime valent ad

nimiam fraenandam haematosim , & ad excedentem sanguinis solutionem , aestuationemque compescendam , ac propterea temperantia , & refrigerantia nuncupari consueverunt . Et quidem cum inter materiam sanguinis phlogisticam , & acida hujusmodi corpora nulla vis intercedat mutuae adtractionis , hinc efficitur , ut materia illa phlogistica aliquem ab iisdem corporibus congelationis gradum patiatur , ut magis proinde coercita difficilius ab aeris solventibus adtrahatur , & minus minusque solvatur , non secus ac phlogistica sulphuris materia ita congelat per interpositionem acidi vitriolici , ut ipsimet inflammabili sulphuri non parum de nativa inflammabilitate decedat , & inflammabilitas cerae , & saebi retardetur per admistionem aluminis , quod forti abundat acido , ac demum minor efficiatur olei solutio flammea , si in oleum ipsum ardentis lucernae parum salis inmittatur , & cum eodem oleo commisceatur . Haematosim etiam vividius procedentem fraenant salia media , ut nitrum , plantae omnes nitrosae , ut & nitrosae quaeque , nec non serum lactis . Atque haec medicamenta plurimum prosunt in synocho ardenti , in sanguifluxu a fervore , & velocitare nimia fluidorum , in haemorrhagia plethorica , schorbuto , phaenigmo , ardore , polydipsia , & anorexia febrili , colica biliosa , hepatalgia infarctu ab intemperie , ut vocant calida , & similibus morbis . Cum autem medicamenta cardiaca ea vocari soleant , quae motum cordis vividiolem efficiunt , cumque solutior humoris sanguinei compages minus sit aptior ad fibras motrices contrahendas , roborandasque ,  
hinc



hinc est, ut medicamenta acida, de quibus huc usque diximus, & quibus sua sanguini consistentia restituitur, cardiaca vocari possint.

## C A P U T I I I.

### DE MEDICAMENTIS ALKALICIS.

**M**edicamenta alkalica sunt sal absynthii, cardui benedicti, tartari, salia aquarum carolinarum, borrensiarum, cornu cervi ustum &c. Hujusmodi vero medicamenta cum magnam vim habeant ad acidum bilis, aliorumque fluidorum adtrahendum, & absorbendum, illud efficiunt, ut minor acidi quantitas in sanguinem ingrediat, atque ita regelatio inflammabilis substantiae ipsiusmet sanguinis, caseosae vero adtenuatio promoveatur. Huc etiam faciunt acida vegetabilia quae volatiliori referta sunt acido. Hujusmodi enim vegetabilia plurimum valent ad congelatum nimis, & fixum acidum in sanguine haerens regelandum. Hoc autem ita regelatum cum facilius ab aereis solventibus adtrahatur, citius e sanguine ab illis educatur oportet, atque adeo inflammabilis materia regelascat, adtenuetur caseosa, & visciditas sanguinis auferatur. Atque hinc est, quod hujusmodi medicamenta adtenuantium, incidentium, & resolventium nomine vocari consueverint. Generatim haec profunt in hypocondriasi asthmatica, singultu cachectico, dyspnoea pituitosa, arthriti-

de rheumatica, hepatalgia infarctu a frigida, ut  
ajunt, intemperie, & similibus.

## C A P U T I V.

### DE MEDICAMENTIS AROMATICIS.

**M**edicamenta aromatica dicuntur quae spiritu  
volatili oleoso abundant, adeoque fragran-  
tem odorem emittunt. Hujusmodi sunt cyperus,  
angelica, calamintha, hyssopus, majorana, men-  
tha, salvia, abrotanum, ocymum, ros marinus,  
thymus, serpillus, radix zedoariae, enulae, me-  
lissae, angelicae, praeter ceteris vero, quae mate-  
ria phlogistica abundant, eademque plurimum  
evoluta, seu regelata, ut nux moschata, caryo-  
philli, piper, gingiber, aliaque permulta. Horum  
omnium medicamentorum actio in eo sita est,  
ut ratione substantiae phlogisticae, quam conti-  
nent, inflammabilis materiae sanguinis adtenua-  
tionem promoveant, atque inde est, quod hujus-  
modi medicamenta inter adtenuantia, & inciden-  
tia referri possint, & calefacientia pariter nuncu-  
pari praesertim quae materia abundant plurimum  
regelata. Multae igitur utilitatis erunt in morbis  
illis omnibus, in quibus sales alkalicos convenire  
supra dicebamus. Quoniam vero nimium adstri-  
cta sanguinei laticis compages minus valet ad fi-  
bras motrices roborandas, contrahendasque, hinc  
medicamenta superius exposita ut pote quae ma-  
chi-



chinam cordis potentius irritare possunt, ejusque motum vividiorum efficere, cardiaca dicenda sunt.

## C A P U T V.

### DE MEDICAMENTIS AMARIS.

**M**edicamenta amara saponem constant naturali, sive ex duplici principio, salino nempe fixiore, & oleo intime unitis coalescunt. Talia sunt cichoreum, endivia, carduus benedictus, sal ebsoniense &c. & inter validiora absynthium, centaurea minor, gentiana, fumaria, myrrha &c. statim vero patet vim hujusmodi medicamento- rum ratione duplicis illius principii in eo consistere, ut inflammabilis materiae sanguinis regulationem excitent; Hinc adtenuantibus, & incidentibus adnumerantur, quod de saponaceis omnibus tum naturalibus, tum artefactis dicendum est.

## C A P U T VI.

### DE MEDICAMENTIS FOETIDIS.

**F**oetida medicamenta sunt castoreum, moschus, asa foetida, & similia corpora, quae sulphureae, acidaeque materiae plurimum continent.

M 3

Haec

Haec autem cum sit fluido nerveo, nerveisque canalibus maxime heterogenea, patet per hanc ipsam heterogeneitatem fieri necessario debere, ut ipsius fluidi nervei excedens motus, & elasticitas infringatur. Hinc est, ut hujusmodi medicamenta, & praesertim moschus in hysteria, ut & in convulsionibus omnibus maxime commendetur, dummodo convulsionum ipsarum causa inflammationibus, aut vulneribus non debeat.

## C A P U T V I I.

### DE MEDICAMENTIS AQUOSIS, ET OLEOSIS.

**M**edicamenta aquosa sunt aqua communis, aquae minerales, aquae destillatae, serum lactis &c. Oleosa vero sunt oleum olivarum, amygdalarum dulcium, adipēs, medullae, axungiae, butyrum &c. ex iis autem, quae alibi constituta sunt, inlico patet homogeneitatem, quam ejusmodi medicamenta habent cum solidis, ex quibus canales componuntur, in causa esse, cur ab iisdem adtrahantur, atque adeo distrahentium contactuum numerus augeatur, compositum proinde flexilius efficiatur, nimiaque fibrarum rigiditas, & meatuum adstrictio relaxetur. Hinc est, quod hujusmodi medicamenta laxantia, & emollientia vocari soleant. Sic olea ex maturis vegetabilium semi-



feminibus expressa, & praesertim oleum amygdalarum dulcium vim habent emolliendi, & laxandi. Oleosa item omnia, ad quae pingua, & subpingua referuntur, eandem referunt naturam. Emolliunt etiam, & laxant aquosa omnia, ut balnea calida, praesertim si vegetabilia emollientis naturae, ut radices malvae, althaeae, parietaria, malva, branca ursina, flores camemeli, meliloti, semina lini, foenu graeci &c. cocta fuerint in aqua ad balneum parata. Sane ingens est usus balnei calidi in nimio musculorum, ac ligamentorum rigore, atque adeo in contractionibus artuum, in adstrictione alvi ob excedentem intestinorum contractionem, in variolis, aliisque pluribus morbis, & aqua calida pro placidissimo, ut *Boerhaavii* verbis utar, ad dolorum acerrimos fomento commendatur ab *Hippocrate*.

Quoniam vero balnei mentio facta est, observasse juverit a veritate deflexisse *Raulinum*, dum monuit, ne quis in balneo diu conmoretur. Contendit enim, quod cum partes balneo immerse comprimantur pondere huiusce fluidi octies centies maiore, quam sit pondus aeris, plurimum detrimenti adlatura sit immerso corpori inmanis illa compressio. At vero licet ex rationibus *Halleyi*, & *Muschensbrækii* aquae pondus reipse majus octingenties habeatur atmosphaerae pondere, haud vero quadringenties, ut *Galileus* existimavit, non inde tamen sequitur, ut pondere octies centies maiore, quam sit pondus aeris, corpus balneo insidens comprimat. Ut enim tantam hanc pati compressionem posset, illud fieri deberet, ut eidem columna aquea superincumberet, cujus altitudo atmosphaerae

altitudinem exæquaret , quod certe non contingit in balneo.

## C A P U T V I I I .

### DE MEDICAMENTIS FARINOSIS , ET CRASSIS.

**F**arinacea , & crassa medicamenta , quæ etiam increassantia nuncupantur , sunt avena , hordeum , amyllum , leux , gelatina cornu cervi , ova forbilia , radices althææ , farfara , lactuca , flores sambuci , violarum , borraginis , buglossæ , juscula carniùm animalium juniorum , & præsertim extremitatum eorundem , glutinosa demum , gummi arabicum , tragacanthum , aliaque plura . Hæc autem medicamenta tenuitatem sanguinis tollere , atque humores increassare putandum est , quod materiam phlogisticam plurimum congelatam contineant , quam cum in sanguinem invehant , in causa sunt , cur ipsius substantia phlogistica magis magisque congelaciet , minusque proinde ab aeris solventibus adtrahatur , solvaturque . Atque hæc generatim valent in atrophia a sanguifluxu , diabete anglico , phthisi humida , typho exhaustorum &c. Cum autem ab acidis condensentur humores nimium soluti , sequitur , ut ad increassantia referri possint succi quorumlibet fructuum acidorum , gelatinæ quoque , & syrupi ex iisdem parati , ut syrupi , & gelatinæ granatorum , ribesii , aurantiorum , itemque tincturæ per liquores acidos ex  
rosis



rosis , papavere rhæados , & similia confectæ .

## C A P U T I X.

### DE MEDICAMENTIS DULCIBUS.

**M**edicamenta dulcia sunt amygdalæ dulces , semina omnia dulcia , dactyli , liquiritia &c. præsertim vero lac , cujus nostris hisce temporibus frequentior est usus in medicina . Hujus medicamenti pars phlogistica cum plurimum congelata sit , hinc est , ut ejus agendi ratio eadem plane sit cum actione medicamentorum farinaceorum , & crassorum , & iisdem plane morbis conveniat . Cum autem nutritionem augeat , sed sæpe etiam laxitatem inferat , dejectionesque sollicitet , sequitur , ut ipsum agere debeat vi quadam homogeneitatis cum interna seu ventriculi , seu intestinorum substantia . Dum enim ab iisdem tunicis absorbetur , majorem in ipsis excitat continuitatem , ob quam eadem in majorem laxantur flexilitatem , atque adeo quæ intestinis ipsis continentur materiæ de corpore secedunt . Hoc præ ceteris præstat lac asininum , itemque serum lactis magna copia propinatum . Et quidem *Hipp.* in morbis chronicis lacte asinino purgabat . Sero autem lactis adfatim exhibito laxari intestina , & moveri alvum quotidie videmus , atque ita diuturnos , contumaces , desperatosque morbos sanari . Præterea cum ab eodem acrimoniam humorum obtundi certum sit ,  
hinc

hinc est , ut ipsum edulcorantis medicamenti nomine insigniri consueverit . Eodem etiam nomine donantur decocta ex pullo , juniore , vitulina carne , ranis , testudinibus , decoctiones hordei , emulsiones ex feminibus dulcibus paratae , radices altheae , & plura alia his similia . Sed cum plerumque generalium hujusmodi edulcorantium ope optatum finem adsequi non liceat , idcirco pretium operæ erit quæ remedia in unaquaque acrimoniæ specie maxime convenient paucis delibare . Acidam igitur acrimoniam enervant , & tandem omnino tollunt remedia , quæ materiam acidam adtrahere , & infringere plurimum possunt , cujusmodi sunt terræ omnes bolares , ut bolus armenæ , corallia , cornu cervi ustum , lapides cancerorum , testæ ovorum calcinatae , & omnia fere genera concharum .

Acrimonia alkalina conrigitur ab acidis , quibus sales alkalici in neutros conmutantur . Hæc a libi declaravimus .

Acrimonia muriatica tollitur ope diluentium , & edulcorantium supra descriptorum .

Acrimoniæ putridæ , in qua nempe humores nimium soluti in alkalicam abeunt corruptionem , medentur remedia balsamica , qualia sunt radices scordii , imperatoriæ , angelicæ , rutæ caprariæ , flores aquilejæ , semina cardui benedicti , succinum , myrrha &c.

Aliæ præter expositas recensentur a Medicis acrimoniæ species , biliosa nempe , empyreumatica , & rancida . Biliosa , quæ cum a subtili oleo , & subtili etiam , ac volatili adjuncto sale foveatur ex *Etmullero* , nitrosis quibuslibet , & blande acidis



acidis ex vegetabili regno depromptis contrigi potest.

In empyreumatica, in qua scilicet acre oleum dominatur, præter nitrosa, & blande acidula, adprime profunt mucilaginosula, & blande oleosa, ut emulsiões ex seminibus dulcibus, & frigidis paratæ.

Rancida demum, in qua oleum peculiarem quandam contrahit aciditatem, remediis antiscorbuticis, sive sale volatili paulo acriore præditis removenda est.

## C A P U T X.

### DE MEDICAMENTIS AUSTERIS.

**M**edicamenta austera sunt præ ceteris alumen, vitriolum, spiritus vini rectificatissimus, & quæ plurima, ex eodem componuntur. Horum actio medicamentorum rigiditatem, & majorem in solidis partibus firmitatem efficientium exinde repetenda est, quod major ab illis nervei laticis adfluxus excitetur vi heterogeneitatis, qua donantur relate ad nonnullas canalium substantias, ut hæ proinde magis magisque condensentur, & constringantur, vel homogoneæ quædam partes regulentur, & ex illis educantur, atque ita reliqua moles in minus redigatur volumen, scilicet contrahatur, & robustior, ac rigidior efficiatur. Hac potissimum ratione ut animalium fetus a putredine

ne præcaveantur, in spiritu vini demerguntur; hic enim plurimum humoris ex illis extrahit, ex quo efficitur, ut ipsorum carnes in rugas contrahantur, atque adeo majorem adquirant firmitatem.

Austera mitiora vocari solent adstringentia. Hujus generis sunt folia, semina, & radices plantaginis, succus ejusdem inspissatus, symphitum majus, folia tenella hyperici, quercus, flores rosarum rubrarum siccarum, & inter paulo validiora radix bistortæ, pentaphilli, tormentillæ, simarubæ, cortex peruvianus, cortex item granatorum, balaustiorum, succus acaciæ, sanguis draconis &c. Huc referri etiam potest aqua frigida. Cum enim omnis deficiat adtractio inter substantias carniū, & partes aquæ frigoriferas, illud necessario fieri debet, ut vasorum latera magis contrahantur, vividioque rigore intendantur. Magnæ igitur utilitatis erit usus aquæ frigidæ, & præsertim balnei frigidi in debilitate, seu paralyfi partium humani corporis, quam nimia nervorum laxitas intulerit, itemque in molliori corporis constitutione, ac nimia proinde sensibilitate, quæ sane constitutio valetudinaria dicitur a *Celso*. Quin, si fides habenda est *Bartolino*, tantam vim habet ad constringendum aqua gelu adstricta, ut ipsum aneurisma per impositam tumori nivem sanari possit. Conveniunt autem adstringentia in qualibet hæmoptysi, phthysi hæmoptoica, hæmatemesi, hæmaturia traumatica, menorrhagia inmodica, item in inmodicis hæmorrhoidibus, diarrhœa vulgari, serifluxibus, herniis &c. Conveniunt præterea in morbis illis omnibus, in quibus usui esse possunt antiseptica, quandoquidem, ut docent *Pringlius*, & *Macbri-*  
dins



*dus*, adstringentia medicamenta virtute donantur antiseptica. Denique adstringentia in fluxu sanguinis sunt medicamenta, quæ inter incrassantia retulimus, ut per se patet.

## C A P U T X I.

### DE MEDICAMENTIS TERREIS.

**T** Errea medicamenta sunt agaricus mineralis, bolus nucerinus, ferrum &c. De ferro, cuius hodie maximus est usus in medicina, illud notabimus idem ex duplici substantia coalescere, nimirum ex terra quadam vitrescibili, & materia phlogistica, quæ per adfusionem fluidi acidi a vitrea facile separatur. Cum itaque adtracto acido a vitrescibili parte ferri laxetur inde, ac separatur materia illius phlogistica, hæc utique inflammabilem homogeneam sanguinis materiam rarefaciat necesse est, solutionem sanguinis, flammamque vitalem intendat, ut mirifice confirmatur ab incremento tum caloris vitalis, tum sanguinis motus, quod in iis observatur, ad breve tempus, qui sufficientem ferri quantitatem adsumserunt. Unde consequitur crocum martis, ferrum scilicet, quod igne combustum est, impar esse eidem phlogisticæ sanguinis substantiæ rarefaciendæ, quod in ipso nimirum deficiat phlogistica materia, utpote quæ per ignem inde exhalavit. Hinc ferrum inter incidentia, & calefacientia recenferi potest, & in mor-

morbis illis adprime convenit, quæ ex nimia sanguinis visciditate proficiuntur. Eadem dicas de sale ammoniaco, utpote qui phlogistica donatur substantia maxime regelata.

Haftenus egimus de medicamentis, quorum affectiones sensibus innotescunt. Nunc ad ea gradum faciamus, quorum proprietates ab effectibus desumi solent; sit igitur.

## C A P U T   X I I .

### DE MEDICAMENTIS NARCOTICIS, ET HYPNOTICIS.

**N**arcotica medicamenta ea nobis sunt, quæ, ut ait *Boerhaavius* dolorem tollunt stuporem inferendo. Horum actio in eo consistere videtur, quod nervei fluidi copiam non parum minuant, sive de corpore educant, quod præ ceteris præstat opium majore quantitate propinatum. Et opium quidem sale suo volatili hæmatosim excitat, & intensiorem reddit, ut ex eo evincitur, quod ab opio pulsationes cordis, & arteriarum augeantur, humorumque omnium circuitus adceleretur, exhilaretur animus, corpusque reficiatur, sed simul fluidissimum facit, & in spumeum quendam lentorem redigit eorum sanguinem, qui ipsimet opio largius indulgent, ut de Indis, & Turcis testantur observationes, quod sane ab intensiori hæmatosi, auctoque humorum circuitu proficitur. Verum etsi ab  
inten-



intenfiori , vividiorique facta hæmatosi major nervi fluidi quantitas generetur , fieri tamen non potest , quin ejusdem per extrema nervorum effluxus solventium aereorum ope uberius deinde perficiatur , ab aucta vero fluiditate sanguinis , spumeoque ipsius lentore infarctus præsertim in cerebri vasis procreentur . Hinc effectus opii explicari facile poterunt ; siquidem ab evaporatione , atque adeo ab inopia spirituum animalium profluere necessario debent dejectio virium , & sopor profundissimus morte plerumque terminandus , ab infarctu vero stupor , vertigo , paraphrosyne suboriri , que omnia observationibus adprime respondent . Narcoticis adcenferi pariter debent hyosciami nigri radix, flos, folia , stramonii semen, atropa belladonna, conium *Linnei* , & similia , quorum omnium agendi ratio in eo sita est, ut sanguinem fluidissimum efficiant, ut sapienter putat *Hambergerus* , & phœnigmus ostendit ab usu narcoticorum excitatus , qua quidem excedenti fluiditate necessario procreari debent infarctus , atque inde supra exposita mala derivari .

Si quantitas adsumti opii minima sit , nimirum unius , vel alterius grani pondus non excedat, tunc dolorem tollit placidissimum somnum conciliando , quo casu hypnoticum dici solet . Hinc vis , & actio intelligitur pillularum de cynoglossa , ut & eorum omnium , quæ parantur ex opio, cujusmodi sunt laudanum solidum *Quercetani* , vel liquidum *Sydenhamii* , theriaca *Andromaci* , diascordium *Fracastorii* , aliorumque his similium . Eadem dicas de papavere , & papaverinis omnibus , nempe confectis ex papavere tum sativo , tum errat-  
tico

tico, & sylvestri, quod rhæados vocant, idem de lactuca, quæ lacteum succum fundit opio aliquatenus similem &c.

Multa de salutaribus, & noxiis opii effectibus adcuratissime observavit *Trallesi*, eorumque sententiam refutavit, qui ab opii usu pulsum retardari contendebant, eidemque frigidam qualitatem tribuebant. *Tralesi* sententiam mirifice confirmat qualitas illa, quam in opio deprehendit *Boerhaavius*; ait enim vix aliud magis esse calidum, quam purissimum opium, quod linguæ admotum fere intolerabilem caloris gradum excitat, cuti vero adpositum instar emplastri vesicantis agit. Idem confirmant *Whyttius*, & *Avviseterus*, quorum alter ab opii moderato usu calorem oriri testatur, alter ab opio calorem ventriculi, ejusque inflammationem excitari comperiit ratione fortasse corrosivi olei, quod continet præter salem volatilem. Cum autem ab opio intendatur hæmorrhæosis, simulque nimia fibrarum rigiditas infirmetur, hinc sequitur, ut ab illius usu perspiratio, & sudor moveri debeant, atque adeo idem maxime profit in febribus intermittentibus, quarum causam non raro per sudores remover, & in secunda febre variolosa, dum perspirationem excitat, & humores versus cutim determinat, ut docet *Trallesi*. Sed præterea magno usui sunt hypnotica in colica, & gastrodynia hysterica, nephritide, dysuria nephralgica, ileo spasmodico, tenesmo a calculo, amphimerina singultuosa, singultu tum ab acrimonia, tum ab inanitione, syncope a dolore, pervigilio, tetano emprosthotonico, trismo dolorifico, tussi hysterica, ferina, ischuria



churia cystospastica, uno verbo in erethismis, & quibuslibet ferocioribus naturæ conatibus, doloribus spasmodicis absque metu soporis, hystericeis motibus, & in atrocibus quibusvis membranarum divulsionibus.

## C A P U T X I I I.

### DE PURGANTIBUS.

**P**urgantium medicamentorum ope materiæ intestinis contentæ per alvum excernuntur, quoties ab ingestis per os medicamentis peristalticus intestinorum motus intenditur vi heterogeneitatis, quam habent ingesta medicamenta cum tunicis flexilibus ventriculi, & intestinorum; quippe motus, quem in illis excitat simplex adpositio medicamentorum sæpius flexilium concipi ab iisdem tunicis non potest, nisi convellantur ipsæ, contrahantur, & firmiores evadant, ob eandem vim heterogeneitatis cum ingestis medicamentis.

Hinc generatim validiora purgantia sunt illa, quæ magis distant ab animali constitutione, ut sunt mineralia relate ad vegetabilia. Ex his autem quæ minus maturuerunt validius operantur, quam quæ magis matura sunt. Quæ vero inter matura panificam, vel vinosam fermentationem non conceperunt validiora sunt, quam fermentata. Demum inter animalia majorem ceteris paribus purgandi vim in minus adultis experimur.

Medicamenta purgantia in tres classes dispeſcuntur, ſcilicet vel lenia ſunt, quæ & lenientia vocantur, vel mediocria, vel vehementia. Inter lenientia primum occurrunt tartarea, quo nomine intelligimus etiam vulgarem vini tartarum, & quæ plurima præſertim agunt ſale ſuo eſſentiali, qualia ſunt ſaccharum, mel, manna, tamarindi, paſſulæ, caſſia, roſæ, violæ flores, & tenera folia perſici, ſenna, ſal anglicanus &c.

Ad purgantia mediocria referuntur aloe, hiera *Galenii*, rhabarbarum, turbith, jalappa, radix mechouchana, fungus agaricus &c.

Tandem inter vehementia purgantia numerantur helleborus albus, & niger, colocynthis, ſcamonea, mercurius dulcis, epytimum &c.

Obſervaffe hic juverit experientia compertum eſſe quorundam purgantium uſum certis quibusdam morbis adprime convenire. Sic manna plurimum confert in morbis pectoris, caſſia in adfectionibus renum, rhabarbarum in diarrhœa ſtercoroſa, ipecacuanha in dyſenteria, ſunt enim hæc duo remedia ſimul purgantia, & adſtringentia. Sic etiam tamarindi maxime profunt in febribus ardentibus, & putridis, præſertim vero prodeſt in ſynocha putri infuſum ſennæ, quo ſaburra ſanguinem inſpiſſans evacuatur, gravitas, & naſea ventriculi tollitur, ſecretio fluidorum intestinalium, atque adeo uberior ſanguinis depuratio promove-  
tur, excretio bilis adjuvatur, necantur vermes, putrefactio prævertitur &c. Animadvertendum etiam inter purgantia præſertim vehementia, quæ ſemper ſuſpecta eſſe debent, reperiri nonnulla, quæ certas quasdam partes peſſime adficiunt. Sic colocyn-



locynthis vehementes alvi dolores, & dysenterias movet. Sic helleborus præsertim albus guttur afficit, & difficilem facit respirationem. Sic scamonea præcipue agit in stomachum, viresque de-  
jicit. Sic radix jalappæ interdum convulsiones intestinorum, aut paralysem excitat. Sic tandem aloë venas ani præsertim irritat, atque ita de nonnullis aliis.

Purgantia conveniunt in obstructione, & compressione vasorum capillarium a sanguinis visciditate, qua intulerit saburra in sanguinem ipsum transmissa, quod suadebunt anorexia, nausea, linguæ sordities, febris exacerbans, capitis gravitas præter alia prægressa, & comitantia. Conveniunt item in aurigine, cephalalgia stomachica, cephalœa febricosa, ophtalmia humida, tenebri-  
cosa, chemosi, cardialgia a saburra, colica flatulenta post sedatum dolorem, ischiade ab spargano-  
si, vertigine stomachica, syrigmo a ventriculo, hypocondriasi pituitosa, asthmatica, boulimia ver-  
minosa, ephemera nauseativa, lactea, synocho scor-  
butica, amphimerina paludosa, biliosa, melœna prima Hipp., vomitu a saburra, lienteria scorbu-  
tica, ptyalismo scorbutico, apthoso, flatulentia in-  
fantili, dysodia stomachali, ascite, singultu a gu-  
la, vel ab acrimonia, tremore a saburra, tussi sto-  
machali; febribus intermittentibus, aliisque mor-  
bis.

Ad mediocria purgantia revocantur clysteres, & subpositoria. Clysterum actio in intestina crassa primario exseritur, secundario, & per consensum in tenuia, & in partes iisdem intestinis adjacen-  
tes; quare cum per eosdem intestina immediatæ a

vitiosis humoribus expurgentur, hinc est, quod in alvo adstricta, in dolore colico, in ileo, & aliis intestinorum morbis frequentes usurpentur. At ratione effectuum, quos praestant secundo, injici solent in intestina, ut partes cum ipsis consentientes, & aliquo modo adnexas juvent. Sic ex. gr. magnus est eorum usus in dystocia, subpressione lochiorum, adfectibus renum, stomachi, denique in casibus illis omnibus, in quibus vis, & sapor ingratus purgantium ferri ab aegris non potest.

Parari autem solent clysteres ex diversis liquoribus, scilicet ex decoctionibus herbarum, aliorumque simplicium, sero lactis, jure tenui, vel pingui, ex oleis &c. in quibus res aliae dissolvuntur ad stimulandum, ut saccharum rubrum, sal commune, sal gemmae &c. Interdum etiam parantur clysteres ex variis liquoribus pro diversorum morborum, & causarum ratione, & juxta varios scopos, & usus. Sic in impedita ac denegata libera cibos adsumendi facultate per atrociores gulae, linguae, faucium, ac ventriculi morbos, tumores, paralyfes, inflammationes, ulcera, vulnera &c. parantur clysteres ex jure pingui carnis vitulinae, bubulae tenerae, aginae, & hœdinae, pulli gallinacei, vel ex cremore ptisanæ hordeaceae, amyli, panis, lenticulae, ovis forbilibus, lacte, & medullis diversorum animalium, ut corpus alimento fraudatum paulisper reficiatur, ut primus docuit *Celsus*, ac deinde *Caelius Aurelianus*. Sic in febribus intermittentibus clysteres injiciuntur ex peruviani corticis decoctione parati. Sic etiam in hysteria parantur clysteres



steres ex decoctione matricariae, pulegii, rutae &c. quibus asa foetida, vel galbanum admiscuntur &c.

Subpositoria demum, quae ad alvum excitandum adhibentur, ex variis rebus parantur; scilicet melle ad ignem inspissato, cui pulveres salini irritantes adsparguntur. His intestinum rectum stimulat, ejusdem fibrae proinde contrahuntur, & contractione ad colon usque propagata latentes in eo foeces ad inferiora protruduntur. Quare clysteribus quandoque sufficiuntur subpositoria, ubi praesertim clysteres ipsi non recte operantur, aut statim rejiciuntur. Neque solum ad evacuandum, sed & ad revellendum adhiberi solent; atque hinc est, quod magno sint usui in adfectibus soporosis.

## C A P U T X I V.

### DE EMETICIS.

**E** Metica, seu vomitoria actionem exserunt suam perpetuo stimulo, quo musculares fibrae mediae carnosaeque ventriculi tunicam constituentes adficiuntur, & ad violentas, & minime ordinatas contractiones sollicitantur; nimirum emetici stimulo inferiores ventriculi fibrae contrahuntur, vim faciunt adversus superiores, & validiori a musculis abdominis intentius contractis excitata respiratione viscera imi ventris versus diaphragma

vehementius urgentur, & materiae ventriculo contentae per oesophagum protruduntur. Stimulus autem, quem emetica muscularibus inferunt ventriculi fibris, tum a viribus mechanicis, tum a physicis proficiscuntur. Ad mechanicas vires revocantur mechanica faucium irritatio, quae ob continuitatem oesophagi cum ventriculo ad hujus usque substantiam propagatur, item nimia distractio fibrarum carnearum ventriculi orta ex. gr. a nimia ingoſtorum copia, ab oleosis; pinguibus, & aquosis praesertim si calida, & magna copia hauriantur; quippe stomacho nimis gravato ingesta stimulo sunt, unde profluit irritatio ventriculi, ut proinde illius fibrae carnae ad moleſtam illam sensationem, ut partibus omnibus solemne est, eexecutiendam spasmodice contrahantur. Quod pingua vero, & alia hujusmodi laxantia cum ea sinistrum orificium laxent, non sic vero dextrum, atque ita quandam roboris inaequalitatem inducant in fibras ipsius ventriculi, utique inferiores earundem fibrarum partes validius virtute sua, quae non adeo infracta est, se se contrahentes, superioribus praevalent, ex quo efficitur, ut earum motus invertatur, & stomacho contenta ejiciantur.

Phyſicis autem viribus agunt medicamenta nauseam moventia, item imaginatio, & ingrati saporis perceptio; ab his enim turbato spirituum motu, ordinatoque in ventriculi fibras influxu spasmodicae illae contractiones vomitum moventes excitantur. Phyſicis etiam viribus operantur quae ob nimiam dexteri orificii distensionem impedita, quominus elabantur e ventriculo, ibi con-

rum-



rumpuntur , & sic corrupta vim adquirunt stimulantem . Phycis tandem viribus agunt remedia , quoties illis cum stomachi fibris heterogeneitas intercedit ; exinde enim fieri debet , ut illæ in contractiones adigantur . Hac vi heterogeneitatis vomitum movent ipecacuanhæ radix , vinum emeticum , gilla vitrioli , & similia .

Emeticorum actio non in ventriculum modo , & quæ in ipso continentur , sed & in viscera imi ventris , & thoracis exseritur . Cum enim emetica ipsa quapiam sui parte ad canales usque sanguineos pervadant , peculiarem utique solutionem excitabunt in sanguine , ex quo determinatæ materiæ per meatus ductusque ventriculi , & vicinarum partium secermentur , & partim per canalem intestinale elabentur , partim hærebunt in ventriculo , vel e duodeno in ipsum regurgitabunt , novamque ad vomitum materiam , & irritationem adferent .

Emetica non secus ac purgantia in tres classes dividuntur , lenia scilicet , mediocria , & vehementia . Lenia ut plurimum nauseam tantummodo movere solent ; hinc eorum actio juvanda est vel digito , vel penna oleo inlita , & in gulam inmissa . Hujusmodi remediis adnumerantur aqua tepida vel simplex , vel mellita , oleum amygdalarum dulcium ad plures uncias propinatum , jus pingue copiose haustum , & alia his similia , quæ lubricando , & laxando operantur .

Mediocria præter nauseam movent etiam vomitum , licet non vehementissimum . Hujus generis sunt radix asari , ipecacuanhæ , oxymel scylliticum , sal vitrioli , gilla *Teophrasti* &c.

Vehementia sunt radix hellebori , pulpa colocynthis , radix enulæ , nicotianæ folia , radix cucumeris sylvestris , medicamenta omnia ex antimonio , & mercurio parata .

Emetica indicantur a pravis humoribus ventriculum , & vicinas vias obsidentibus , ut conligi potest ex pravo oris sapore , foeditate , amaritie , cibi fastidio , nausea , adpetitus dejectione , ructu , morfu ventriculi , dolore capitis , vertigine , tenebris ob oculos subinde obortis , lenteris &c. maximeque prosunt in vomitu pituitoso , flatulentia nidorosa , præsertim vero in cardialgia a saburra , quoties adest cum cardialgia oris amaror , & capitis vertiginosa gravitas sine tensione epigastrii , ut & in cephalalgia stomachica ; docet enim Hipp. aph. 17. sect. 4. quod si sit cibi fastidium , cardialgia , oris amaror , & vertiginosa capitis gravitas , emetico opus est ; Conveniunt item in gastrodynia saburræ , apoplexia pituitosa , epilepsia stomachica , dysenteria verminosa , tryphosardonico , anorexia a saburra , in febribus , quæ cum syncope , singultu , aut vertigine incipiunt , ut & in febribus , vel aliis quoque morbis , qui cum magna anxietate invadunt , & ægri inquieti sunt , loco stare nesciunt , & hinc inde per lectum agitantur , denique in morbis fere omnibus , in quibus purgantia convenire supra dicebamus . Hæc autem in emetici locum substitui poterunt , si illius usus aliunde vetetur .



## CAPUT XV.

## DE DIURETICIS .

**M**edicamenta diuretica , vel urinam promoventia diversa ratione actionem suam exserunt . Alia quippe materiam in renibus secernendam ad sanguineos canales advehunt , ut aqua simplex , aquæ minerales , subtilissimum serum lactis , quod ex lacte ebutyrato per manicam *Hipp.* separatur , & vinum album , sed tenue ; alia vero in data aliqua sanguinis substantia peculiarem excitant solutionem , qua urinosi fluidi quantitas adaugetur , idque , sulphura in primis efficiunt , alia denique stimulum inferunt renalibus tubulis , quo ipsius urinosi liquidi secretio sollicitatur , quod præ ceteris sales omnes abunde præstant . Observandum est autem illud quandoque contingere , ut licet in quampiam sanguinis substantiam solutio inducatur non tamen urinæ fluxus inde proveniat , sed hæc potius sub forma sudoris effluat , vel insensibilis perspirationis . Atque hinc est , quod nonnulla remedia , & præsertim sulphurea , quæ diureticis adnumerantur , optatum finem plerumque non attingant , ut propterea ad fluxum urinæ promovendum sales omnes , & quidem alkalici tam fixi , quam volatiles aptiores esse videantur . Acida item omnia sive ex vegetabilibus , ut ex aceto , malis citreis , vel medicis &c. Sive ex mineralibus de-

prom-

promta , qualia sunt spiritus nitri , sulphuris , vitrioli &c. urinas potenter cient . Tandem in salibus falsis , sive mediis magna vis inest ad movendas urinas , ut experimur in sale marino , & gemmæ , in tartaro vitriolato , tartaro solubili , arcano duplicato , terra foliata tartari , & præsertim in nitro , quo præterea sanguinis fervor temperatur , ejusque motus aliquantulum retardatur . Patet autem ob hujusmodi retardationem urinam a reliquis partibus recedere oportere , ad renales subinde porulos advehi , atque adeo ejusdem secretionem promoveri . Ab hoc sale nitroso repetenda est virtus diuretica nonnullorum simplicium , quæ inter refrigerantia recensentur , quod ab ea excedens humorum motus compescatur , nimiusque fervor temperetur . Hujus generis sunt portulaca , melissa , nymphoea fragaria , parietaria , & fortasse etiam urtica .

Præter hujusmodi sales alii etiam occurrunt in nonnullis mistis , qui vocari possunt acres . Tales sunt qui plantis insunt antiscorbuticis , aliisque adfinibus , ut nasturtio aquatico , cochleariæ , & cepis , quæ præterea nonnihil continent subtilis olei , ut in raphano , & similibus percipitur . Subtilis , & blandi simul cujusdam salis genus reperitur in radice graminis . Paulo acrior est , & activior vis in sale , qui ex combustis genistæ , & fabarum radicibus eruitur . Adhuc etiam activior perhibetur vis salis , qui ruscho , eryngio , pimpinella , saxifraga , hononide , eupatorio , asparago , capillo veneris , radicibus raparum , & floribus violarum , aliisque similibus continetur . At vero ex animalibus millepedes , & lumbrici terrestres



stres maximam vim habent ad ciendas urinas ratione fortasse subtilioris cujusdam salis, quod nonnulli referunt ad nitrosum, quo tamen videtur longe penetrantior. Idem omnino præstant cantharides, sed urinarias vias adficiunt, & vehementem constantemque tensionem excitant in organis, quæ generationi destinantur. Conchæ omnes ut perlarum, ostrearum, ac præterea lapides, vel oculi cancrorum, lapides perlarum, testæ ovorum, cancrorum, limacum abundant sale tum nitroso, tum falso, quibus urinam movent. Quod si acido aliquo vegetabili ex: gr. citri, aceti, vel alio simili saturantur, tunc vis contenti in iisdem salis aliquantum infringitur, atque ex ea admistione genus quoddam salis medii componitur, quo excedens humorum motus compescitur, & urinæ fluxus idcirco promovetur.

In his autem omnibus nihil sulphuris sali admistum videtur. Sunt vero & alia diuretica, in quibus sulphureæ partes salinis admistæ reperiuntur, ob eamque admistionem efficitur, ut diuretica illa calidorum diureticorum nomine vocari soleant. Hujus census sunt hedera terrestris, veronica, radix apii, fœniculi, cerefolii, hypericon, semen dauci, gummi ammoniacum succinatum, terebinthina, balsamus ex copayba &c.

Tandem emollientia, & lubrificantia ad promovendam urinæ excretionem interdum valent, cum scilicet renum compages nimis adstricta est. Talia sunt althæa, malva, borrago, violaria, semen malvæ, pesillii, & mucilagines ex iisdem confectæ, olea ex seminibus blandis, & præsertim ex amygdalis parata. Emulsiones etiam ex illis fa-

Etæ inter medicamenta diuretica recenseri possunt, quod convulsivas, & dolorificas renum, & vesicæ contractiones laxent, ac demulceant, atque ita urinæ subpressionem tollant. Balnea quoque, inunctiones, & hujusmodi præsidia extrinsecus adhibita aptissima sunt ad subpressum urinæ fluxum revocandum.

Diuretica generatim conveniunt, cum sero imbutæ sunt partes nervosæ, aut lenta pituita infarctæ vasa, quod suadebunt subpressi serifluxus, facies pallida, frigus, mollities, temperamentum pituitosum, adipisia, ætas puerilis, aut senilis, constitutio scrophulosa, cachectica, conditio vitæ, qualis est lotricum, balneatorum, piscatorum, coriariorum, & dispositio hæreditaria.

## C A P U T X V I.

### DE DIAPHORETICIS, ET SUDORIFICIS.

**D**iaphoretica, & sudorifica ea omnia dicuntur medicamenta, quæ vim habent ad serosi liquidi guttulas effundendas, vel halituum copiam, sive insensilem perspirationem uberius movendam, scilicet determinatam materiam per sudorem, aut insensilem perspirationem de corpore eliminandam. Cum autem uberior hæc materiarum evacuatio haberi non possit, nisi simul intendatur hæmatosis, illud consequitur, eam esse diaphoreticorum, & sudorificorum medicamentorum actionem,

ut



ut hæmatosim ipsam efficiant vividiores. Sed intendi non potest hæmatosis, nisi major fiat phlogistica sanguinis materiæ evolutio, & acidæ partis regelatio; ergo diaphoretica, & sudorifica ea omnia dicenda erunt medicamenta, quæ facultate donantur materias illas regelandi. Diaphoretici igitur sunt sales omnes volatiles ex. gr. viperarum, sanguinis humani, cornu cervi &c. sales item fixi, & plantæ, quæ alkali abundant, ut scordium, carduus benedictus, aliæque amaricantes; hoc uno tamen discrimine, quod sales ad ciendas urinas, plantæ vero ob admisionem partium volatilium ad sudorem movendum aptiores esse videantur. Præterea alkalica, & quæ vulgo dicuntur absorbentia, ut lapis bezoar, oculi cancerorum, cornu cervi ustum philosophice præparatum, antimonium diaphoreticum, chelæ cancerorum, & hujusmodi testacea virtute pollent diaphoretica. Ita etiam sulphurea omnia, & oleosa destillata sudorificis adnumerantur; hujus autem generis sunt camphora, & plantæ, quæ subtili oleo abundant, ut aromaticæ. Pariter sudorifica virtute donantur lignum sassafras, salsa parilla, guajacum, radix chinæ, juniperus, ac demum potiones omnes calidæ copiosius adsumtæ.

Sudorifica generatim prosunt cum lenta puita infarcta sunt vasa, & nervosæ partes imbutæ sero, quemadmodum supra diximus de diureticis. Ergo maxime conducunt in ostocopo a gummatibus, hysteralgia ab sparganosi, ischiade syphilitico, arthritide, podagra, rachitide, & similibus morbis.

## CAPUT XVII.

## DE CETERIS EVACUANTIBUS.

**I**Nter evacuantia medicamenta, quæ hic nobis considerata sunt, primo occurrunt expectorantia, quæ scilicet redundantes, & excrementitias pulmonum materias per arteriolas lymphaticas, & ductus adiposos e sanguineis canalibus evacuant. Horum autem nec unum est genus, nec una agendi ratio. Alia enim inlato pulmonum fibris stimulo, & vehementiori excitata tussi uberem materiæ viscidæ hærentis in bronchiis evacuationem promovent, cujusmodi sunt infusiones veronicæ, scordii, scabiosæ, terra foliata tartari, gummi ammoniacum, myrrha, pulvis radicum enulæ, iridis florentinæ, oxymel scylliticum, & similia; Alia vero eidem materiæ tenuitatem, & acredinem, atque adeo stimulandi vim adimunt, & spasmodicam tollunt pulmonum contractionem. Talia sunt succus radicum liquiritiæ, florum violarum, malvæ, papaveris sylvestris, oleum amygdalarum dulcium, cremor lactis, papaver albus, pilulæ de styrace &c. Primi generis medicamenta præ ceteris commendantur in asthma humorali, & stomachico hydrothorace &c. secundi vero generis in rheumate cum tussi acris, sicca, dolore vivido, pyrexia, pervigilio &c.

Actio medicamentorum errhinorum evacuat-

tio-



tionem scilicet mucosi feri ex membrana narium schneideriana promoventium inde repetenda est, quod membranæ illius canales aliquando laxent ita, ut sanguis uberius per laterales illius canaliculos, & porulos majorem serosæ, & mucosæ materiæ copiam emittant, quod præ ceteris præstat aqua, cui malva cocta fuerit, ex manu per nares adtracta alterne, & per os emissa, unde totum systema pituitosum laxatur, nec dolor capitis unquam excitatur. Aliquando vero canales illos invitant, ut propterea sanguis velocius excurrat, & uberem fundat ejusdem serosæ, & mucosæ materiæ quantitatem. Hujusmodi sunt majorana, thymus, satireja, summitates origani, flores laserpitii, sal volatilis ammoniacus, vitriolum album, pulvis euphorbii, hellebori albi, variæ species tabaci &c. Cum igitur hujusmodi medicamentorum ope pituita lenta incidatur, adtenuetur, & educatur, mucus tenaciter impactus fortiter excutitur, & caput gravatum levatur, hinc est, ut hæc ipsa medicamenta in catharro, coryza, cephalalgia, vertigine, stupore sensuum, affectibus soporosis, lipothymia, apoplexia, paralyfi, dystocia, exturbando fetu in utero matris emortuo, secundinis tenacius ipsimet utero adherentibus expellendis, aliisque gravissimis morbis commodissime adhibeantur, ut *Hippocratis*, *Galenii*, *Hoffmanni*, aliorumque Medicorum auctoritate, & ratione ipsa confirmatur. De tabaco hic adnotabimus inmodicum illius usum a sapientissimis Medicis *Hoffmanno*, *Sennerto*, *Ettmullero*, *Schneidero*, *Newmanno*, *Trillero*, aliisque multis damnari, cum inde gravissima maia, & pericula

mc-

metuenda sint. Sævissimum morbum ab usu nimio tabaci hispanici inlaturum refert Cl. *Trillerus*. Quamvis autem inmodicus illius usus unicuique obesse possit, maxime tamen nocet asthmaticis, plethoricis, hypocondriacis, melancholicis, natura ficioribus, & alvi adstrictione laborantibus, sanguinem vel ore screantibus, vel nare reddentibus, epilepticis, cardialgia, & ardore stomachi adfectis, herniosis, phthisicis, tussiculosis, pulmonum, & oculorum vitio quocumque conflctatis, fœminis gravidis, & ad abortum proclivioribus, uteri demum, vel sedis procidentia obnoxiiis.

Quoad medicamenta sialagoga; vel salivationem promoventia certum est non unam in illis esse operandi rationem. Alia quippe nimiam salivalium tubulorum contractionem, & spasmus infringunt, atque ita liberiores efficiunt salivæ fluxum; alia eosdem tubulos stimulo adficiunt, quo major salivæ copia a sanguine promptius separatur, & majore celeritate per tubulos illos fluit, cujusmodi sunt radix pyrethri, imperatoria, folia tabaci, nitrum, sal gemma, alumen, piper, masticæ &c. Alia demum viscosas sanguinis partes dissolvunt, & in materiam redigunt salivali fluido analogam, quæ proinde in glandulis salivalibus a sanguine uberius secernitur. Hujus generis sunt litus mercurialis, mercurius dulcis, turbith minerale, arcanum corallinum, æthyops mineralis, cinnabaris tum nativa, tum ex antimonio parata, & alia permulta.

Denique varium etiam, & multiplex est genus eorum medicamentorum, quæ evacuationem per menses excitant in fœminis. Hanc enim modo



do promovent quæ canales deobstruunt, ut radices aperientes brionia, aristolochia, flores chrysanthemi, rhabarbarum &c. modo quæ vasa laxant spasmus constricta, ut millefolium, arthemisia, crocus, castoreum, modo quæ sanguini fluiditatem suam, & vasculis uterinis tonum restitunt, ut aromatha, myrrha, rosmarinum, pulegium, fabina, melissa, satureja, baccæ lauri, & juniperi, sales volatiles oleosi, limatura ferri, & omnia ex eodem metallo parata. Horum remedium maximus est usus in cephalalgia catameniali, palpitatione, gastrodynia, arthritide chlorotica, anasarcate a subpressione, ascite ab oppilatione, aurigine frigida ab obstructione, pica chlorosantium, & similibus.

## C A P U T X V I I I.

### DE MEDICAMENTIS EX CHIRURGICO FONTE DESUMTIS.

**Q**Uæ infirmo corpori parantur præsidia ab opere manuum, sive a chirurgia sunt venæ sectio, vesicatoria, cucurbitulæ, frictiones, hyrudines, fonticuli, setacea, sinapismi, unctiones, punctiones &c. præterea repositiones ossium, deligationes, incisiones, ulcerum absterfiones &c. Nobis vero ea dumtaxat opera manuum contemplanda proponimus, ex quibus peculiaris aliqua

mutatio in machinam animale[m] universam inducitur.

Primum itaque missio sanguinis, quam Græci phlebotomiam vocant, est venæ, vel arteriæ incisio, quæ vel ope lanceolæ, vel vi herudinum instituitur. Loca, per quæ mittitur sanguis, sunt venæ brachii, cephalica nimirum, media, & basilica, venæ manus salvatellæ dictæ, venæ linguae, quæ vocantur rhaninæ, venæ pedum saphe-næ vocitatae, venæ sub poplite, quæ dicuntur popliteæ, venæ in extrema ora intestini recti posita hæmorrhoidales nuncupatae, venæ jugulares, vena frontalis, tandem arteriæ temporales &c. Varia autem præstat missio sanguinis in animali œconomia. Profecto si dum excedens sanguinis quantitas motui cordis, & arteriarum valide opponitur, atque adeo non levis resistentia progressivo motui ejusdem sanguinis objicitur, hujus quantitas per phlebotomiam minuatur, resistentia illa insigniter decrescat oportet, & facilius celeriusque cordis ventriculi contrahantur. Cum autem minor sanguinis moles revertatur in cor, & parcius idcirco ad singulas corporis partes ipsemet sanguis amandetur, mutua solidorum, & fluidorum pressio minuetur, laxantur solida, vasa omnia liberius, & intentius contrahuntur, major habetur ex celeriore cordis contractione pulsationum numerus, sanguis demum, si eadem vi protrudatur, facilius & velocius fluit in ratione imminutæ resistentiæ. Plurima igitur comoda plethoricis obvenient ex phlebotomia. Et I. quidem spasmodicæ contractiones tolli debent, & peculiæ res humorum secretiones expediri, atque adau-  
geri.



geri. II. Ex inminuto sanguinis volumine, & ex celeriori ejusdem motu intensior fieri hæmatosis, ex majore vero adtenuatione inflammabilis substantiæ sanguinis augeri hujus liquidi fluiditas, & uberior nervei fluidi copia in nervos derivari, unde vitalis contractio, & robur singularum corporis partium intenditur, atque adeo vitiosa laxitas, debilitas, frigoris sensus, mentis languor, & alia hujusmodi incommoda remonentur. III. Ex aucta sanguinis fluiditate lentiores, & canalium sanguineorum infarctus resolvi, adeoque & profundior fieri respiratio. IV. Ex inminuta sanguinis ipsius quantitate, proindeque ex sublata minimorum canalium compressione, & ex intensiori facta hæmatosi urinæ fluxus promoveri, eademque fieri coloratio. Sane primus observavit *Hipp.* a sectione venæ difficultatem urinæ solvi, ut docet aph. 46. sect. 6. *Riverius* autem pluries observavit urinas, quæ ante phlebotomiam erant aquæ, instituta phlebotomia coloratiores effluxisse. V. Ex liberiori, & celeriori reddita circulatione visciditas, & cohærentia lymphaticæ sanguinis substantiæ resolvi, & adtenuari, vasorum infarctus proinde tolli, atque adeo liberior, & facilior fieri respiratio; siquidem vasorum, vel bronchiorum infarctus a fluidis diversæ visciditatis retardat, aut minuit respirationem in ratione visciditatis, ut ostendit *Sauvagesius*. VI. denum ex velociori facta circulatione, & liberiori, ac profundiori respiratione, auctaque propterea hæmatosi sanguis in vasis hærens evolvi, & regelari, atque inde recentis Chili regelatio promoveri, & nutriens humor uberius, & laudabilius parari, ex

relaxatione vero solidorum vasa facilius repleri. Unde nil mirum, si incipientem corporis maciem interdum phlebotomia sustulerit, corporisque moles increseat a missione sanguinis, ut præ ceteris observarunt *Dodæctus*, & *Jamesius*.

Quod si plethora fuerit spuria, quoniam misso sanguine cordis vires infringuntur, minor utique fiet illius velocitas; hinc languidiori facta hæmathosi parcior fiet evolutio materiæ inflammabilis, adeoque rarefactio sanguinis minuetur, scilicet hic fluiditatem sibi propriam acquirere, nimius corporis æstus defervesceat, fibrarum rigiditas, & contractio refrangetur, morbi tandem omnes, qui ex spumoso sanguinis lentore profluunt, longius avertentur.

Ex dictis intelligitur quamlibet missionem sanguinis vel simpliciter evacuatoriam esse, vel simul revulsivam, nunquam vero derivativam. Evacuatoria dicitur, quatenus fluidorum in vasis humani corporis hospitantium molem inminuit, revulsiva, quatenus conjunctam habet aliorum vasorum, ex quibus sanguis exprimitur, constrictionem, atque ita in vasis sic contractis minor est fluidi copia, quam ferat nativa eorumdem diameter.

Licet autem certum sit ex demonstratis phlebotomiam in pluribus casibus maxime salutarem esse, eam tamen nonnulli tum ex veteribus, tum ex recentioribus Medicis, ut *Erasistratus*, *Paracelsus*, *Van-Helmontius*, *Sontekoe*, alique damnarunt utpote ancipitem, & periculosam, in eaque sententia fuerunt solam abstinentiam minuendæ plethoræ sufficere posse. Sed cum tenuiores dumtaxat humores, non vero pars crassa, & rubra sanguinis, quo



quo vasa distenduntur, excretionum opē minuuntur, & humores omnes majorem ab abstinētia contrahant acrimoniam, statuendum est Medicorum illorum sententiam nullo sat valido inniti fundamento, & nihil phlebotomia valentius esse ad morbos generatim vel sanandos, vel prævertendos.

Scarificationes cum æquivaleant phlebotomiæ, quandoquidem illarum opē quantalibet copia sanguinis detrahi potest ejusdem ponderis, & consistentiæ cum eo, qui e venis educitur, quemadmodum certissimis experimentis innotuit, sequitur, ut ab illis ii omnes effectus produci debeant, qui a missione sanguinis proficiscuntur, tanto magis, quod ob stimulum nerveis canalibus, fibrisque cutis inlatum ab incisione, innumerabilium pene dixerim nervulorum contractiones cordis frequentius exserantur. Præclara in hanc rem habet *Celsus* lib. 2. cap. 11. Sic enim ait *Usus cucurbitulæ præcipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhausti ad confirmandam valetudinem satis est. Adcedit quod cum ægri vires per scarificationes minus infirmantur, ex Keilii tentaminibus, hæ semper adhibendæ sunt in morbis acutis, quoties ægri vires phlebotomiam, & promptam sanguinis evacuationem pati non possunt; nam ut Celsus ibidem docet, id auxilium ut minus vehemens, ita magis tutum est; neque unquam periculosum est, etiam si in medio febris impetu, etiamsi in cruditate adhibetur; ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena præceps periculum est, aut nobili in parte corporis vitium est, etiamsi huc potius confugiendum est;*

*cum eo tamen, ut sciamus, hic ut nullum periculum; ita levius præsidium esse, nec posse vehementi malo, nisi æque vehemens auxilium succurrere. Quæ sane præcepta cum experientia mirifice consentiunt. Sæpe enim adfectus capitis phlebotomia intendit, leniur contra, minuuntque scarificationes; idque ex eo proficiscitur, quod sinus laterales duræ matris citò levent, ut docet magnus ævi nostri Professor.*

Minor quoque est jactura virium ab hirudinibus, cum ex minimis arteriis, & venulis sanguinem educant. Quod spectat ad medicamenta superius descripta phlebotomiæ repetitæ indicantur in morbis, quos induxerit plethora, quod judicatur ex pulsu forti, calore, rubore, levamine a phlebotomia, incremento morbi a crapula, a subpressis catameniis, phlebotomiis aduetis, & retenta perspiratione, adeoque feliciter adhibentur in hæmatemesi, hæmorrhagia, cephalalgia, vertigine, colica, amaurosi, anæsthesia, epilepsia, paralyfi, pleurodyne, ephemera, synocho plethorica, colica phlogistica, pyrosi a phlogosi, apoplexia sanguinea, asthmate plethorico, plethorico item ephialte, synocho sanguineo, hystericalgia ab sparganosi, ischuria nephropletorica, otalgia inflammatoria, angina, peripneumonia, pleuritide, aliisque morbis inflammatoriis. Cucurbitulæ vero scarificatæ magno usui sunt in morbis oculorum, aurium, amygdalarum, uvulæ, in apoplexia, & adfectibus comatosis. Denique insignis est hirudinum usus in hepatis inflammatione, & ecclampsia plethorica, & magnus etiam censetur in morbis hypocondriacis, si hæmorrhoidalibus vasis adponantur. At revocari in dubium potest, utrum hiru-

dines



dines in morbo hypocondriaco sanguinem educant ab adfecta parte, eamque proinde levent; quippe sanguinem exsugunt dumtaxat ex venis hæmorrhoidalibus externis, quæ nihil, vel parum communicant cum vasis intestinorum, mesenterii, & venæ portæ, ubi potissimum spasmodicarum hypocondriacarum adfectionum sedes est.

Vesicatoriorum usum in eo consistere arbitrantur nonnulli, quod serum educant e massa sanguinis, ejusque quantitatem inminuant. At si hæc sola esset actio, & virtus hujusmodi remediorum, illud consequeretur, ut iidem effectus produci etiam deberent ab æquali seri copia per urinam de corpore secedentis, quod tamen cum experientia minime consentit. Alii eorundem utilitatem exinde repetendam censuerunt, quod serum ipsum revellant a peculiari aliqua corporis parte, vel insigni organo, ubi excedens illius quantitas, & vitiosa qualitas molestiam, & noxam adferebat, obstructionemque, & inflammationem excitabat. Verum licet ita se res habere possit, non ideo tamen putandum est vesicatoriorum actionem hisce finibus contineri, sed ad sanguinem usque propagari demonstrat ratio. Et sane cum vesicatoria ex materiis componantur, quæ substantiam phlogisticam maxime regelatam indolis ammoniacalis acerrimæ complectuntur, eaque adtractionis vi in sanguinem advehatur, ejusque componentibus admisceatur, ut evincitur ex mictu cruento, quo nonnulli ex applicatione cantharidum, aut vesicatoriorum tentari solent, illud fieri debet, ut homogeneas sanguinis substantias adtrahant, & quampiam in illis excitent solutionem, adeoque lympham, & crassa-

mentum vi causæ morbosæ arctius cohærentia solvant, & adtenuent. Hanc autem solutionem, & adtenuationem adhuc majorem fieri deprehendes, si ad stimulum, & irritationem advertas, quam nerveis canaliculis inferunt vesicatoria. Cum enim stimulo illo elasticitas, & motus intendatur nervei fluidi, vibrationes cordis crebrius exserantur, fluidorum velocitas augeatur, fibrarum denique tonus roboretur, promoveri utique hinc debet sanguinei laticis solutio, & adtenuatio, ut alibi etiam docebamus. Neque hæc sanguinis adtenuatio, quæ a pulvere cantharidum proficiscitur, revocari in dubium ex eo potest, quod nullam vim dissolventem in ipsomet pulvere deprehenderit inlustri *Verattus*. Licet enim experimenta ab eodem instituta suo stent robore, scilicet revera a pulvere cantharidum sanguis rara serosi fluidi secretionem concreascit, serum vero densius efficiatur, dum in quiescente fluido tentantur experimenta, non inde tamen sequitur, ut nulla sanguinis solutio, & adtenuatio subsequi debeat, etiam dum cantharidum pulvis circulanti liquido admiscetur.

Vesicantia optimo sæpe cum eventu in pluribus morbis adhibentur, sed præsertim in lethargo a febre, caro febricosa, apoplexia pituitosa, hemiplegia, & paralyfi serosa, ophtalmia humida, pleuritide post subpressam sputationem, & in lenta variolarum eruptione, aut ab imbecilli natura nimis retardata; ea siquidem hoc stimulo cantharidum sic opportune adjuncta ab ipso gravi variolosæ materiæ onere, quo jacebat oppressa, tandem feliciter liberatur.



Frictiones stagnantem sanguinem, aut lente-  
 circulantem admotum sollicitant versus cordis ma-  
 chinam, cujus proinde motus invalescit ita, ut  
 sanguis ipse in omnia corporis vasa velocius urge-  
 atur. Hinc hæmatosis vividius procedat necesse est,  
 & vires vitales intendantur. Frictiones igitur ut  
 & corporis succussiones maxime proderunt in nimia  
 fibrarum debilitate, itemque in syncope a pletho-  
 ra, nimiaque cordi opposita resistantia, in cata-  
 phora, comate, præsertim si ad frictiones pannus  
 laneus penetranti aliquo, & volatili liquido, ut  
 vapore mastices impregnatus adhibeatur. In Syn-  
 cope prodest etiam aqua frigida externæ cuti ad-  
 sperfa; per hanc siquidem adspersionem contra-  
 huntur, venæ, & contentum fluidum versus cor de-  
 terminatur, quod proinde irritetur necesse est,  
 moveatur, & vi contractum resistantem pulmonem  
 agitet.

Quod adtinet ad cucurbitulas certum est tu-  
 morem partium, quibus illæ adplicantur, exinde  
 oriri, quod ab inminuta aeris compressione aufe-  
 ratur æquilibrium resistantiæ in vasis cucurbitulæ  
 subpositis, quæ proinde dilatantur, & humoribus  
 replentur. Certe in vacuo Boyleano non alia de  
 causa tument animalia, quamquod pondus aeris  
 suctione inminuti minus resistat vi fluidorum, qui-  
 bus vasa corporis dilatantur, ut propterea vasa  
 ipsa tunc peccent defectu æquilibrii. Cucurbitula-  
 rum adpositione aut revellitur sanguis, aut eo ad-  
 trahitur, ubi adponuntur cucurbitulæ. In hunc fi-  
 nem præcipit *Hipp. aph. 50. sect. 5.* ut mulieri  
 menses si quis cohibere velit, cucurbitam quam  
 maximam ad mammas adponat. In eundem pari-  
 ter

ter finem cucurbitulæ pedibus , furis , coxis in hæ-  
morrhagia narium , & in sputo sanguinis feliciter  
adplicantur. Adcedit, quod cum ex dilatatione ,  
seu distractione vasorum , & simul canalium ner-  
veorum irritatio aliqua in illis excitetur , necesse  
est ut sanguinis motus per reliqua etiam vasa ce-  
lerius absolvatur , ex quo plurima comoda in a-  
nimalem æconomiam derivantur.

Similia fere dicas de fonticulis , fetaceis , fu-  
stigationibus &c.

## C A P U T X I X.

### DE MEDICAMENTIS EX DIÆTETICO FONTE DESUMTIS.

**D**E ratione , qua poculentis , & esculentis uti  
debeamus ad morbos ab animali machina  
longius removendos in secunda institutionum par-  
te fuse differuimus. Superest igitur , ut nonnulla  
hic de cibo , & potu tanquam remedio in mor-  
bis adjiciamus. Itaque morbi omnes , ut alibi di-  
ximus , ad acutos , & chronicos revocantur , & u-  
trique diversam victus rationem expostulant. Præ-  
clara de ratione victus in acutis habent *Hipp.* &  
*Galen.* quos proinde adire debent tyrones Medici ,  
seduloque evolvere. Generatim victus in acutis te-  
nuis sit oportet , vel etiam tenuissimus , is nempe ,  
qui diversis acutiei morbi gradibus respondeat , ne  
coctio materiæ morbosæ , atque adeo solutio mor-  
bi



bi aut retardetur, aut omnino etiam impediatur. Habeatur item oportet in alimentis exhibendis ratio temporis, quo morbus maxime viget. Et quidem, ut docet Hipp. quibus statim vigor est, his statim tenuis victus exhibendus est, quibus vero vigor posterius his ad illud, & paulo ante illud tempus, subtrahendus est. Antea vero mitius ager victu tractandus est, quo durare possit. Habenda tamen est ratio temperamenti, consuetudinis, aliarumque circumstantiarum, sed præsertim virium ægrotantis, cum revera virium cognitio permagni in medicina momenti sit ad diætam, & remediorum præsertim vehementium usum præscribendum.

Potum vero quod adtinet cum in morbis acutis interdum sanguis magnam contrahat visciditatem, & lentorem inflammatorium, hæreatque proinde in aliqua corporis parte, ut evenit in morbis inflammatoriis, interdum vero fluida animalia magnam contrahant elasticitatem vi ejus, quam concipiunt, inflammationis, quin tamen hæreant in vasis, ut potissimum contingit in febribus ardentibus, ita in priore casu maxime proderit nixosis uti, aliisque potionibus diluentibus, & lentorem illum noxium incidentibus, in altero autem adhibere potum ex acidi vegetabilibus, & mitioribus mineralibus paratum, quo uno & refrigerari corpus, & excedens fluidorum rarefcentia, & elasticitas infringi possit. Illud etiam contingit in morbis itidem acutis, ut corporis, & præsertim cordis vires supra modum langueant, torpeantque, & ea insuper fiat humorum constitutio, ut in visceribus nobilioribus cumulentur, hæreantque, & inflammationes in illis excitent maxime periculo-

fas

fas, ut accidit in febribus malignis, in quibus parum, vel nihil recedere pulsus a naturali statu percipitur, si aliqua illius debilitas excipiat. Hoc autem in casu ea exhibenda sunt esculenta, & potulenta, quæ aliquantulum nutrant, conroborent, exstimulent, ut jacentes vires quantum fieri potest intenduntur. Ad nutriendum igitur præscribi poterunt ejus indolis alimenta, quæ facile digerantur, ut decoctiones avenæ, hordei, juscula animalium juniorum, quibus, juxta methodum Cl. *Hænnii*, addi potest succus malorum citreorum, aut cremor tartari. Ad conroborandum vero nihil opportunius esse potest aliqua, sed plurimum diluta vini portione. Denique ad exstimulandum maxime proderit decoctiones hordei cum adfuso melle, & cardiaca, & decocta ex radicibus, & plantis aromaticis exhibere, tanto magis quod observante *Pringlio* substantiæ aromaticæ antiseptica virtute donentur.

In ceteris vero morbis acutis, in quibus diversa est solidorum constitutio, diverso etiam modo se gerat Medicus necesse est relate ad cibum, & potum. Ita si solida laxiora fuerint, quam postulare videatur status naturalis, utique cibus, & potus ejus esse debent naturæ, ut eorundem elaterem intendunt. Si vero ultra modum tensa sint, & crispata, ea præscribenda sunt esculenta, & potulenta, quibus excedens illa tensio, & crispatura retundatur.

Ut autem nonnulla & de chronicis morbis disseramus, animadvertendum est ex illis alios ab humorum visciditate, & cruditate, simulque morbosa solidarum partium laxitate proficisci, ut evenit



nit in morbis cachecticis , in quibus lente procedit hæmatosis , materia aquea plurimum abundat , & insignis adest solidorum atonia , oriri autem alios a putrida , & conrodente eorundem humorum indole , & constitutione , cui vitiosa solidorum omnium tensio , & crispatura conjungitur , ut in phthisibus observatur . In iis enim putrida quædam solutio , auctusque fluidorum motus ex validiori stimulo , quo cordis machina sollicitatur , acrem facit , & conrodentem fluidorum ipsorum indolem , sudores autem uberes , & conliquativi inditam solidis mollitiem destruunt . Quæ cum ita sint , illud consequitur , in priore morborum genere eam victus rationem tenendam esse , qua & intendatur hæmatosis , & motus nobiliorum organorum vividius excitentur , adeoque substantiis animalibus , aromaticis , & martialibus moderate inhærendum . Animales enim substantiæ sale suo ammoniacali solidas partes , ac præsertim cordis machinam exstimulant , proindeque in crebriores , intensioresque contractiones adigunt . Hinc fluidorum circuitus sollicitatur , sanctoriana perspiratio promovetur , & quantitas præsertim augetur secretionis urinæ , quibus sane omnibus fieri debet , ut sanguis nimiam exuat aqueæ materiæ copiam , & solida humore aqueo minus turgentia nativæ elasticitati roborique restituantur . Aromata vero & martialia utpote quæ phlogistica substantia donantur maxime regelata , plurimum valent ad phlogisticam , ut alibi diximus , partem sanguinis evolvendam regelandamve , & solida corporis exstimulanda , atque ad vividiores contractiones sollicitanda . Cavendum autem erit ab alimentis crassiss

sis, & farinosis, ut & ab iis omnibus, quæ difficile digeruntur.

In altero autem morborum genere ea exhibenda remedia sunt, quæ refrigerante acido plurimum abundant, ut & procedens putrefactio prævertatur, & morbosa salium volatilium indoles conrigatur, cujus generis sunt lac, serum, potus subacidi, vegetabilia, quæ materiam acidam continent plurimum regelatam, cremores orizæ, juscula ex ranis, testudinibus, omnia denique gelatinosa, & mucilaginosæ, ut nutritio, quam recentis chyli corruptio, aut secessus ipsius de corpore retardat, vel impedit, aliquo modo promoveatur. Et quidem in hæctica humorum resolutione gelatinas cum amygdalis dulcibus paratas, & mucilagines aliquoties in die adsumtas plus profuisse compertum est, quam cetera remedia, quatenus non solum nutriunt, & incrassant, sed & viscera constricta relaxant; adeo verum est respiciendum semper esse ad solidas partes, ubi de conrigenda fluidorum indole cogitamus.

Quod si chronici morbi vel a tumore aliquo carcinomatoso, vel ab alicujus organi læsione profluxerint, tunc apto vitæ regimini, scilicet morbosæ causæ contrario insistendum est. Sic ex. gr. in tumore carcinomatoso inhærendum erit vitæ vegetabili, quo salium alkalinarum conrodens natura, & simul putrida fluidorum indoles retundatur. At in læsionibus organicis præsertim in aneurismate cordis, & præcordiorum maxime proderit lactariis vesci, & substantiis vegetabilibus, atque iis præcipue, quæ minimum habent salis acidi, aut alkalini, & a substantiis animalibus, vi-  
no



no, aromatibus, & similibus abstinere; uno verbo mitis, tenuisque victus rationem sequi, quo nec rarefiant humores, nec eorundem circuitus adceleretur, nec machina cordis exstimuletur.

## C A P U T X X.

### DE CAUTIONIBUS IN USU MEDICAMENTORUM ADHIBENDIS.

**U**T via ad medicinam rite faciendam, sive ad medicamenta iis, quibus decet, cautionibus exhibenda muniatur, retractanda nonnulla sunt, quæ supra de viribus medicamentorum adduximus. Atque ut a solventibus exordiamur, illud monuisse juverit cautione opus esse in eorum delectu; siquidem & ad causam spissitudinis respiciendum est, & ad temperiem ægotantis; quippe quæ certa quædam fert genera solventium, non item alia. Si igitur acidum exuberans humores cogat, densetque, maxime opportuna erunt alkalina. Si eorum constitutio pinguis sit & glutinosa, exhiberi cum fructu poterunt saponacea, si mucosa, & iners, salina præsertim convenient. Si coagulum inflammatorium cogat humores, nitrosa opportune cedent, & succi plantarum saponacearum. Fieri etiam potest, ut humorum spissitudo a plethora proficiscatur, ut contingit in subpressis sanguifluxibus; hoc autem casu curationis initium a venæ sectione desumatur. Illud vero tenendum est exstimulian-

mulantia adhiberi tuto non posse, nisi præmissis iis, quibus humores ad fluendum disponantur; secus enim infarctus, concretiones, vasorum rupturæ, & similia consequuntur. Resoluti autem humores crassiores cum impuritates ut plurimum deponant, hinc est, ut habenda cura sit de iisdem e corpore eliminandis. Cum autem per vias omnium convenientissimas eliminari debeant, & quæ ipsarum naturæ maxime adcomodentur, idcirco præstat resolventibus nunc purgantia, nunc diuretica, nunc diaphoretica copulare.

Caute etiam procedendum in usu laxantium, & emollientium. Fieri enim potest, ut ab iterata illorum adplicatione pars adfecta ita laxetur, ut ejus tandem infringatur tonus, atque ita gravior morbus inferatur. Certum enim est partium atoniam difficilius tolli, quam rigiditatem. Adde, quod generatim major fiat adfluxus humorum ad partes relaxatas, atque inde plurimum mali consequatur. Multum autem refert in curatione tumorum resolventia cum emollientibus copulare, ut materia fibras infarciens citius dissipetur. Quod si emollientibus extrinsecus adpositis interna resolventia conjunxeris, tumores citius, & facilius dissipari comperies.

In usu adstringentium caute procedat Medicus necesse est, atque ad indolem præsertim fluidorum, aliarumque partium constitutionem sedulo respiciat. Sæpe enim humores proclives sunt ad rarescendum, quo sane casu prodesse non possunt adstringentia, sed ea tantummodo, quæ valent ad ebullitionem humorum refrænandam; secus enim vehementes, subitæque metastases fiunt ad alias  
partes



partes , congestionesque , & infarctus procreantur. Quod si pars aliqua infirmior sit , quam postulat status naturalis , cavendum est , ne dum aliis robur addere nitimur , in eam impetum faciamus .

Cum ab opiatis lædantur functiones stomachi , & appetitus destruat , testantibus *Willisio* , & *Trallesio* , sequitur hujusmodi remedia præscribenda nunquam esse , nisi in casibus extremis , ut docent *Celsus* , & idem *Trallesi*us & post primarum viarum expurgationem , ne cardialgiæ , & nausæ subsequantur . Caute insuper exhibeantur in morbis convulsivis , hystericis , & hypocondriacis ; licet enim violentos motus refrænent , simul tamen secretiones cohibent , cumulantque proinde materias impuras ; unde effectu remedii cessante vehementiores excitantur paroxysmi . Præterea cum a narcoticis subprimantur evacuationes , & naturæ conatus suspendantur , statim patet abstinendum plane esse a narcoticis , cum evacuationes , & naturæ conatus necessarii sunt . Ab iis etiam , ut & ab opiatis abstinendum , dum motus jam languent . Postremo cum dolores interni gravativi capitis , aurium , oculorum sæpe profluant ab infarctu , metus est , ne exhibito narcotico , quo sanguis supra modum resolvitur , cephalalgiam consequatur delitium , sopor , aliudve malum ipso dolore periculosius . Caute igitur illis utendum in hujusmodi morbis , ut & apud vetulos , paralyticos , similesque ægrotantes in soporem facile delapsuros . Sed & narcotica topica non sine periculo nervorum origini propius admoventur , ut docet experientia ; sic daturæ folia oculis admota amautosim , & my-

driasim excitant, quare in illorum usu caute procedendum.

In administratione purgantium caute se gerat Medicus oportet, & ad indolem morbi, vires ægrotantis, temperamentum, habitum corporis, ætatem, sexum, consuetudinem, dispositionem ad certos morbos, anni tempus, aeris qualitates, & ad alia respiciat. Morbi enim acuti, & ad inflammationem tendentes purgationem omnem respiciunt, & leniens tantum aliquod in nonnullis casibus sub initium admittunt, cum scilicet magnus est humorum adparatus in primis viis, & metus est, ne massam sanguinis subeuntes malum augeant. Raro autem id faciendum est; siquidem tunc solum faciendum, cum materia turgat, quod tamen haud crebro accidit, ut docet *Hipp.* Purgationem etiam prohibent vires fractæ, & fluxus menstruorum, atque lochiorum; gravidis vero non tam facile exhibenda sunt remedia, quæ stimulum inferre valeant. Quod si earum expedienda sit alvus, utique nonnisi per medicamenta blandissima expediri debet. In grandioribus autem fetibus cautissime se gerat Medicus necesse est, ubique sane propter metum abortionis. Qui graciles sunt, vel contrarium obesi minus purgationem ferunt, quam qui mediocri sunt habitu. Item qui sanguineum, aut biliosum a natura sortiti sunt temperamentum magis læduntur a purgantibus, quam qui phlegmatico donantur temperamento. Senibus, & infantibus blanda tantum laxantia præscribantur, si primarum viarum sordes fuerint expurgandæ, lætantes vero pharmaco nutrici exhibito illud cavendo, ne ab ipso nutrix aliquid detrimenti capiat.



piat. Ætas media alacrius fert purgationem, ut & sexus virilis præ foemineo; quin purgantia præsertim crebrius adsumta pessime adficere solent foeminas, & interdum etiam in illis hystericum morbum excitare. Sedulo autem perspiciendum est quibus adfectionibus obnoxius sit æger, de quo purgando cogitamus. Si enimvero proclivis fuerit ad tabem, exsolutionem virium, defectiones animi, fluxus alvi, hæmorrhoides, dolores colicos, hypocondriorum contractiones, aliosque convulsivos morbos, ab omni purgatione abstinendum est. Magna vero cum cautione tractandi sunt qui pravis vescuntur alimentis, & qui pertinaci ventris adstrictione laborant, scilicet emollientibus tantum, aut leniter laxantibus curandi sunt; sæpe enim ab usu purgantium ita exasperantur, irritantur, contrahuntur intestina, ut inde potius tormina, & convulsiones, quam cupita purgatio consequatur. Ex anni temporibus adprime utilis est purgationi tempestas verna, & autumnalis, ut conligitur ex aph. 5. sect. 4. & 47. 6. & si fieri possit, austri-  
no potius die, quam aquilonio instituenda purgatio est, ut monet *Riverius*. Habenda etiam est ratio regionum in purgantibus exhibendis; qui enim regiones incolunt hyperboreas parum, vel nihil a purgantibus ut ut vehementissimis adficiuntur, quæ tamen nobis, quibus mitiora tantum pharmaca conveniunt, magno forent detrimento; adeo verum est quod scripsit *Celsus*, videlicet differre pro natura locorum genera medicinæ, & aliud opus esse Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Galliis. Idem dicas de iis, qui robustiore corporis habitu donati sunt, & crassis vescuntur alimentis. Tempus ad



purgationem feligendum sit tempus intermissionis, aut remissionis in morbis intermittentibus, ac remittentibus, ne in paroxysmo præter laborem, quem creat morbus, ulterius etiam a medicamento stimulum inferente irritetur natura. Quod ad chronicos morbos adtinet, plurimi sunt, in quibus maxime conducit sub initium purgans pharmacum exhibere, tum ut pars vitiosi humoris, & primas fortasse vias obsidentis educatur, tum ut his expurgatis cetera remedia efficacius operentur, tum etiam ut ex inlato stimulo pars aliqua, quam vitiosa materies gravat, relevetur, quod postremum præcipue locum habet in capitis adfectionibus. Illud autem præ ceteris curandum est, ut eliminandus humor rite præparatus sit, & viæ, per quas eliminari debet, expeditæ. Primum præficitur adtenuantibus, & incidentibus potionibus, si noxius humor viscidus fuerit, & crassus; diluentibus, si nimium tenuis, & acer; conrigentibus demum, si nativa illius qualitas inmutetur, quod pharmacum ipsum præstare interdum solet, si conditioni peccantis humoris adcomodetur; postremum vero obtinetur laxantibus, & lubricantibus præmissis etiam clysteribus, si alvus fuerit obstinate adstricta. Illud denique observandum est experientia compertum esse certos quosdam humores per pharmaca quædam peculiaria commodius educi, ob peculiarem in sanguine excitatam solutionem, & certos quosdam adfectus per certa quædam purgantia, quam per alia tutius, & facilius sanari. Sed hæc innotescunt ex præxi. Cautione etiam opus est in clysteribus exhibendis; si enim adsit exsolutio virium, si sudor præsens sit, aut instet, si mu-  
lier



lier gravida proclivis sit ad abortum &c. ab illis abstinendum omnino est.

Cautione pariter opus est in emeticis exhibendis; ab iis enim abstinendum in prava corporis dispositione, in qua scilicet metus est, ne rumpantur vasa, aut humores in certa loca impetum faciant, aut alicubi stagnent &c. Sic periculosum est obesis, & plethoricis emeticum propinare, illis quidem ob angustiam vasorum, his vero ob plethoram, & rupturæ metum. Item iis, qui sunt valde irritabiles, & convulsionibus, & hæmorrhagiis tentari solent, qui capite, & oculis parum valent, qui natura abhorrent a vomitu, qui collo sunt nimis brevi, aut nimis longo, qui denique thorace sunt angusto; in his enim difficilis est respiratio, & via a stomacho ad os nimium longa. Sunt denique nonnulli morbi, aut ad certos quosdam morbos dispositiones, in quibus ab emetico metuendum est; hujusmodi sunt phthises, hæmoptyses, graviditas ob metum abortionis, procidentia quæcumque, inveterati viscerum tumores, adfectiones hystericae, aut hypocondriacæ, oculorum morbi præsertim inflammatorii, & similia. Quod ad rectum spectat emeticorum usum maxime proderit ægri corpus rite præparare, vias nempe liberas, & patentes reddere, & materiam evacuandam mobilem efficere, quod quidem obtinetur adtenuantibus, & incidentibus, vel diluentibus copiose adsumtis. Ad emeticum autem tutius exhibendum plurimum faciet sanguinea vasa mature deplere, si corpus nimis plethoricum, carnosum, & robustum fuerit.



In usu diureticorum nonnulla se obferunt observanda, natura scilicet, peculiaris ægri constitutio, morbus, ejusque tempora, organa demum urinam secernentia. Primum quod spectat, biliosa, ut & melancholica temperamenta diureticorum usum haud impune ferunt. Ab his enim illorum corpora magis ac magis exsiccantur, & stimulus additur fibroso generi, quo sane stimulo facilius in spasmodicas contractiones adigitur, ut proinde satius sit ad mitiora acida, nitrosa, & emollientia confugere, quoties educenda est urina in ægro biliosæ constitutionis. Præterea quibus per diaphoresim, aut aliam evacuationem magna vis humorum absumpta est, a diureticis abstinendum est, aut ea saltem ingerenda multo cum vehiculo copulata, ne nimium siccescant. Antequam vero fiat usus diureticorum viæ omnes, & præsertim urinariæ expediendæ sunt, & expurgandæ, quod si fieri non possit, tunc a diureticis, & quidem vehementioribus abstinere præstat. Hinc impactio renibus, aut ureteribus calculo, iisdemve spasmodica contractione laborantibus vitentur diuretica acriora, eaque in primis, quæ ad frangendum, pellendumque calculum præscribi solent, ne lethales ischuriæ, quod sæpe contingit, excitentur, & solis emollientibus, & lubricantibus insistatur. Abstinendum pariter a fortioribus diureticis, si aliqua sit ad mictum cruentum proclivitas, & in urinæ subpressionem, quæ ab excedente sanguinis mole profluxerit, vena pedis incidatur.

De sudorificis illud observasse juverit, quod ubi Medicus de sudore eliciendo cogitat, remedium adcomodet necesse est ad ægri temperiem,  
&



& sanguinis constitutionem. In primis vero illud præ oculis habeat, ac præcipue in morbis acutis, ut non prius exhibeat sudorifica, quam materia ad excretionem fuerit præparata. Cunctandum igitur, donec signa coctionis adpareant, vel arte procuranda coctio est; si enim adhuc cruda existente materia exhibeantur sudorifica, & præsertim validiora, hæc utique sudorem nihil conferentem summo cum ægrotantis incommodo elicient. Potius igitur inhærendum præparantibus, iisque calidæ, copiosæque portiones adjiciendæ, ut sanguis, & solidæ partes ad optatam secretionem disponantur. Quod si soluta nimium fuerit massa sanguinis, ut proinde sudor moveri non possit, quod in nonnullis febribus malignis, aliisque morbis adfinibus contingit, tunc vitanda sunt sudorifica, ne eorum usu adhuc magis solvatur sanguis, & ad medicamenta moderate acida, & blande adstringentia confugiendum est, quibus sua sanguini consistentia restituatur, ejusque partes heterogeneæ, ac vitiosæ facilius hac ratione secernantur.

De phlebotomia adnotabimus eidem nonnullis in casibus parcendum esse, ac præsertim dum adest virium languor; quare expendendum est sedulo, num vires constant, num vero reipia deficient, quod noscitur ab excedentibus evacuationibus, vel a putrida humorum solutione, vel corruptione materiæ præcordiis adhærentis, aut contra ex nimia plenitudine veluti subfocentur, atque adeo earum oppressio sit tantum adparens, & a plethora, & rarefactione excitata. In primo, & tertio casu convenit phlebotomia, in secundo non convenit. Itaque cum in foeminis utero gerentibus

bus vires plerumque ex nimia sanguinis quantitate subfocentur, præstat in ipsis sanguinem mittere quarto decurrente gestationis mense per venas superiores ea quantitate, quam vires ferant. A phlebotomia pariter abstinendum in foeminis cum instant catamenia, vel actu fluunt, dummodo non sint inmodica, quo casu sanguinis missio celebranda foret per venas manus, vel brachii, quæ pariter lex valet in viris, qui statas periodicas evacuationes patiuntur per venas hæmorrhoidales ad instar foëminarum. At in puerperis si quidem maneant lochia, etsi non adsit plethora, instituenda tamen est missio sanguinis per saphenas, per quas pariter sanguinem mittere convenit, si partus plus justo producatur, vel secundæ detineantur. Sunt præterea nonnulli morbi, ut febres variolosæ, & morbillosæ, in quibus acriter disputatum est, utrum phlebotomia conveniat, nec ne. Statuunt saniores Practici in subiectis cacochymis, frigidis, junioribus phlebotomiæ parcendum, præsertim si per benigna fuerit epidemia; at in plethoricis, calidis, symptomatis urgentibus, sæviante febre, & lentius procedente eruptione missionem sanguinis quantocyus celebrandam, & ultra duas etiam vires repetendam. Pariter in malignis discretis, etsi eruptio jam facta sit, cum advocatur Medicus, tamen phlebotomiam e pede bis instituendam; item in discretis malignis, & confluentibus mittendum sanguinem ante eruptionem semel, aut etiam pluries, & quidem liberalius in adultis; secandam quoque venam pedis inlico, & bis insequentibus diebus iterandam, si opus fuerit, phlebotomiam, si decima die amphimerina secundaria cum in-

quie-



quietudine, jactatione, orthopnoea, ceterisque symptomatis efferetur. In caro item varioloso, & hematuria pariter variolosa indicatur phlebotomia, ut & in rubeola, si populis evanescentibus febris, dyspnoea, & peripneumonia superveniant. Idem præstandum in febre miliari Sydenhamii, & in miliari sudatoria. Sed in omnibus stat dogma gravissimum Celsi lib. 2. cap. 10. scilicet *sanguinem incisa vena mitti novum non est; sed nullum pene morbum esse, in quo non mittatur, novum est.*

De vesicantibus obiter adnotabimus maxima in iisdem præscribendis cautione, & acuto in primis Medici judicio opus esse, ne scilicet ubique, ac sine discrimine in omnibus morbis, ut vertigine, epilepsia, melancholia, artuum tremore, febribus comatosis, inflammatoriis, & convulsivis pectoris adfectibus, diarrhoea, vomitu, ischuria, lue venerea, capitis vulneribus, aliisque similibus morbis minus tempestive adhibeantur, præsertim vero in spasmodis, & convulsionibus aut præsentibus, aut instantibus; in his enim omnibus non raro noxius observatur illorum usus, ut testantur Pacchionius, & Trillerus.

Denique administrationem victus quod adtinet observandum est eundem nunquam exhibendum esse in paroxysmis morborum, ut sapienter monet Hipp. aph. 11. sect. 1. sed in illorum declinatione, aut saltem tempore majoris remissionis, & quietis. Idem dictum esto de medicamentis.

## CAPUT XXI.

## DE RATIONE DETEGENDI MORBI.

UT in curatione dati morbi feliciter procedat Medicus, primum omnium requiritur, ut morbum ipsum, quin & ejusdem speciem investiget, detegatque. In hunc finem integras omnium, ac singulorum morborum historias ex adcuratis, intaminatisque Practicorum observationibus adornatas teneat necesse est, quandoquidem cognitio morborum universa singulorum morborum nititur historiis. Si morbi cujuslibet historiam, sapientissime agebat Sydenhamius, perspectam haberem, par malo remedium nunquam non scirem adferre, variis ejusdem phaenomenis viam, qua mihi incedendum foret, haud dubium praemonstrantibus. Optabat igitur, ut morbi omnes ad definitas, ac certas species revocarentur eadem prorsus diligentia, & acribeja, qua id factum videtur a Botanicis in suis physiologiis; quippe etenim reperiuntur morbi, qui sub eodem genere, & nomenclatura redacti, & quoad nonnulla symptomata sibi invicem similes, tamen & essentia inter se diversi, diversum etiam medendi modum expostulant. Id cum egregie praestitum fuerit a summo Viro, & immortali Francisco Sauvagesio in sua nosologia methodica, qua morborum classes, genera, & species adcuratissime describuntur, illud nobis laetandum venit, quod patefacta via sit, per quam ingredi tuto possimus ad morborum



borum adsequendam cognitionem, atque adeo ad praxim feliciter exercendam. Hac itaque præeunte face postquam lecto adsidens Medicus ex *Hipp.* præcepto interrogavit ægrum quid mali persentiat, quot jam diebus excrucietur, a qua causa, num dejecerit, quibus alimentis usus sit, quo pertinent & effectus medicamentorum, & postquam ægri pulsus attentissime exploravit, sedulo expendat oportet in ægotante ipso quænam sint præcipua symptomata, de quibus ille conqueritur. Si enimvero constantia illa fuerint, & ultra morbi initium perseverent, characterem ipsius morbi constituunt; quippe ut docet *Sydenhamius*, & ratio suadet, characteres morbi ex symptomatibus eruendi sunt.

At vero cum ex symptomatibus alia morbis acutis, alia vero chronicis communia sint, hinc est, ut illis adhærendum non sit, sed ulterius procedendum. Sic observante Illustrissimo *Sauvagesio* cum lassitudo spontanea, *cacositia*, moeror, debilitas, consueti laboris averfatio, rigor, & horror, capitis gravitas morbos febriles inflammatorios, dolorificos, acutos, evacuatorios indiscriminatim enuncient, exinde est, ut in præludio morbi genus non ita facile distinguatur; tunc autem a symptomatibus præcipuis desumuntur indicationes, & præscribuntur auxilia generalia, ut diæta tenuis, quies, venæ sectio, juladia, usquequo symptomata pathognomonica quæsitum morbum prodiderint.

Ubi vero symptomatum graviorum inventa fuerit combinatio, sponte, ut ita dicam, se se obfert classis, & ordo, quo morbus referri debet. Quod si hujus generis inter se mutuo conferantur, comparatio hæc ad genus dati morbi facile



cile perducet. Mulier, sic pergit prælaudatus Auctor, humi strata inventa est sensus omnis motusque voluntarii expers, cum pulsu pleno, molli, respiratione stertorosa, & profundi soporis specie. Quisque in classium, & ordinum characteribus versatus morbi classem, hujusque ordinem, qui comatosos, seu soporosos morbos continet, statim adibit; dein vero quoniam hic morbus inter decem hujus generis ordines reperiendus est, singula genera debent examini subjici, atque ex soporis altitudine, stertore, & omnium artuum flexibilitate ægrum apoplexia laborare facile comperiet. Sed cum apoplexiæ plures sint species, reliquum est, ut Medicus inquiret, num ex lapsu, ictu, vel cranii fractura, commotione; num vero ex cacochylia febrilem capitis infarctum excitante, num ex plethora commota &c. hæc apoplexiæ species orta fuerit, quod ex sedula capitis derasi, & manibus contrectati, linguæ, faciei, circumstantiarum inspectione, & sagaci adstantium interrogatione, ac demum ingeniosa causarum, & principiorum conjectura comperiet, & sic quæsitam morbi speciem tuto, ac facile determinabit.

Quoniam vero superius de pulsu mentionem injecimus, innuisse juverit hoc loco nonnullas leges in explorando, dijudicandoque pulsu factas tactas servandas esse, quarum quidem aliæ ad Medicum pertinent, aliæ respiciunt ægrum. Medicus itaque pulsum exploraturus ad arteriam carpi digitos admoveat, sensibile tempus impendat in pulsu examinando, quo certius de singulis ejusdem adfectionibus dijudicare possit, exquisitissimi sit tactus, mollem habeat manum, præsertim in

api-



apicibus digitorum, & temperate calidam, aliquandiu vero quiescat a motu, antequam ad explorandum pulsum adcedat, ne forte tribuat ægro quod in se sentit. Tres, aut quatuor digitos primo leniter adplicet arteriæ, mox digitos ipsos, deprimat aliquantulum, & quidem æqualiter, cum ex ea compressione pulsus resistentia patefiat; deinde adhuc altius digitos adigat, imprimatque, ut arteriæ contractionem tutius exploret, magnitudinemque antecedentis distractionis, quoad ejus fieri potest, percipiat. Tandem cum arteriæ ante carpum divisæ minor ramus per consuetum explorationis locum porrigatur, major autem alio excurrat, hinc arteriam utriusque carpi exploret necesse est, idque non semel tantum, sed iterato etiam, quò facilius, ac tutius valeat ad singulas quasque differentias pulsum percipiendas. Illud tandem cavere debet Medicus ne sub ipso ad ægrum adcessu pulsum exploret; sæpe namque ad Medici adventum turbatur æger, & vel spe, vel timore commovetur, & pulsus insigniter mutatur. Et quidem nullus est inter Medicos, qui pluries pluriesque non observaverit debilem ægri pulsum, & languidum ab hilari adspectu Medici, verbisque salutem nuntiantibus statim erigi, & roborari, contra vero ab ejusdem tristi quodam silentio demitti.

Aeger autem ab omni corporis animique motu plane quietus sit oportet, atque ubi pulsum obfert exploranti Medico manum supra pectus molliter reclinet, & digitos habeat extensos; Præceteris caveat a nimia respiratione, digitorum flexionibus, aut distentionibus, aliisque pluribus,



quæ alibi adtigimus. Hæc enim omnia cum non parum variare pulsum possint, possunt idcirco explorantem Medicum in errores adducere.

## C A P U T X X I I.

### DE GENERALIBUS QUIBUSDAM REGULIS IN CURATIONE MORBORUM DILIGENTER OBSERVANDIS.

**U**T tyroni Medico ad praxim adcedenti via aliqua patefiat, per quam ingredi possit ad tractationem morborum instituendam, generales hæc regulas adjicimus, quas *Hipp. & Galen.* ceterique artis medicæ principes longo usu confirmarunt. Harum prima ita se habet. *Contraria contrariis curato*; scilicet non iis, quæ præsentī morbo contraria opponuntur, ut docet *Hallerus*, sed iis medicamentis, quorum effectus in futurum causæ morbi contrarius est. Eliguntur autem præsidia contraria, si prius caussa morbifica recte cognoscatur, & causæ a principiis distinguantur.

Secunda lex ita jubet. *Si morbi species ignoretur, ut interdum contingit, indicationem ab juvantibus, & ledentibus desumito.* Et quidem non alia potiori ratione ægrotum in tuto conlocare potest Medicus, quam paulatim prætentando, dummodo ne plus satis properet, cum revera observante *Sydenhamio* nihil quidquam exitiusius esse possit ea festinatione, nec ulla re alia febricitantium plures vita spolientur.

Ter-



Tertia lex ita sancit. *Morborum curationes ne per vim adgreditor, vel evacuationes molitor, sed successive, & paulatim agito, & tempus expectato.* Hujusmodi lex præsertim locum habet in morbis acutis; in his enim cunctandum, & naturæ finis, tendentia, & conatus investigandi, seduloque observandi, nec interea medicamenta turbantia interponenda. Natura enim undique a proprio corpore auxilium petendo, & omnia in consensum trahendo morbos curat, eademque non stimolata monstrat medentibus qua via sit eundum. Sapienter in hanc rem Boerhaavius, *Omnis Medici scientia, omnis, inquam, doctrina nititur solius naturæ. Hanc sedulo observet ille erudientem Magistram, infelix ubi tumidus se effert, quasi suo ex promptuario nata hic cognitione saperet.*

Quarta lex ita est. *Quo natura vergit, eo ducito per loca convenientiora.* Natura autem, quam non sine ratione autodidacton, & doctam sine Magistro dixit Hipp. morbificam materiam plerumque deducit ad colatoria, ut intestinorum, vesicæ, cutis &c. Hinc naturæ motus expendat Medicus, & si quidem idonei fuerint, eosdem adjuvet, promoveatque. Quod si contra vel fluidorum, vel organorum vitio naturæ conatus alio tendant, ut in lienem, cor &c. ubi nulla sunt colatoria, immo si conatus ipsi vehementius in cerebrum, hepar, pulmonesque dirigantur, hos prohibeat, ac divertat utpote contrarios, & noxios.

Quinta lex sic habet. *In vigore morbi, & quando natura movere coepit, a fortioribus commoventibus, & evacuantibus temperato, & potius exceden-*

*cedentes motus refranantibus inhæreto*. Ut enim observat *Sthalius* ; quo magis jam processit methodus certa naturæ, eo minus tolerat interturbari, adeoque, ut recte monet *Hipp.* si quid movendum est initio move.

Sexta lex ita præcipit. *Dum morbus celeriter movetur, celeriter moveto*.

Septima lex hæc monet. *Extremis morbis extrema remedia adhibeto*. Et quidem intensitati morbi respondere debet virtus medicamenti, quo tum in fluidis, tum in solidis partibus naturalis constitutio restauretur, ea scilicet, quam in statu sanitatis habebant, & quam præsens morbus immutavit. Si aliter procedatur, medicamenta nimirum parum activa usurpentur, natura a vi morbi plerumque opprimitur.

Octava lex hæc habet. *Cum plures indicationes adimplendæ simul occurrunt, per conveniens medicamentum simul omnibus satisfacito, modo illis satisfacere simul possis*. Sic in dysenteria quoniam saburra ventriculi indicat evacuantia, ejusdem vis infracta postulat roborantia, hiulca intestinorum vasa exigunt constringentia, & alvus liquida constipantia, indicationibus hisce omnibus præscripta ipecacuanha, quæ eximium emeticum, roborans, & adstringens est, satisfiat.

Nona lex hæc jubet. *Cum duæ diversæ indicationes adimpleri simul nequeunt, tunc urgentiori occurrito*.

Decima lex ita habet. *Si unum symptomata pendeat ab altero, symptomati primitivo potius occurrito, quam derivativo*.

Unde-



Undecima lex sic est. Medetur morbo per medicamenta mitiora, quam per fortiora, modo utraque sint, æque idonea. Nam mitiora medicamenta minus fatigant corpus præ fortioribus.

Duodecima lex hæc præcipit. Magis esto sollicitus de medendo morbo, quam symptomatibus; sed si hæc majus periculum portendant, his primum medetur.

Decimatertia lex hæc sancit. Urgentiori periculo statim occurrere, atque adeo prout nobilius organum adficitur, & gravior est noxa, conatus quosdam intendere neglectis ceteris, aut majorem virium copiam absumere anceps potius experiundo conamen, quam nullum.

Decimaquarta lex ita se habet. Si auxilia sibi mutuo repugnent, alia, quæ se mutuo non destruant, inquirere. Sic quoniam hepar obstructum indicat incidentia, acrimonia vero sanguinis incrascentia, confugiendum est ad diluentia quibus acrimonia simul, & visciditas retundantur.

Decimaquinta lex ita jubet. Phlebotomiam catharsi, quam catharsim phlebotomiæ præmittito. Cum enim observatione constet misso sanguine naturam non raro vomitum, aut diarrhoeam excitare, vel ad auxilia generalia fieri expeditionem, hinc præstat in genere præscriptæ legi obtemperare.

Decimasexta lex ita monet. Evacuationes criticas adjuvato, symptomáticas vero moderato. De hac lege adnotabimus primo evacuationes criticas promovendas non esse, cum ipsæ per se sufficiunt sanando morbo. 2. Nonnullos casus contingere posse, quibus præstat evacuationes symptomáticas adjuvare. Sane Hipp. 5. epidem. exemplum refert hominis

minis cholerae morbo adfecti, qui ope hellebori sanatus fuit. Fortasse reliquiae corrupti cibi in primis viis haerentis vomitum, & dejectiones ciebant, quae reliquiis illis per helleborum eductis statim conquieverunt. Hanc tamen medendi methodum damnat *Celius Aurelianus*.

Decimaseptima lex haec sancit. *Dum in morbis adparent petechiae, nihil amplius in primis viis moveto. Et quidem eo tempore ipsa etiam enemata suspecta sunt.*

Decimaoctava lex haec statuit. *Quo magis ad statum vergit febris, eo minus utitor refrigerantibus. Per ea siquidem crisis plerumque impeditur; liberalius vero iidem utendum est circa initia; Tunc siquidem nimia febrilis caloris acuties, humorum impetus, & rarefcentia gravissima minantur mala, nisi per humectantia, & diluentia prudenter repetita leniantur, motusque sanguinis ad eam mediocritatem redigatur, quae sufficiens sit absolvendae depurationi.*

Decimanona lex ita vult. *In nonnullis morbis ex. gr. colica biliosa valde pertinaci, in phthisi cum fluxu conliquoativo, in hysteria, & adfectu hypocondriaco inveteratis, demum in chronicis morbis, & a viscerum obstructione productis ab usu remediorum caveto, & rusticano in aere exercitationem praescribito.*

Vicesima lex sic habet. *In morbis nunquam ab aegrotante discedito, nisi linguam inspexeris. Haec enim statum sanguinis praeter aliis signis & apertius, & certius nobis indicat; Et nisi sapor, color, aliaque linguae accidentia ad naturalem statum redacta sint, nunquam aegrotantem tutum dato adstantibus.*

Vige-



Vicesima prima lex hæc præcipit: *In morbis duo potissimum spectato, scilicet ut juves, aut saltem ne noceas.* Magis autem nocet remedium, quod non convenit, quam damno sit non exhibere remedium, quod convenit. In primo casu natura ab opere suo dimovetur, in altero nihil eidem impedimento est, quominus laboret in curando morbo.

F I N I S.













